

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદના પત્ર-ક્રમાંક  
જીસીઈઆરટી/સીએન્ડઈ/2018/5808, તા.07/03/2018થી મંજૂર

# ગણિત

## ધોરણ VIII



### પ્રતિજ્ઞાપત્ર

ભારત મારો દેશ છે.

બધાં ભારતીયો મારાં ભાઈબહેન છે.

હું મારા દેશને ચાહું છું અને તેના સમૃદ્ધ અને  
વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનો મને ગર્વ છે.

હું સદાય તેને લાયક બનવા પ્રયત્ન કરીશ.

હું મારાં માતાપિતા, શિક્ષકો અને વડીલો પ્રત્યે આદર રાખીશ  
અને દરેક જણ સાથે સભ્યતાથી વર્તીશ.

હું મારા દેશ અને દેશબાંધવોને મારી નિષ્ઠા અર્પું છું.

તેમનાં કલ્યાણ અને સમૃદ્ધિમાં જ મારું સુખ રહ્યું છે.

રાજ્ય સરકારની વિનામૂલ્યે યોજના હેઠળનું પુસ્તક



રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક અનુસંધાન ઓર પ્રશિક્ષણ પરિષદ  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING



ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ  
'વિદ્યાયન', સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર-382010

© NCERT, નવી દિલ્હી તથા ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, ગાંધીનગર  
આ પાઠ્યપુસ્તકના સર્વ હક NCERT, નવી દિલ્હી તથા ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળને  
હસ્તક છે. આ પાઠ્યપુસ્તકનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ રૂપમાં NCERT, નવી દિલ્હી અને  
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની લેખિત પરવાનગી વગર પ્રકાશિત કરી શકાશે નહિ.

### અનુવાદ

ડૉ. ભાવેશ જી. દવે  
શ્રી સતિષ પી. તેરૈયા  
શ્રી નરેશ એમ. જાલોરિયા  
ડૉ. ઉપેન્દ્ર ડી. મહેતા

### સમીક્ષા

ડૉ. કાનજીભાઈ વી. પટેલ  
ડૉ. વિજય પટેલ  
શ્રી હિતેશકુમાર વી. પંડ્યા  
શ્રી હેમંત આર. શાહ  
શ્રી વિરાગકુમાર જે. ગરાલા  
શ્રી મનસુરી સત્તાર એસ.  
શ્રી શૈલેશ એચ. ફિચડીયા

### ભાષાશુદ્ધિ

ડૉ. દિનેશ એમ. જોષી

### સંયોજન

શ્રી આશિષ એચ. બોરીસાગર  
(વિષય સંયોજક : ગણિત)

### નિર્માણ-આયોજન

શ્રી હરેન પી. શાહ  
(નાયબ નિયામક : શૈક્ષણિક)

### મુદ્રણ-આયોજન

શ્રી હરેશ એસ. લીખ્યાચીયા  
(નાયબ નિયામક : ઉત્પાદન)

### પ્રસ્તાવના

રાષ્ટ્રીય સ્તરે સમાન અભ્યાસક્રમ રાખવાની સરકારશ્રીની નીતિના અનુસંધાને ગુજરાત સરકાર તથા GCERT દ્વારા તા. 19-7-2017ના ઠરાવ-ક્રમાંક જશભ/1217/સિંગલ ફાઈલ-62/ન થી શાળાકક્ષાએ NCERTના પાઠ્યપુસ્તકોનો સીધો અમલ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો તેને અનુલક્ષીને NCERT, નવી દિલ્હી દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ VIIIના ગણિત વિષયના પાઠ્યપુસ્તકનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરાવીને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ મૂકતાં ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ આનંદ અનુભવે છે.

આ પાઠ્યપુસ્તકનો અનુવાદ તથા તેની સમીક્ષા નિષ્ણાત પ્રાધ્યાપકો અને શિક્ષકો પાસે કરાવવામાં આવ્યા છે અને સમીક્ષકોનાં સૂચનો અનુસાર હસ્તપ્રતમાં યોગ્ય સુધારાવધારા કર્યા પછી આ પાઠ્યપુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરતાં પહેલાં આ પાઠ્યપુસ્તકની મંજૂરી માટે એક સ્ટેટ લેવલની કમિટીની રચના કરવામાં આવી. આ કમિટીની સાથે NCERTના પ્રતિનિધિ તરીકે RIE ભોપાલથી ઉપસ્થિત રહેલા નિષ્ણાતોની એક ત્રિદિવસીય કાર્યશિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને પાઠ્યપુસ્તકને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું જેમાં ડૉ.ભાવેશ દવે, શ્રી નરેશ જાલોરિયા, ડૉ. ઉપેન્દ્ર મહેતા, શ્રી સતિષ તેરૈયા, ડૉ. વિજય પટેલ, શ્રી નિતેશ એમ. દલવાડી, ડૉ. સુરેશ મકવાણા (RIE, ભોપાલ) અને શ્રી અજી થોમસ (RIE, ભોપાલ) ઉપસ્થિત રહી પોતાનાં કીમતી સૂચનો અને માર્ગદર્શન પૂરાં પાડ્યાં છે.

પ્રસ્તુત પાઠ્યપુસ્તકને રસપ્રદ, ઉપયોગી અને ક્ષતિરહિત બનાવવા માટે માન. અગ્રસચિવશ્રી (શિક્ષણ) દ્વારા અંગત રસ લઈને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. આ પાઠ્યપુસ્તકની ચકાસણી શિક્ષણ-વિભાગના વર્ગ 1 અને વર્ગ 2ના જે-તે વિષય જાણતા અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા પણ કરાવવામાં આવી છે. મંડળ દ્વારા પૂરતી કાળજી લેવામાં આવી છે, તેમ છતાં શિક્ષણમાં રસ ધરાવનાર વ્યક્તિઓ પાસેથી ગુણવત્તા વધારે તેવાં સૂચનો આવકાર્ય છે.

NCERT, નવી દિલ્હીના સહકાર બદલ તેમના આભારી છીએ.

### પી. ભારતી (IAS)

નિયામક

તા. 04-11-2019

કાર્યવાહક પ્રમુખ

ગાંધીનગર

પ્રથમ આવૃત્તિ : 2018, પુન: મુદ્રણ : 2019, 2020

પ્રકાશક : ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, 'વિદ્યાયન', સેક્ટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર વતી  
પી. ભારતી, નિયામક

મુદ્રક :



## Foreword

The National Curriculum Framework, 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

NCERT appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in science and mathematics, Professor J.V. Narlikar and the Chief Advisor for this book, Dr H.K. Dewan for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

*Director*  
National Council of Educational  
Research and Training

New Delhi  
30 November 2007



## Preface

This is the final book of the upper primary series. It has been an interesting journey to define mathematics learning in a different way. The attempt has been to retain the nature of mathematics, engage with the question why learn mathematics while making an attempt to create materials that would address the interest of the learners at this stage and provide sufficient and approachable challenge to them. There have been many views on the purpose of school mathematics. These range from the fully utilitarian to the entirely aesthetic perceptions. Both these end up not engaging with the concepts and enriching the apparatus available to the learner for participating in life. The NCF emphasises the need for developing the ability to mathematise ideas and perhaps experiences as well. An ability to explore the ideas and framework given by mathematics in the struggle to find a richer life and a more meaningful relationship with the world around.

This is not even easy to comprehend, far more difficult to operationalise. But NCF adds to this an even more difficult goal. The task is to involve everyone of that age group in the classroom or outside in doing mathematics. This is the aim we have been attempting to make in the series.

We have, therefore, provided space for children to engage in reflection, creating their own rules and definitions based on problems/tasks solved and following their ideas logically. The emphasis is not on remembering algorithms, doing complicated arithmetical problems or remembering proofs, but understanding how mathematics works and being able to identify the way of moving towards solving problems.

The important concern for us has also been to ensure that all students at this stage learn mathematics and begin to feel confident in relating mathematics. We have attempted to help children read the book and to stop and reflect at each step where a new idea has been presented. In order to make the book less formidable we have included illustrations and diagrams. These combined with the text help the child comprehend the idea. Throughout the series and also therefore in this book we have tried to avoid the use of technical words and complex formulations. We have left many things for the student to describe and write in her own words.

We have made an attempt to use child friendly language. To attract attention to some points blurbs have been used. The attempt has been to reduce the weight of long explanations by using these and the diagrams. The illustrations and fillers also attempt to break the monotony and provide contexts.

Class VIII is the bridge to Class IX where children will deal with more formal mathematics. The attempt here has been to introduce some ideas in a way that is moving towards becoming formal. The tasks included expect generalisation from the gradual use of such language by the child.

The team that developed this textbook consisted teachers with experience and appreciation of children learning mathematics. This team also included people with experience of research in mathematics teaching-learning and an experience of producing materials for children. The feedback on the textbooks for Classes VI and VII was kept in mind while developing this textbook. This process of development also included discussions with teachers during review workshop on the manuscript.

In the end, I would like to express the grateful thanks of our team to Professor Krishna Kumar, *Director*, NCERT, Professor G. Ravindra, *Joint Director*, NCERT and Professor Hukum Singh, *Head*, DESM, for giving us an opportunity to work on this task with freedom and with full support. I am also grateful to Professor J.V. Narlikar, Chairperson of the Advisory Group in Science and Mathematics for his suggestions. I am also grateful for the support of the team members from NCERT, Professor S.K. Singh Gautam, Dr V.P. Singh and in particular Dr Ashutosh K. Wazalwar who coordinated this work and made arrangements possible. In the end I must thank the Publication Department of NCERT for its support and advice and those from Vidya Bhawan who helped produce the book.

It need not be said but I cannot help mentioning that all the authors worked as a team and we accepted ideas and advice from each other. We stretched ourselves to the fullest and hope that we have done some justice to the challenge posed before us.

The process of developing materials is, however, a continuous one and we would hope to make this book better. Suggestions and comments on the book are most welcome.

H.K. DEWAN  
*Chief Advisor*  
Textbook Development Committee



## શિક્ષક માટેની નોંધ

આ NCERTના ધોરણ : 8ના પાઠ્યપુસ્તકની શ્રેણીના ત્રીજા અને અંતિમ પુસ્તકનો અનુવાદ છે. ગણિતના અમૂર્ત ખ્યાલો અને સિદ્ધાંતોને વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થવા માટે શરૂ કરેલ સતત પ્રક્રિયાનું જ એક સોપાન છે. આપણા વિદ્યાર્થીઓના ગાણિતિક ખ્યાલો સ્પષ્ટ કરવા તથા તેમનો ઉપયોગ કરવા માટે તર્કસંગત આધારોની જરૂર છે. જેનાથી તેઓ અમૂર્ત ખ્યાલો સમજશે, પૂર્વધારણાઓનો ઉપયોગ કરશે અને નવાં સૂત્રો બનાવવા સક્ષમ બનશે. રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ માળખું-2005 (NCF-2005)નો કેન્દ્રવર્તી વિચાર એ છે કે ગણિત વિષયની મદદથી બાળકની વ્યાપક યોગ્યતાનો વિકાસ થાય તે માટે જટિલ ગણતરીથી દૂર રહે, ગણનની સાર્વત્રિક પદ્ધતિઓને સમજે, પ્રશ્નોને ઉકેલવાની સમજણ અને પેટર્ન વિકસે. તમે જાણો છો કે માત્ર કહેવાથી ગાણિતિક ખ્યાલોનો વિકાસ ન થાય. માત્ર વર્ણન કરવાથી પણ બાળકોના આ ખ્યાલો સ્પષ્ટ થતા નથી. દરેક બાળકને પોતાનું વિષય-વસ્તુનું માળખું અને એક એવા વર્ગખંડની જરૂરિયાત છે કે જ્યાં પોતાના વિચારોની ચર્ચા, પ્રશ્નોના નિરાકરણ અને નવા પ્રશ્નોનું નિર્ધારણ અને તેના ઉકેલ પોતાની રીતે રજૂ કરે અને પોતાની વ્યાખ્યાઓ હોય.

આપણે પહેલા કહ્યું એ પ્રમાણે, બાળકને પાઠ્યપુસ્તક અને ગણિતને લગતું અન્ય સંદર્ભ સાહિત્ય સમજણ સાથે વાંચતા શીખવવું અગત્યનું છે. બાળકોને ઊંડાણપૂર્વક ગણિત શીખવા મદદરૂપ થવા સારા વાંચન સાહિત્યની પણ જરૂર છે. મહેરબાની કરીને ધોરણ : 8માં એ વાતનું ધ્યાન રાખશો કે વિદ્યાર્થીઓ શું શીખ્યા છે અને તે મુજબ વિદ્યાર્થીઓને એવા વિષયવસ્તુના વાંચન માટેની તક આપવી કે, જેમાં સંકેતોની સાથે ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તેમજ કોઈ પણ પ્રકારના અતીરેક વગર સરળ સ્વરૂપમાં અને સંક્ષિપ્તમાં વિષયવસ્તુ રજૂ થયેલ હોય. આ માટે શક્ય હોય તો તેમને બીજું વિષયવસ્તુ પણ વાંચવા માટે આપો. તમે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રસાયણ વિજ્ઞાનનાં શીખેલાં સમીકરણોની સાથે સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરી શકો છો. આ વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ વિષયોના સંદર્ભમાં ગણિતના ઉદ્દેશ્યો સમજાવવામાં અને રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં મદદરૂપ થશે. તેઓને તર્કસંગત દલીલોની પુનઃચચના કરવા માટે સક્ષમ બનાવવાની જરૂર છે. તેમજ ગણિત વિષયને અન્ય વિષય સાથે જોડવામાં કે સંબંધ સ્થાપિત કરવા માટે જરૂરી કેટલાંક કારણો અને સંબંધોને સમજવાની જરૂર છે. ધોરણ : 8નાં બાળકોને આ બધી બાબતો માટે તક આપવી જરૂરી છે.

આપણે અગાઉ ભારપૂર્વક જણાવ્યા મુજબ ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ ગણિત એ અમૂર્ત હોવાને કારણે તેને બાળકોના અનુભવ અને આસપાસના પર્યાવરણની સાથે જોડવું જોઈએ. વિષયની સરળતા અને-અથવા તેના અનુભવોને જોડતા મોડેલોથી તેના વિચારો પર કામ કરવા માટે આગળ વધવાની જરૂર છે. સૂત્રો અને સમજણપૂર્વકની દલીલ માટે અમૂર્ત તથ્યોની સમજણની જરૂર છે. અવધારણાઓની વચ્ચે આંતરિક સંબંધોની જોવાની ક્ષમતા અન્ય વિષયોના ખ્યાલોને સમજવામાં સહાય કરે છે. આ ઉપરાંત તે આપણને વિવિધ પેટર્ન, નક્શા, ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળનું માપ તેમજ આકાર અને કદ વચ્ચેની સામ્યતા જોવા અને સમજવામાં મદદરૂપ બને છે. જોકે આ બાબત બીજાં ક્ષેત્રોના જ્ઞાન સાથે ગણિતને જોડવાની હોવા છતાં આપણા પર્યાવરણ અને જીવનમાં એને પુનઃ સ્થાપિત કરવાની ખૂબ જ જરૂર છે.

બાળકો પ્રાસંગિક પરિસ્થિતિઓમાં ઉપયોગી સિદ્ધાંતોને ઓળખવામાં યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે, તે માટે કોયડાઓને (સમસ્યાઓને) ઉકેલવાના પ્રથમ તબક્કારૂપે કોયડાઓનું સૂક્ષ્મ પરીક્ષણ કરે તથા કોયડાઓને અનુરૂપ સૂચના પસંદ કરવા યોગ્ય બને તે જરૂરી છે. એકવાર વિદ્યાર્થીઓ આ યોગ્યતા મેળવી લે ત્યારબાદ તેમણે પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનો રસ્તો શોધવા અને કોયડાની જરૂરિયાત મુજબ તેનો ઉકેલ શોધવા યોગ્ય બનવું જરૂરી છે. તેઓએ આ કોયડાને ઓળખવા કે સમજવા સંભવિત ઉકેલો મેળવવા અને જરૂર પડે તો આ તબક્કાઓ ફરીથી પુનરાવર્તિત કરવા અથવા ફરીથી તૈયાર કરવાની જરૂરિયાત છે. જેમ જેમ તેઓ આગળ વધશે તેમ તેમ તેઓનું કામ વધુ વિસ્તૃત બનશે. ધોરણ : 8માં આપણે વિદ્યાર્થીઓને તેઓ દ્વારા અનુસરવાનાં સોપાનો વિશે સભાન રાખીશું. બાળકો કોયડાના ઉકેલ શોધીને યોગ્ય મોડેલ તૈયાર કરવાની યોગ્યતા વિકસાવે, તે અંગે તેઓ પોતાની વ્યૂહરચના વિકસાવે અને કોયડાનું વિશ્લેષણ કરવાની ક્ષમતા વિકસાવે તે માટે તેઓને મદદ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આ માટે તેમને વર્ષોના સંશોધન બાદ મેળવેલા ગાણિતિક નિયમો સમજાવવામાં આવે તે અગત્યનું છે.

ગણિતને શીખવા માટે માત્ર રીત કે ઉકેલને યાદ રાખવા એ પૂરતું નથી, પરંતુ કોયડાનો ઉકેલ કેવી રીતે મેળવવો અને રસપ્રદ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવું તે પણ જરૂરી છે.

જૂથ કાર્ય દ્વારા શિક્ષણ, વાતચીત દ્વારા શિક્ષણ, એક-બીજા પાસેથી શીખવાની ઈચ્છા અને ક્ષમતા તથા આ વાતચીત કોઈ ઘોંઘાટ નથી અને પરામર્શન એ કોઈ છેતરપિંડી નથી. એ વાતનો સ્વીકાર કરવો એ શિક્ષક તરીકે તમારા



અને વિદ્યાર્થીઓના વલણમાં પણ આવનારા પરિવર્તનનો એક અગત્યનો ભાગ છે. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના અનુભવોમાંથી મેળવેલ ઉદાહરણો સમૂહમાં રજૂ કરે એ માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકોનું સમૂહમાં વાંચન કરે અને જે કંઈ સમજેલ છે તેની જૂથમાં રજૂઆત કરે તથા સૂત્ર સ્વરૂપે વર્ણન કરે તે માટે તેઓને પ્રેરિત કરવા જોઈએ. મૂલ્યાંકન પદ્ધતિમાં પણ આ કાર્યની ઓળખ થતી હોવી જોઈએ અને તેની નોંધ લેવી જોઈએ. ઉપરાંત વર્ગને આ પ્રમાણે જૂથમાં વિભાજિત કરવો જોઈએ; જેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ એકબીજા સાથે રહીને આનંદ ઉલ્લાસથી જૂથમાં પોતાનું યોગદાન આપે. તમે જોયું હશે કે જુદો-જુદો સમૂહ જુદી-જુદી વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે તેઓ પોતાના મોડેલ કે વિચારોનો ઉલ્લેખ કરે છે. તેમાં અમુક વિચારો એટલા પ્રભાવશાળી નથી હોતા કે જેટલા બીજાના હોય છે. આ બધામાંથી યોગ્ય હોય તેનું બાળકો સામે વિશ્લેષણ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અલગ-અલગ વ્યૂહરચનાઓનું પ્રદર્શન ગાણિતિક સમજને ખૂબ ઊંડાણ સુધી લઈ જાય છે. દરેક જૂથ એક સ્થિતિથી શરૂ કરે છે અને તેને આવી બાબત માટે એક તક આપવાની જરૂરિયાત છે.

અહીં, ગણિત શિક્ષણના મુખ્ય વિચારોને ટૂંકમાં રજૂ કર્યા છે. જેનો તમે તમારા વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરશો તો તે અમને ગમશે.

1. સમજણ મેળવવા માટે પૂછપરછ કરવી એ એક સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે, જેની મદદથી વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને તેની રચના કરે છે. આ રીતે જ્ઞાન મેળવવા માટે વિવિધ અવલોકનોનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. વિદ્યાર્થીઓએ (ભૂમિતિ, અંકગણિત અને બીજગણિતના) વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવા ઉપરાંત પડકારરૂપ, તપાસ-તલાશ કરવામાં સહાયભૂત, ખુલ્લા-અંતવાળા, સંદર્ભ ધરાવતા અને સરખા ગાણિતિક પ્રશ્નોના ઉકેલો મેળવવાનો મહાવરો કરવાનો છે.
2. વિદ્યાર્થીઓએ તર્કસંગત દલીલો આપવી અને તેને અનુસરવું, પ્રસ્તુત તર્ક-વિતર્કમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધવો. ઉપરાંત આધાર સાથે સાબિતી રજૂ કરવાની સમજણ આપવી જરૂરી છે.
3. ગણિતના તાસમાં ભાષાનો ગણિત સાથે સંબંધ પ્રસ્થાપિત થવો જોઈએ. બાળકે પોતાની ભાષા અને અનુભવોનો ઉપયોગ કરીને પોતાના વિચારો વિશે વાત કરવી જોઈએ. તેઓને પોતાના શબ્દો અને ભાષાનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. ઉપરાંત ધીમે-ધીમે ઔપચારિક ભાષા અને સંકેતોનો ઉપયોગ કરે તે માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ.
4. સંખ્યા પદ્ધતિને સંમેય સંખ્યાઓ અને તેના ગુણધર્મોની સામાન્યીકરણ સુધીના સ્તરે લઈ જવામાં આવી છે. જેમાં અગાઉની બધી પદ્ધતિઓને સંમેય સંખ્યાના વ્યાપકરૂપમાં ઉપગણના રૂપમાં દર્શાવેલ હોય. સામાન્યીકરણ એ ગાણિતિક ભાષામાં રજૂ કરવું જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે બીજગણિત અને તેની ભાષા ઘણા બધા શબ્દને ટૂંકા સંકેતના રૂપે રજૂ કરવામાં મદદ કરે છે.
5. અગાઉ જણાવ્યા મુજબ વિદ્યાર્થીઓ પાસે અપેક્ષિત છે કે તેઓ વધુમાં વધુ કોયડાઓની રચના કરે, ઉકેલ મેળવે. આપણે આશા રાખીએ કે વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં જટિલ કોયડાઓની રચના કરશે તેમ તેમ પોતાના વિચાર અને જ્ઞાન પ્રત્યે તેનો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
6. ધોરણ : 8ના આ પાઠ્યપુસ્તકમાં ગણિતના વિભિન્ન આયામો એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે. સામાન્ય વિધિઓ પર વિશેષ ધ્યાન આપેલ છે. ત્રિરાશિ પદ્ધતિ, ગુણોત્તર અને પ્રમાણ, વ્યાજ અને ડિવિડન્ડ આ બધા પાઠ્ય એક જ તાર્કિક ખ્યાલ રહેલો છે. ગણિતની કોઈ પણ શાખામાં અજ્ઞાત રાશિને જ્ઞાત કરવા માટે ચલ અને સમીકરણોના વિચારની જરૂર પડે છે.

આપણે આશા રાખીએ કે આ પુસ્તક બાળકને આનંદ સાથે ગણિતને શીખવામાં મદદરૂપ થાય અને ખ્યાલોનો પરિચય મેળવવા આત્મવિશ્વાસનું સિયન થાય. આપણે બાળકોને વ્યક્તિગત રીતે અને સામુદાયિક રીતે તકનું નિર્માણ માટેની ઈચ્છા કરીએ છીએ.

આ પુસ્તક વિશે આપના વિચારો અને સૂચનોને અમે આવકારીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે શિક્ષણ કાર્ય દરમિયાન તમારા દ્વારા વિશેષરૂપે વિકાસ પામેલ રસપ્રદ સ્વાધ્યાય, પ્રવૃત્તિઓ અને શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ મોકલશો. જેનો ભવિષ્યમાં નવી આવૃત્તિમાં સમાવેશ થઈ શકે. આ ત્યારે જ શક્ય બનશે કે જ્યારે તમે વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા માટે તત્પર બનશો. ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓની ત્રૂટિઓ કે ખામીઓ ઓળખશો અને તેના વિચારોને વ્યક્ત કરવા તક આપશો.

# Textbook Development Committee

## **CHAIRPERSON, ADVISORY GROUP IN SCIENCE AND MATHEMATICS**

J.V. Narlikar, Emeritus Professor, *Chairman*, Advisory Committee, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCCA), Ganeshkhind, Pune University, Pune

## **CHIEF ADVISOR**

H.K. Dewan, Vidya Bhawan Society, Udaipur, Rajasthan

## **CHIEF COORDINATOR**

Hukum Singh, *Professor and Head*, DESM, NCERT, New Delhi

## **MEMBERS**

Anjali Gupte, *Teacher*, Vidya Bhawan Public School, Udaipur, Rajasthan

Avantika Dam, *TGT*, CIE Experimental Basic School, Department of Education, Delhi

B.C. Basti, *Senior Lecturer*, Regional Institute of Education, Mysore, Karnataka

H.C. Pradhan, *Professor*, Homi Bhabha Centre for Science Education, TIFR, Mumbai  
Maharashtra

K.A.S.S.V. Kameshwar Rao, *Lecturer*, Regional Institute of Education, Shyamala Hills  
Bhopal (M.P.)

Mahendra Shankar, *Lecturer (S.G.) (Retd.)*, NCERT, New Delhi

Meena Shrimali, *Teacher*, Vidya Bhawan Senior Secondary School, Udaipur, Rajasthan

P. Bhaskar Kumar, *PGT*, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Lepakshi, Distt. Anantpur (A.P.)

R. Athmaraman, *Mathematics Education Consultant*, TI Matric Higher Secondary School and  
AMTI, Chennai, Tamil Nadu

Ram Avtar, *Professor (Retd.)*, NCERT, New Delhi

Shailesh Shirali, Rishi Valley School, Rishi Valley, Madanapalle (A.P.)

S.K.S. Gautam, *Professor*, DEME, NCERT, New Delhi

Shradha Agarwal, *Principal*, Florets International School, Panki, Kanpur (U.P.)

Srijata Das, *Senior Lecturer* in Mathematics, SCERT, New Delhi

V.P. Singh, *Reader*, DESM, NCERT, New Delhi

## **MEMBER-COORDINATOR**

Ashutosh K. Wazalwar, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

## ACKNOWLEDGEMENTS

The Council gratefully acknowledges the valuable contributions of the following participants of the Textbook Review Workshop: Shri Pradeep Bhardwaj, *TGT* (Mathematics) Bal Sthali Public Secondary School, Kirari, Nangloi, New Delhi; Shri Sankar Misra, *Teacher* in Mathematics, Demonstration Multipurpose School, Regional Institute of Education, Bhubaneswar (Orissa); Shri Manohar M. Dhok, *Supervisor*, M.P. Deo Smruti Lokanchi Shala, Nagpur (Maharashtra); Shri Manjit Singh Jangra, *Maths teacher*, Government Senior Secondary School, Sector-4/7, Gurgoan (Haryana); Dr. Rajendra Kumar Pooniwala, U.D.T., Government Subhash Excellence School, Burhanpur (M.P.); Shri K. Balaji, *TGT* (Mathematics), Kendriya Vidyalaya No.1, Tirupati (A.P.); Ms. Mala Mani, Amity International School, Sector-44, Noida; Ms. Omlata Singh, *TGT* (Mathematics), Presentation Convent Senior Secondary School, Delhi; Ms. Manju Dutta, Army Public School, Dhaula Kuan, New Delhi; Ms. Nirupama Sahni, *TGT* (Mathematics), Shri Mahaveer Digambar Jain Senior Secondary School, Jaipur (Rajasthan); Shri Nagesh Shankar Mone, *Head Master*, Kantilal Purshottam Das Shah Prashala, Vishrambag, Sangli (Maharashtra); Shri Anil Bhaskar Joshi, *Senior teacher* (Mathematics), Manutai Kanya Shala, Tilak Road, Akola (Maharashtra); Dr. Sushma Jairath, *Reader*, DWS, NCERT, New Delhi; Shri Ishwar Chandra, *Lecturer (S.G.)* (Retd.) NCERT, New Delhi.

The Council is grateful for the suggestions/comments given by the following participants during the workshop of the mathematics Textbook Development Committee  
Shri Sanjay Bolia and Shri Deepak Mantri from Vidya Bhawan Basic School, Udaipur;  
Shri Inder Mohan Singh Chhabra, Vidya Bhawan Educational Resource Centre, Udaipur.

The Council acknowledges the comments/suggestions given by Dr. R.P. Maurya, *Reader*, DESM, NCERT, New Delhi; Dr. Sanjay Mudgal, *Lecturer*, DESM, NCERT, New Delhi; Dr. T.P. Sharma, *Lecturer*, DESM, NCERT, New Delhi for the improvement of the book.

The Council acknowledges the support and facilities provided by Vidya Bhawan Society and its staff, Udaipur, for conducting workshops of the development committee at Udaipur and to the Director, Centre for Science Education and Communication (CSEC), Delhi University for providing library help.

The Council acknowledges the academic and administrative support of Professor Hukum Singh, Head, DESM, NCERT.

The Council also acknowledges the efforts of Sajjad Haider Ansari, Rakesh Kumar, Neelam Walecha, *DTP Operators*; Kanwar Singh, *Copy Editor*; Abhimanu Mohanty, *Proof Reader*, Deepak Kapoor, *Computer Station Incharge*, DESM, NCERT for technical assistance, APC Office and the Administrative Staff, DESM, NCERT and the Publication Department of the NCERT.



## અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ 1	સંમેય સંખ્યાઓ	1
પ્રકરણ 2	એક ચલ સુરેખ સમીકરણ	21
પ્રકરણ 3	ચતુષ્કોણની સમજ	37
પ્રકરણ 4	પ્રાયોગિક ભૂમિતિ	57
પ્રકરણ 5	માહિતીનું નિયમન	69
પ્રકરણ 6	વર્ગ અને વર્ગમૂળ	89
પ્રકરણ 7	ઘન અને ઘનમૂળ	109
પ્રકરણ 8	રાશિઓની તુલના	117
પ્રકરણ 9	બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ	137
પ્રકરણ 10	ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ	153
પ્રકરણ 11	માપન	169
પ્રકરણ 12	ઘાત અને ઘાતાંક	193
પ્રકરણ 13	સમપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ	201
પ્રકરણ 14	અવયવીકરણ	217
પ્રકરણ 15	આલેખનો પરિચય	231
પ્રકરણ 16	સંખ્યા સાથે રમત	249
	જવાબો	261
	ગમ્મત સાથે જ્ઞાન	275







# સંમેય સંખ્યાઓ

પ્રકરણ

1

## 1. પ્રાસ્તાવિક

ગણિતશાસ્ત્રમાં આપણે સુરેખ (સાદા) સમીકરણને વારંવાર ઉકેલીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે સમીકરણ

$$x + 2 = 13 \quad (1)$$

જો સમીકરણ (1)માં આપણે  $x = 11$  મૂકીએ, તો આ સમીકરણનો ઉકેલ મળે છે. કેમ કે  $x$ ની કિંમત 11 મૂકતાં સમીકરણનું સમાધાન થાય છે. આ સમીકરણનો ઉકેલ 11 જે એક પ્રાકૃતિક સંખ્યા (Natural Number) છે. જ્યારે સમીકરણ

$$x + 5 = 5 \quad (2)$$

સમીકરણ (2)નો ઉકેલ પૂર્ણ સંખ્યા (Whole Number) 0 (શૂન્ય) છે. જો આપણે માત્ર પ્રાકૃતિક સંખ્યા જ વિચારીએ તો સમીકરણ (2) ઉકેલી શકાય નહિ. સમીકરણ (2)ને ઉકેલવા માટે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સમૂહમાં 0 (શૂન્ય) ઉમેરવું પડે છે. આમ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં 0 (શૂન્ય) ઉમેરતાં પૂર્ણ સંખ્યાઓ મળે. પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ કેટલાંક સમીકરણ ઉકેલવા માટે પૂરતી નથી. જેવાં કે,

$$x + 18 = 5 \quad (3)$$

તમે નિરીક્ષણ કર્યું કે, આવું કેમ ? આ સમીકરણ (3)ના ઉકેલ માટે (-13) સંખ્યાની જરૂર પડે છે. આ બાબત આપણને પૂર્ણાંક (ધન અને ઋણ) સંખ્યા તરફ દોરી જાય છે. અહીં નોંધીએ કે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને સંલગ્ન છે. હવે કોઈ એમ પણ વિચારી શકે કે આપણી પાસે સુરેખ સમીકરણોને ઉકેલવા માટે પૂરતી સંખ્યામાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે.

હવે નીચેનાં સમીકરણો ચકાસો.

$$2x = 3 \quad (4)$$

$$5x + 7 = 0 \quad (5)$$

ઉપરનાં કયાં સમીકરણો માટે આપણને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ઉકેલ તરીકે મળતી નથી. (તપાસો) આ બાબતની ચકાસણી કરતાં સમીકરણ (4) માટે  $\frac{3}{2}$  અને સમીકરણ (5) માટે  $-\frac{7}{5}$  સંખ્યાની જરૂર પડે છે. આ બાબત આપણને સંમેય સંખ્યા તરફ દોરી જાય છે.

આપણે સંમેય સંખ્યા પરની મૂળભૂત ક્રિયાઓ જોઈ ગયાં છીએ. હવે આપણે અત્યાર સુધી શીખેલ જુદા જુદા પ્રકારની સંખ્યાઓ માટેની ગાણિતિક ક્રિયાઓના ગુણધર્મો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.



## 1.2 સંમેય સંખ્યાઓના ગુણધર્મો

## 1.2.1 સંવૃત્તતા (Closure)

## (i) પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole numbers)

આવો, ફરી એક વખત સંક્ષેપમાં પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે બધી ક્રિયાઓ પર સંવૃત્તતાના ગુણધર્મની ચર્ચા કરીએ.



ક્રિયા	સંખ્યાઓ	નોંધ
સરવાળો	$0 + 5 = 5$ , પૂર્ણ સંખ્યા છે. $4 + 7 = \dots$ શું આ પૂર્ણ સંખ્યા છે ? સામાન્ય રીતે, કોઈપણ બે પૂર્ણ સંખ્યા $a$ અને $b$ માટે $a + b$ પૂર્ણ સંખ્યા છે.	સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે.
બાદબાકી	$5 - 7 = -2$ એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી.	બાદબાકીની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત્ત નથી.
ગુણાકાર	$0 \times 3 = 0$ , પૂર્ણ સંખ્યા છે. $3 \times 7 = \dots$ શું આ પૂર્ણ સંખ્યા છે ? સામાન્ય રીતે જો $a$ અને $b$ કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓ હોય તો તેનો ગુણાકાર $ab$ પણ પૂર્ણ સંખ્યા જ હોય.	ગુણાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે.
ભાગાકાર	$5 \div 8 = \frac{5}{8}$ , એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી.	ભાગાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત્ત નથી.

તમે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સંદર્ભમાં પાયાની ચાર ક્રિયાઓ માટે સંવૃત્તતાના ગુણધર્મોની ચકાસણી કરો.

## (ii) પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (Integers numbers)

હવે આપણે ફરીથી યાદ કરી લઈએ કે કઈ ક્રિયાઓ અંગે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે.

ક્રિયા	સંખ્યાઓ	નોંધ
સરવાળો	$-6 + 5 = -1$ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. $-7 + (-5)$ શું પૂર્ણાંક સંખ્યા છે ? શું $8 + 5$ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે ? સામાન્ય રીતે કોઈ બે પૂર્ણાંકો $a$ અને $b$ માટે, $a + b$ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે.	સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે.
બાદબાકી	$7 - 5 = 2$ , એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. શું $5 - 7$ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે ? $-6 - 8 = -14$ , એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. $-6 - (-8) = 2$ , એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. શું $8 - (-6)$ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે ? સામાન્ય રીતે કોઈ બે પૂર્ણાંકો $a$ અને $b$ માટે $a - b$ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. ચકાસો કે $b - a$ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે.	બાદબાકીની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે.

ગુણાકાર	$5 \times 8 = 40$ , એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. શું $-5 \times 8$ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે ? $-5 \times (-8) = 40$ , એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ $a$ અને $b$ માટે, $a \times b$ પણ એક પૂર્ણાંક સંખ્યા છે.	ગુણાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે.
ભાગાકાર	$5 \div 8 = \frac{5}{8}$ , એ પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી.	ભાગાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત્ત નથી.



તમે જોયું કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સરવાળા અને ગુણાકારની ક્રિયા માટે સંવૃત્ત છે પણ બાદબાકી અને ભાગાકારની ક્રિયા માટે સંવૃત્ત નથી. જ્યારે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સરવાળો, બાદબાકી અને ગુણાકારની ક્રિયા માટે સંવૃત્ત છે, પણ ભાગાકારની ક્રિયા માટે સંવૃત્ત નથી.

### (iii) સંમેય સંખ્યાઓ (Rational numbers)

તમે યાદ કરો કે જે સંખ્યાને  $\frac{p}{q}$ , (જ્યાં  $p$  અને  $q$  પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે અને  $q \neq 0$ ) સ્વરૂપે લખી શકાય તેવી સંખ્યાને સંમેય સંખ્યાઓ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે :  $-\frac{2}{3}$ ,  $\frac{6}{7}$  એ સંમેય સંખ્યાઓ છે. જ્યારે 0, -2, 4 ને પણ  $\frac{p}{q}$  સ્વરૂપે લખી શકાય છે. તેથી તે પણ સંમેય સંખ્યાઓ છે. (ચકાસણી કરો !)

(a) બે સંમેય સંખ્યાઓનો સરવાળો કઈ રીતે થાય તે તમે જાણો છો. ચાલો, થોડી સંમેય સંખ્યાઓની જોડીઓનો સરવાળો કરીએ.

$$\frac{3}{8} + \frac{(-5)}{7} = \frac{21 + (-40)}{56} = \frac{-19}{56} \quad (\text{સંમેય સંખ્યા છે.})$$

$$\frac{-3}{8} + \frac{(-4)}{5} = \frac{-15 + (-32)}{40} = \dots \quad \text{શું આ સંમેય સંખ્યા છે ?}$$

$$\frac{4}{7} + \frac{6}{11} = \dots \quad \text{શું આ સંમેય સંખ્યા છે ?}$$

આપણને બે સંમેય સંખ્યાઓનો સરવાળો કરતાં સંમેય સંખ્યા મળે છે. વધુ સંમેય સંખ્યાઓની જોડીઓ માટે ચકાસણી કરો.

આપણે કહી શકીએ કે સરવાળાની ક્રિયા માટે સંમેય સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે, અર્થાત્ કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓ  $a$  અને  $b$  માટે,  $a + b$  પણ સંમેય સંખ્યા મળે છે.

(b) શું બે સંમેય સંખ્યાઓનો તફાવત ફરીથી સંમેય સંખ્યા મળે ?

આપણી પાસે,

$$-\frac{5}{7} - \frac{2}{3} = \frac{-5 \times 3 - 2 \times 7}{21} = \frac{-29}{21} \quad (\text{સંમેય સંખ્યા છે.})$$

$$\frac{5}{8} - \frac{4}{5} = \frac{25-32}{40} = \dots$$

શું આ સંમેય સંખ્યા છે ?

$$\frac{3}{7} - \left(\frac{-8}{5}\right) = \dots$$

શું આ સંમેય સંખ્યા છે ?

થોડી વધુ સંમેય સંખ્યાઓની જોડીઓ માટે પ્રયત્ન કરો. આપણે કહી શકીએ કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે સંમેય સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે. અર્થાત્, બે સંમેય સંખ્યાઓ  $a$  અને  $b$  માટે,  $a - b$  પણ સંમેય સંખ્યા છે.

(c) ચાલો, બે સંમેય સંખ્યાઓના ગુણાકારની ક્રિયાઓમાં શું થાય છે તે આપણે જોઈએ.

$$\frac{-2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{-8}{15}; \quad \frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{35}$$

(બંનેનો ગુણાકાર સંમેય સંખ્યા છે.)

$$\frac{-4}{5} \times \frac{-6}{11} = \dots$$

શું આ સંમેય સંખ્યા છે ?

તમે સંમેય સંખ્યાઓની વધુ જોડીઓ લઈ ચકાસણી કરો કે તે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર ફરીથી સંમેય સંખ્યા આવે છે કે નહીં.

આપણે કહી શકીએ કે ગુણાકારની ક્રિયા માટે સંમેય સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે. કેમ કે કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓ  $a$  અને  $b$  માટે,  $a \times b$  પણ સંમેય સંખ્યા છે.

(d) આપણે નોંધીએ કે...  $\frac{-5}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{-25}{6}$

(સંમેય સંખ્યા છે.)

$$\frac{2}{7} \div \frac{5}{3} = \dots$$

શું આ સંમેય સંખ્યા છે ?

$$\frac{-3}{8} \div \frac{-2}{9} = \dots$$

શું આ સંમેય સંખ્યા છે ?

શું તમે કહી શકો કે સંમેય સંખ્યાઓ ભાગાકારની ક્રિયા માટે સંવૃત્ત છે ? કોઈ સંમેય સંખ્યા  $a$  માટે  $a \div 0$  એ અવ્યાખ્યાયિત છે. તેથી કહી શકાય કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે સંમેય સંખ્યાઓ સંવૃત્ત નથી. જો કે આપણે શૂન્યને અપવાદ ગણીએ તો કહી શકાય કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે સંમેય સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે.



### પ્રયત્ન કરો

નીચેના કોષ્ટકમાં ખાલી જગ્યા પૂરો :

સંખ્યાઓ	ક્રિયા માટે સંવૃત્ત			
	સરવાળો	બાદબાકી	ગુણાકાર	ભાગાકાર
સંમેય સંખ્યાઓ	હા	હા	...	ના
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ	...	હા	...	ના
પૂર્ણ સંખ્યાઓ	...	...	હા	...
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ	...	ના	...	...

## 1.2.2 ક્રમનો ગુણધર્મ (Commutativity)

### (i) પૂર્ણ સંખ્યાઓ

પૂર્ણ સંખ્યાઓની જુદી-જુદી ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી કોષ્ટકની ખાલી જગ્યા ભરો.

ક્રિયા	સંખ્યાઓ	નોંધ
સરવાળો	$0 + 7 = 7 + 0 = 7$ $2 + 3 = \dots + \dots = \dots$ કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓ $a$ અને $b$ માટે, $a + b = b + a$	સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
બાદબાકી	.....	બાદબાકીની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.
ગુણાકાર	.....	ગુણાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
ભાગાકાર	.....	ભાગાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.



તમે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે વિવિધ ક્રિયાઓ માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે કે નહીં તે જાતે ચકાસો.

### (ii) પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ

પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં વિવિધ ક્રિયાઓ માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે કે નહીં તે ચકાસણી કરી અને નીચેના કોષ્ટકમાં ખાલી જગ્યા પૂરો.

ક્રિયા	સંખ્યાઓ	નોંધ
સરવાળો	.....	સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
બાદબાકી	શું $5 - (-3) = -3 - 5$ ?	બાદબાકીની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.
ગુણાકાર	.....	ગુણાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
ભાગાકાર	.....	ભાગાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.

### (iii) સંમેય સંખ્યાઓ

#### (a) સરવાળો

તમે જાણો છો કે બે સંમેય સંખ્યાનો સરવાળો કઈ રીતે કરાય. ચાલો આપણે થોડીક સંમેય સંખ્યાઓના સરવાળા કરીએ.

$$\frac{-2}{3} + \frac{5}{7} = \frac{1}{21} \text{ અને } \frac{5}{7} + \left(\frac{-2}{3}\right) = \frac{1}{21}$$

$$\text{તેથી, } \frac{-2}{3} + \frac{5}{7} = \frac{5}{7} + \left(\frac{-2}{3}\right)$$

$$\text{વળી, } \frac{-6}{5} + \left(\frac{-8}{3}\right) = \dots \text{ અને } \frac{-8}{3} + \left(\frac{-6}{5}\right) = \dots$$

$$\text{શું } \frac{-6}{5} + \left(\frac{-8}{3}\right) = \left(\frac{-8}{3}\right) + \left(\frac{-6}{5}\right) \text{ છે ?}$$



$$\text{શું } \frac{-3}{8} + \frac{1}{7} = \frac{1}{7} + \left(\frac{-3}{8}\right) \text{ છે ?}$$

તમે જોયું કે બે સંમેય સંખ્યાઓનો કોઈ પણ ક્રમમાં સરવાળો કરીએ તો મળતી સંખ્યા સમાન જ આવે છે. તેથી કહી શકાય કે સંમેય સંખ્યાઓમાં સરવાળાની ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. જેમ કે, કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓ  $a$  અને  $b$  માટે,  $a + b = b + a$ .

(b) બાદબાકી

$$\text{શું } \frac{2}{3} - \frac{5}{4} = \frac{5}{4} - \frac{2}{3} \text{ છે ?}$$

$$\text{શું } \frac{1}{2} - \frac{3}{5} = \frac{3}{5} - \frac{1}{2} \text{ છે ?}$$

તમે જોશો કે સંમેય સંખ્યાઓમાં બાદબાકીની ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. અહીં નોંધો કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં બાદબાકીની ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંમેય સંખ્યાઓ પણ છે.

તેથી સંમેય સંખ્યાઓમાં બાદબાકીની ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.

(c) ગુણાકાર

$$\text{અહીં, } \frac{-7}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{-42}{15} = \frac{6}{5} \times \left(\frac{-7}{3}\right)$$

$$\text{શું } \frac{-8}{9} \times \left(\frac{-4}{7}\right) = \frac{-4}{7} \times \left(\frac{-8}{9}\right) \text{ છે ?}$$

આવી બીજી સંમેય સંખ્યાઓ લઈ ગુણાકાર માટે ક્રમના ગુણધર્મની ચકાસણી કરો.

તમને જાણવા મળશે કે બે સંમેય સંખ્યાઓનો કોઈ પણ ક્રમમાં ગુણાકાર કરીએ તો પણ મળતી સંખ્યા સમાન જ આવે છે. તેથી કહી શકાય કે સંમેય સંખ્યાઓમાં ગુણાકારની ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.

સામાન્ય રીતે  $a \times b = b \times a$  (કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓ  $a$  અને  $b$  માટે)

(d) ભાગાકાર

$$\text{શું } \frac{-5}{4} \div \frac{3}{7} = \frac{3}{7} \div \left(\frac{-5}{4}\right) \text{ છે ?}$$

તમે જોશો કે બંને બાજુઓ સમાન થતી નથી. તેથી કહી શકાય કે સંમેય સંખ્યાઓમાં ભાગાકારની ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.

### પ્રયત્ન કરો

નીચેનું કોષ્ટક પૂર્ણ કરો :



સંખ્યાઓ	ક્રમનો ગુણધર્મ			
	સરવાળો	બાદબાકી	ગુણાકાર	ભાગાકાર
સંમેય સંખ્યાઓ	હા	...	...	...
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ	...	ના	...	...
પૂર્ણ સંખ્યાઓ	...	...	હા	...
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ	...	...	...	ના

### 1.2.3 જૂથનો ગુણધર્મ (Associativity)

#### (i) પૂર્ણ સંખ્યાઓ

નીચેના કોષ્ટકની મદદથી પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે પાયાની ચાર ક્રિયાઓ માટે જૂથના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરો.

ક્રિયા	સંખ્યાઓ	નોંધ
સરવાળો	.....	સરવાળા માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
બાદબાકી	.....	બાદબાકી માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.
ગુણાકાર	શું $7 \times (2 \times 5) = (7 \times 2) \times 5$ ? શું $4 \times (6 \times 0) = (4 \times 6) \times 0$ ? કોઈ પણ ત્રણ પૂર્ણ સંખ્યાઓ $a, b$ અને $c$ માટે $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$	ગુણાકાર માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
ભાગાકાર	.....	ભાગાકાર માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.

ઉપરના કોષ્ટકમાં ખાલી જગ્યા પૂરી અને છેલ્લા ખાનામાં કરેલ નોંધની ચકાસણી કરો.

આ ઉપરાંત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે જૂથના ગુણધર્મની ચકાસણી જાતે કરો.

#### (ii) પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ

પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે ચાર ક્રિયાઓ અંગે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે કે કેમ તે નીચેના કોષ્ટકની મદદથી જોઈ શકાશે.

ક્રિયા	સંખ્યાઓ	નોંધ
સરવાળો	શું $(-2) + [3 + (-4)]$ $= [(-2) + 3] + (-4)$ થાય ? શું $(-6) + [(-4) + (-5)]$ $= [(-6) + (-4)] + (-5)$ થાય ? કોઈ પણ ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ $a, b$ અને $c$ માટે $a + (b + c) = (a + b) + c$	સરવાળાની ક્રિયામાં જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
બાદબાકી	$5 - (7 - 3) = (5 - 7) - 3$ થાય ?	બાદબાકીની ક્રિયામાં જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.
ગુણાકાર	શું $5 \times [(-7) \times (-8)]$ $= [5 \times (-7)] \times (-8)$ થાય ? શું $(-4) \times [(-8) \times (-5)]$ $= [(-4) \times (-8)] \times (-5)$ થાય ? કોઈ પણ ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ $a, b$ અને $c$ માટે, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$	ગુણાકારની ક્રિયામાં જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
ભાગાકાર	શું $[(-10) \div 2] \div (-5)$ $= (-10) \div [2 \div (-5)]$ થાય ?	ભાગાકારની ક્રિયામાં જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.



## (iii) સંમેય સંખ્યાઓ

## (a) સરવાળો

આપણી પાસે,

$$\frac{-2}{3} + \left[ \frac{3}{5} + \left( \frac{-5}{6} \right) \right] = \frac{-2}{3} + \left( \frac{-7}{30} \right) = \frac{-27}{30} = \frac{-9}{10}$$

$$\left[ \frac{-2}{3} + \frac{3}{5} \right] + \left( \frac{-5}{6} \right) = \frac{-1}{15} + \left( \frac{-5}{6} \right) = \frac{-27}{30} = \frac{-9}{10}$$

તેથી  $\frac{-2}{3} + \left[ \frac{3}{5} + \left( \frac{-5}{6} \right) \right] = \left[ \frac{-2}{3} + \frac{3}{5} \right] + \left( \frac{-5}{6} \right)$

ઉપરાંત,  $\frac{-1}{2} + \left[ \frac{3}{7} + \left( \frac{-4}{3} \right) \right]$  અને  $\left[ \frac{-1}{2} + \frac{3}{7} \right] + \left( \frac{-4}{3} \right)$  શોધો.

શું બંનેનો સરવાળો સમાન આવે છે ?

બીજી સંમેય સંખ્યાઓ લઈને ઉપર મુજબ સરવાળો કરો અને તપાસો કે બંને સમાન આવે છે ? આપણે જોઈ શકીશું કે સંમેય સંખ્યા માટે સરવાળાની ક્રિયામાં જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. તેથી કોઈ પણ સંમેય સંખ્યાઓ  $a, b$  અને  $c$  માટે,  $a + (b + c) = (a + b) + c$ .

## (b) બાદબાકી

તમે જાણો છો કે બાદબાકીની ક્રિયામાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી, તો સંમેય સંખ્યાઓ માટે

શું  $\frac{-2}{3} - \left[ \frac{-4}{5} - \frac{1}{2} \right] = \left[ \frac{-2}{3} - \left( \frac{-4}{5} \right) \right] - \frac{1}{2}$  થાય ?

ઉપરની બાબતની ચકાસણી તમારી જાતે કરો.

સંમેય સંખ્યાઓ માટે બાદબાકીની ક્રિયામાં જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.

## (c) ગુણાકાર

ચાલો આપણે ગુણાકારની ક્રિયા માટે જૂથના ગુણધર્મની ચકાસણી કરીએ.

$$\frac{-7}{3} \times \left( \frac{5}{4} \times \frac{2}{9} \right) = \frac{-7}{3} \times \frac{10}{36} = \frac{-70}{108} = \frac{-35}{54}$$

$$\left( \frac{-7}{3} \times \frac{5}{4} \right) \times \frac{2}{9} = \dots$$

આપણને મળશે કે,  $\frac{-7}{3} \times \left( \frac{5}{4} \times \frac{2}{9} \right) = \left( \frac{-7}{3} \times \frac{5}{4} \right) \times \frac{2}{9}$

શું  $\frac{2}{3} \times \left( \frac{-6}{7} \times \frac{4}{5} \right) = \left( \frac{2}{3} \times \frac{-6}{7} \right) \times \frac{4}{5}$  થાય ?

બીજી સંમેય સંખ્યાઓ લઈને ઉપર મુજબ ગુણાકાર કરો અને ચકાસો કે બંને ગુણાકાર સમાન આવે છે કે નહીં.

આપણે જોઈ શકીશું કે સંમેય સંખ્યા માટે ગુણાકારની ક્રિયામાં જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. તેથી કોઈ પણ ત્રણ સંમેય સંખ્યાઓ  $a, b$  અને  $c$  માટે,  $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$



(d) ભાગાકાર

યાદ કરો કે, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી, તો પછી સંમેય સંખ્યાઓ માટે શું ?

અહીં, જો  $\frac{1}{2} \div \left[ \frac{-1}{3} \div \frac{2}{5} \right] = \left[ \frac{1}{2} \div \left( \frac{-1}{3} \right) \right] \div \frac{2}{5}$  ચકાસીએ.

$$\text{ડા. બા.} = \frac{1}{2} \div \left[ \frac{-1}{3} \div \frac{2}{5} \right] = \frac{1}{2} \div \left( \frac{-1}{3} \times \frac{5}{2} \right) [\because \frac{5}{2} \text{ એ } \frac{2}{5} \text{ નો વ્યસ્ત છે.}]$$

$$= \frac{1}{2} \div \left( \frac{-5}{6} \right) = \dots$$

$$\text{જ. બા.} = \left[ \frac{1}{2} \div \left( \frac{-1}{3} \right) \right] \div \frac{2}{5}$$

$$= \left( \frac{1}{2} \times \frac{-3}{1} \right) \div \frac{2}{5} = \frac{-3}{2} \div \frac{2}{5} = \dots$$

શું ડા.બા. = જ.બા. થાય છે ? જાતે ચકાસણી કરો. તમને જાણવા મળશે કે સંમેય સંખ્યાઓ માટે ભાગાકારની ક્રિયામાં જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી.



પ્રયત્ન કરો

નીચેનું કોષ્ટક પૂર્ણ કરો :

સંખ્યાઓ	જૂથનો ગુણધર્મ			
	સરવાળો	બાદબાકી	ગુણાકાર	ભાગાકાર
સંમેય સંખ્યાઓ	...	...	...	ના
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ	...	...	હા	...
પૂર્ણ સંખ્યાઓ	હા	...	...	...
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ	...	ના	...	...



ઉદાહરણ 1 :  $\frac{3}{7} + \left( \frac{-6}{11} \right) + \left( \frac{-8}{21} \right) + \left( \frac{5}{22} \right)$ ની કિંમત શોધો.

$$\text{ઉકેલ : } \frac{3}{7} + \left( \frac{-6}{11} \right) + \left( \frac{-8}{21} \right) + \left( \frac{5}{22} \right)$$

$$= \frac{198}{462} + \left( \frac{-252}{462} \right) + \left( \frac{-176}{462} \right) + \left( \frac{105}{462} \right) [7, 11] 21 \text{ અને } 22\text{નો લ.સા.અ. } 462 \text{ થાય.}]$$

$$= \frac{198 - 252 - 176 + 105}{462} = \frac{-125}{462}$$

આ ઉદાહરણ નીચે પ્રમાણે પણ ઉકેલી શકાય :

$$\begin{aligned} & \frac{3}{7} + \left(\frac{-6}{11}\right) + \left(\frac{-8}{21}\right) + \frac{5}{22} \\ &= \left[\frac{3}{7} + \left(\frac{-8}{21}\right)\right] + \left[\frac{-6}{11} + \frac{5}{22}\right] \quad (\text{ક્રમના અને જૂથના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરતાં}) \\ &= \left[\frac{9 + (-8)}{21}\right] + \left[\frac{-12 + 5}{22}\right] \end{aligned}$$

[7 અને 21નો લ.સા.અ 21; 11 અને 22નો લ.સા.અ. 22]

$$= \frac{1}{21} + \left(\frac{-7}{22}\right)$$

$$= \frac{22 - 147}{462}$$

$$= \frac{-125}{462}$$

શું તમને લાગે છે કે ક્રમનો ગુણધર્મ અને જૂથનો ગુણધર્મ આ ગણતરીને સરળ બનાવે છે ?

**ઉદાહરણ 2 :** ક્રિમત શોધો :  $\frac{-4}{5} \times \frac{3}{7} \times \frac{15}{16} \times \left(\frac{-14}{9}\right)$

**ઉકેલ :** આપણી પાસે  $\frac{-4}{5} \times \frac{3}{7} \times \frac{15}{16} \times \left(\frac{-14}{9}\right)$

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{-4 \times 3}{5 \times 7}\right] \times \left[\frac{15 \times (-14)}{16 \times 9}\right] \\ &= \frac{-12}{35} \times \left(\frac{-35}{24}\right) = \frac{-12 \times (-35)}{35 \times 24} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

આ ગણતરી બીજી રીતે પણ કરી શકાય.

$$\frac{-4}{5} \times \frac{3}{7} \times \frac{15}{16} \times \left(\frac{-14}{9}\right)$$

$$= \left(-\frac{4}{5} \times \frac{15}{16}\right) \times \left[\frac{3}{7} \times \left(\frac{-14}{9}\right)\right] \quad (\text{ક્રમના અને જૂથના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરતાં})$$

$$= \frac{-3}{4} \times \left(\frac{-2}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

### 1.2.4 શૂન્યની ભૂમિકા

નીચેના પદ જુઓ :

$$2 + 0 = 0 + 2 = 2$$

(પૂર્ણ સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરતાં)

$$-5 + 0 = \dots + \dots = -5$$

(પૂર્ણાંક સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરતાં)

$$\frac{-2}{7} + \dots = 0 + \left(\frac{-2}{7}\right) = \frac{-2}{7}$$

(સંમેય સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરતાં)





તમે આવા સરવાળા પહેલાં પણ કરેલ છે. ચાલો, આવા બીજા વધુ સરવાળા કરીએ.

તમે શું જોયું ? જ્યારે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરવામાં આવે તો મળતી સંખ્યા પણ પૂર્ણાંક છે. આવું પૂર્ણાંક અને સંમેય સંખ્યા માટે પણ બને છે.

સામાન્ય રીતે,  $a + 0 = 0 + a = a$  જ્યાં,  $a$  એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે.  
 $b + 0 = 0 + b = b$  જ્યાં  $b$  એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે.  
 $c + 0 = 0 + c = c$  જ્યાં  $c$  એ સંમેય સંખ્યા છે.

આમ, શૂન્યને સરવાળા માટેનો તટસ્થ ઘટક (એકમ ઘટક) કહે છે. તે પૂર્ણાંક અને પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે પણ સરવાળાનો તટસ્થ ઘટક છે.

### 1.2.5 1ની ભૂમિકા

અહીં,

$$5 \times 1 = 5 = 1 \times 5 \quad (\text{પૂર્ણાંક સંખ્યાને 1 વડે ગુણતાં})$$

$$\frac{-2}{7} \times 1 = \dots \times \dots = \frac{-2}{7}$$

$$\frac{3}{8} \times \dots = 1 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$$

તમે શું જોયું ?

જ્યારે આપણે સંમેય સંખ્યાને 1 વડે ગુણીએ છીએ, ત્યારે એ જ સંમેય સંખ્યા નીપજ તરીકે મળે છે. આ બાબતની અન્ય સંમેય સંખ્યાઓ સાથે ગુણાકાર કરી ચકાસણી કરો. આપણને જોવા મળશે. કોઈ પણ સંમેય સંખ્યા  $a$  માટે  $a \times 1 = 1 \times a = a$ .

આપણે કહી શકીએ કે 1 એ ગુણાકાર માટેનો તટસ્થ ઘટક (એકમ ઘટક) છે.

શું 1 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે તટસ્થ ઘટક છે ? શું તે પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે તટસ્થ ઘટક છે ?

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

જો કોઈ ગુણધર્મ સંમેય સંખ્યા માટે સાચો હોય તો તે પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે પણ સાચો હોય ? પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે શું કહી શકાય ? ક્યારે સાચો અને ક્યારે સાચો નહીં ?



### 1.2.6 સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યા (Negative of a Number)

જ્યારે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો અભ્યાસ કરતાં હતાં ત્યારે વિરોધી પૂર્ણાંકો પણ જોઈ ગયા છીએ. 1ની વિરોધી સંખ્યા શું ? તે  $-1$  છે, કેમ કે  $1 + (-1) = (-1) + 1 = 0$

તેથી શું આપણે કહી શકીએ કે  $(-1)$  ની વિરોધી સંખ્યા કઈ ? તેનો જવાબ 1 છે.

તેમજ,  $2 + (-2) = (-2) + 2 = 0$ , તેથી આપણે કહી શકીએ છે કે 2ની વિરોધી સંખ્યા અથવા વિરોધી ઘટક  $-2$  અને તેનું ઉલટું પણ કહી શકીએ કે  $-2$  ની વિરોધી સંખ્યા 2 છે. સામાન્ય રીતે, કોઈ પૂર્ણાંક  $a$  માટે,  $a + (-a) = (-a) + a = 0$ . તેથી  $a$  એ  $-a$ ની વિરોધી સંખ્યા છે. તેમજ  $-a$  એ  $+a$ ની વિરોધી સંખ્યા છે.

સંમેય સંખ્યા  $\frac{2}{3}$  માટે,

$$\frac{2}{3} + \left(\frac{-2}{3}\right) = \frac{2 + (-2)}{3} = 0$$

## 12 ■ ગણિત

વળી,  $\left(\frac{-2}{3}\right) + \frac{2}{3} = 0$  (શુ માટે ?)

તેવી જ રીતે,  $\frac{-8}{9} + \dots = \dots + \left(\frac{-8}{9}\right) = 0$

$$\dots + \left(\frac{-11}{7}\right) = \left(\frac{-11}{7}\right) + \dots = 0$$

આમ, વ્યાપક રૂપે, કોઈ સંમેય સંખ્યા  $\frac{a}{b}$  માટે, જો  $\frac{a}{b} + \left(\frac{-a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right) + \left(\frac{a}{b}\right) = 0$ , તો આપણે

કહી શકીએ કે  $\frac{-a}{b}$  એ  $\frac{a}{b}$ ની વિરોધી સંખ્યા (Additive Inverse) છે. તેમજ ઊલટી રીતે પણ કહી

શકાય કે  $\frac{a}{b}$  એ  $\frac{-a}{b}$ ની વિરોધી સંખ્યા છે.

### 1.2.7 વ્યસ્ત સંખ્યા (Reciprocal)

કઈ સંખ્યા વડે  $\frac{8}{21}$ ને ગુણવાથી મળતી સંખ્યા 1 હોય ? સ્પષ્ટ છે કે તે સંખ્યા  $\frac{21}{8}$  જ હોય કેમ કે,

$$\frac{8}{21} \times \frac{21}{8} = 1$$

તેવી જ રીતે  $\frac{-5}{7}$  ને  $\frac{7}{-5}$  વડે ગુણવાથી 1 મળે.

આમ, આપણે કહી શકીએ કે,  $\frac{8}{21}$ ની વ્યસ્ત સંખ્યા  $\frac{21}{8}$  છે, જ્યારે  $\frac{-5}{7}$ ની વ્યસ્ત સંખ્યા  $\frac{7}{-5}$  છે.

તમે કહી શકશો કે શૂન્યની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ ?

શું એવી કોઈ સંમેય સંખ્યા મળે કે જેને 0 સાથે ગુણવાથી 1 મળે ? ના, તેથી આપણે કહી શકીએ કે

શૂન્યની વ્યસ્ત સંખ્યા ન મળે. તેથી આપણે કહી શકીએ કે સંમેય સંખ્યા  $\frac{c}{d}$  માટે, જો કોઈ શૂન્યેતર

સંમેય સંખ્યા  $\frac{a}{b}$  હોય અને  $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = 1$ , તો  $\frac{c}{d}$  એ  $\frac{a}{b}$ ની વ્યસ્ત સંખ્યા (Reciprocal) છે.

### 1.2.8 સંમેય સંખ્યા માટે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન

આ બાબતને સમજવા માટે, ચાલો  $\frac{-3}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$  અને  $\frac{-5}{6}$  સંમેય સંખ્યાઓ લઈએ.

$$\text{હવે, } \frac{-3}{4} \times \left\{ \frac{2}{3} + \left(\frac{-5}{6}\right) \right\} = \frac{-3}{4} \times \left\{ \frac{(4) + (-5)}{6} \right\}$$

$$= \frac{-3}{4} \times \left(\frac{-1}{6}\right) = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

$$\text{પણ } \frac{-3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{-3 \times 2}{4 \times 3} = \frac{-6}{12} = \frac{-1}{2}$$

$$\text{અને } \frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6} = \frac{5}{8}$$

$$\text{આથી, } \left(\frac{-3}{4} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6}\right) = \frac{-1}{2} + \frac{5}{8} = \frac{1}{8}$$

$$\text{આમ, } \frac{-3}{4} \times \left\{\frac{2}{3} + \left(\frac{-5}{6}\right)\right\} = \left(\frac{-3}{4} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6}\right)$$

ગુણાકારનું સરવાળા પર અને બાદબાકી પર વિભાજન

કોઈ પણ સંમેય સંખ્યા  $a$ ,  $b$  અને  $c$  માટે,

$$a(b+c) = ab+ac$$

$$a(b-c) = ab-ac$$

### પ્રયત્ન કરો

વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી શોધો : (i)  $\left\{\frac{7}{5} \times \left(\frac{-3}{12}\right)\right\} + \left\{\frac{7}{5} \times \frac{5}{12}\right\}$  (ii)  $\left\{\frac{9}{16} \times \frac{4}{12}\right\} + \left\{\frac{9}{16} \times \frac{-3}{9}\right\}$

**ઉદાહરણ 3 :** નીચે આપેલ સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યાઓ જણાવો :

(i)  $\frac{-7}{19}$

(ii)  $\frac{21}{112}$

**ઉકેલ :** (i)  $\frac{7}{19}$  એ  $\frac{-7}{19}$ ની વિરોધી સંખ્યા છે, કેમ કે

$$\frac{-7}{19} + \frac{7}{19} = \frac{-7+7}{19} = \frac{0}{19} = 0$$

(ii)  $\frac{-21}{112}$  એ  $\frac{21}{112}$ ની વિરોધી સંખ્યા છે. (ચકાસણી કરો.)

જ્યારે તમે વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે તમે કોઈ એક ગુણાકારને બે ગુણાકારોના સરવાળા અથવા બાદબાકી સ્વરૂપે વિભાજિત કરો છો.

**ઉદાહરણ 4 :** નીચે આપેલ સંખ્યાને  $x$  તરીકે લઈ ચકાસો કે  $-(-x) = x$ .

(i)  $x = \frac{13}{17}$

(ii)  $x = \frac{-21}{31}$

**ઉકેલ :** (i) અહીં,  $x = \frac{13}{17}$  છે.

$$x = \frac{13}{17} \text{ ની વિરોધી સંખ્યા } -x = \frac{-13}{17} \text{ હોવાથી } \frac{13}{17} + \left(\frac{-13}{17}\right) = 0$$

$$\text{સમતા } \frac{13}{17} + \left(\frac{-13}{17}\right) = 0 \text{ દર્શાવે છે કે } \frac{13}{17} \text{ ની વિરોધી સંખ્યા } \frac{-13}{17} \text{ છે.}$$

$$\text{અથવા } -\left(\frac{-13}{17}\right) = \frac{13}{17} \text{ એટલે કે } -(-x) = x$$

(ii)  $x = \frac{-21}{31}$ ની વિરોધી સંખ્યા  $-x = \frac{21}{31}$  હોવાથી  $\frac{-21}{31} + \frac{21}{31} = 0$

$$\text{સમતા } \frac{-21}{31} + \frac{21}{31} = 0 \text{ દર્શાવે છે કે } \frac{-21}{31} \text{ ની વિરોધી સંખ્યા } \frac{21}{31} \text{ છે.}$$

$$\text{એટલે કે } -(-x) = x.$$

**ઉદાહરણ 5 :** કિંમત શોધો :  $\frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{1}{14} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5}$

**ઉકેલ :** અહીં,  $\frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{1}{14} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5} - \frac{1}{14}$  [ક્રમનો ગુણધર્મ]

$$= \frac{2}{5} \times \left(\frac{-3}{7}\right) + \left(\frac{-3}{7}\right) \times \frac{3}{5} - \frac{1}{14}$$

$$= \frac{-3}{7} \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right) - \frac{1}{14}$$
 [વિભાજનનો ગુણધર્મ]
$$= \frac{-3}{7} \times 1 - \frac{1}{14}$$

$$= \frac{-6-1}{14}$$

$$= \frac{-1}{2}$$

## સ્વાધ્યાય 1.1

1. યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી કિંમત શોધો.

(i)  $\frac{-2}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{5}{2} - \frac{3}{5} \times \frac{1}{6}$  (ii)  $\frac{2}{5} \times \left(\frac{-3}{7}\right) - \frac{1}{6} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{14} \times \frac{2}{5}$

2. નીચે આપેલ સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યા લખો.

(i)  $\frac{2}{8}$  (ii)  $\frac{-5}{9}$  (iii)  $\frac{-6}{-5}$  (iv)  $\frac{2}{-9}$

(v)  $\frac{19}{-6}$

3. ચકાસણી કરો :  $-(-x) = x$

(i)  $x = \frac{11}{15}$  (ii)  $x = -\frac{13}{17}$

4. નીચે આપેલ સંખ્યાનો વ્યસ્ત જણાવો.

(i)  $-13$  (ii)  $\frac{-13}{19}$  (iii)  $\frac{1}{5}$  (iv)  $\frac{-5}{8} \times \frac{-3}{7}$

(v)  $-1 \times \frac{-2}{5}$  (vi)  $-1$

5. નીચે આપેલ ગુણાકારની ક્રિયામાં કયા ગુણધર્મનો ઉપયોગ થયેલ છે તે જણાવો.

(i)  $\frac{-4}{5} \times 1 = 1 \times \frac{-4}{5} = -\frac{4}{5}$  (ii)  $\frac{-13}{17} \times \frac{-2}{7} = \frac{-2}{7} \times \frac{-13}{17}$

(iii)  $\frac{-19}{29} \times \frac{29}{-19} = 1$

6. સંખ્યા  $\frac{6}{13}$  ને  $\frac{-7}{16}$  ના વ્યસ્ત વડે ગુણો.

7.  $\frac{1}{3} \times \left(6 \times \frac{4}{3}\right)$  ની  $\left(\frac{1}{3} \times 6\right) \times \frac{4}{3}$  રીતે ગણતરી કયા ગુણધર્મના ઉપયોગથી કરી શકાય તે જણાવો.

8. શું  $\frac{8}{9}$  એ સંખ્યા  $-1\frac{1}{8}$  નો વ્યસ્ત છે ? કેમ અથવા કેમ નહીં ?

9. શું  $0.3$  એ  $3\frac{1}{3}$  નો વ્યસ્ત છે ? કેમ અથવા કેમ નહીં ?




10. લખો.
- એવી સંમેય સંખ્યા કે જેનો વ્યસ્ત ન હોય.
  - એવી સંમેય સંખ્યાઓ કે જે તેના વ્યસ્તને સમાન હોય.
  - એવી સંમેય સંખ્યા કે જે તેની વિરોધી સંખ્યાને સમાન હોય.
11. નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો.
- શૂન્યનો વ્યસ્ત \_\_\_\_\_ .
  - સંખ્યાઓ \_\_\_\_\_ અને \_\_\_\_\_ પોતાના જ વ્યસ્ત છે.
  - 5 ની વ્યસ્ત સંખ્યા \_\_\_\_\_ છે.
  - $\frac{1}{x}$  ની વ્યસ્ત સંખ્યા \_\_\_\_\_ છે, કે જ્યાં  $x \neq 0$ .
  - બે સંમેય સંખ્યાનો ગુણાકાર હંમેશા \_\_\_\_\_ જ હોય.
  - ધન સંમેય સંખ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા \_\_\_\_\_ હોય.

### 1.3 સંમેય સંખ્યાનું સંખ્યારેખા પર નિરૂપણ

તમે સંખ્યારેખા પર પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા અને સંમેય સંખ્યાનું નિરૂપણ અગાઉ શીખી ગયા છો. ચાલો, આપણે તેનું પુનરાવર્તન કરી લઈએ.




પ્રાકૃતિક સંખ્યા :




અહીં સંખ્યારેખા એ 1ની માત્ર જમણી બાજુ જ અનંત રીતે વિસ્તરે છે.

પૂર્ણ સંખ્યા :




અહીં સંખ્યારેખા એ 0ની માત્ર જમણી બાજુ જ અનંત રીતે વિસ્તરે છે, 0ની ડાબી બાજુ કોઈ સંખ્યા હોતી નથી.

પૂર્ણાંક સંખ્યા :




અહીં સંખ્યારેખા બંને બાજુ અનંત રીતે વિસ્તરે છે. શું તમને -1 અને 0; 0 અને 1 વગેરેની વચ્ચે કોઈ સંખ્યા જોવા મળી ?

સંમેય સંખ્યા :



અહીં સંખ્યારેખા બંને બાજુ અનંત રીતે વિસ્તરે છે પરંતુ -1 અને 0; 0 અને 1 વગેરે વચ્ચે બીજી સંખ્યાઓ પણ જોવા મળે છે.




ઉપર સંખ્યારેખા(iv)માં 0 અને 1ની બરોબર વચ્ચે એક બિંદુ આવે છે, જેને  $\frac{1}{2}$  વડે દર્શાવેલ છે. વળી,

સંખ્યારેખા(v)માં બિંદુ  $\frac{1}{3}$  એ 0 થી 1ના ત્રણ સરખા ભાગ કરે છે, તેથી તેને  $\frac{1}{3}$  વડે દર્શાવેલ છે. તમે


સંખ્યારેખા(v)માં બીજો ભાગ કે જેને (?) વડે દર્શાવેલ છે, ત્યાં કઈ સંમેય સંખ્યા લખશો ?




આ બિંદુ 0 થી જમણી બાજુ  $\frac{1}{3}$  થી બમણું દૂર છે. તેથી તેને  $\frac{2}{3}$  વડે દર્શાવીશું. આ જ રીતે તમે સરખા ભાગ કરીને સંખ્યારેખા પર સંખ્યાઓ દર્શાવી શકો છો. આ પ્રમાણે પછીનું બિંદુ 1 થી દર્શાવેલ છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે  $\frac{3}{3}$  અને 1 એ એક જ બિંદુ છે. ત્યાર પછી  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{5}{3}$ ,  $\frac{6}{3}$  (અથવા 2),  $\frac{7}{3}$  વગેરે આવે જે સંખ્યારેખા (vi) પર દર્શાવેલ છે.



તેવી જ રીતે,  $\frac{1}{8}$  સંખ્યાને સંખ્યારેખા પર દર્શાવવા માટે 0 થી 1 વચ્ચેની સંખ્યારેખાના આઠ સરખા ભાગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે,





અહીં આપણે પ્રથમ ભાગના બિંદુને  $\frac{1}{8}$  તરીકે દર્શાવીશું. બીજા ભાગના બિંદુને  $\frac{2}{8}$ , ત્રીજા ભાગના બિંદુને  $\frac{3}{8}$  તેવી જ રીતે ક્રમશઃ આગળ બિંદુઓને દર્શાવીશું. જે સંખ્યારેખા (vii)માં બતાવેલ છે.




કોઈ પણ સંખ્યાનું આ રીતે સંખ્યારેખા પર નિરૂપણ કરી શકાય. આપણે જાણીએ છીએ કે સંખ્યારેખામાં છેદમાં આપેલ સંખ્યા એ એક એકમના કેટલા ભાગ કરવા તે બતાવે છે. જ્યારે અંશમાં આપેલ સંખ્યા તે કરવામાં આવેલ ભાગમાંથી કેટલામો ભાગ છે તે દર્શાવે છે. તેથી સંખ્યા  $\frac{4}{9}$  નો અર્થ એ કે 9 સમાન ભાગનો ચોથો ભાગ કે જે શૂન્યની જમણી બાજુ છે.

[સંખ્યારેખા (viii)] અને  $\frac{-7}{4}$  માટે  $\frac{1}{4}$  લંબાઈવાળા 7 ભાગ કરવાના કે જે શૂન્યથી ડાબી બાજુ હોય અને સાતમો ભાગ એ  $\frac{-7}{4}$  દર્શાવે છે. [સંખ્યારેખા (ix)]



## પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલ સંખ્યારેખામાં અંગ્રેજી મૂળાક્ષરથી દર્શાવેલ બિંદુઓને સંમેય સંખ્યાથી દર્શાવો :



## 1.4 બે સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંમેય સંખ્યાઓ

શું તમે 1 અને 5 વચ્ચેની પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહી શકો ?

તે 2, 3 અને 4 છે. 7 અને 9 ની વચ્ચે કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે ?

માત્ર એક અને તે સંખ્યા 8 છે.

10 અને 11 ની વચ્ચે કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે ? સ્પષ્ટ છે કે એક પણ નહિ.

-5 અને 4 વચ્ચે આવતી પૂર્ણાંક સંખ્યાની યાદી બનાવો. તે યાદી -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 છે.

-1 અને 1 વચ્ચે કેટલી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય ?

-9 અને -10 વચ્ચે કેટલી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય ?

અહીં, તમને બે પ્રાકૃતિક કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વચ્ચે આવેલી પ્રાકૃતિક કે પૂર્ણાંક સંખ્યાની ચોક્કસ સંખ્યા મળશે.

$\frac{3}{10}$  અને  $\frac{7}{10}$  વચ્ચે કેટલી સંમેય સંખ્યાઓ મળશે ?

તમને એમ થશે કે તે સંખ્યાઓ માત્ર  $\frac{4}{10}$ ,  $\frac{5}{10}$  અને  $\frac{6}{10}$  છે.

પરંતુ તમે  $\frac{3}{10}$  ને  $\frac{30}{100}$  અને  $\frac{7}{10}$  ને  $\frac{70}{100}$  વડે લખી શકો. તેથી સંખ્યાઓ  $\frac{31}{100}$ ,  $\frac{32}{100}$ ,  $\frac{33}{100}$ , ...  $\frac{68}{100}$ ,

$\frac{69}{100}$ . આ બધી જ સંખ્યાઓ  $\frac{3}{10}$  અને  $\frac{7}{10}$  ની વચ્ચે આવેલી હોય છે. આ 39 સંખ્યાઓ થાય.

ઉપરાંત  $\frac{3}{10}$  ને  $\frac{3000}{10000}$  વડે અને  $\frac{7}{10}$  ને  $\frac{7000}{10000}$  વડે પણ દર્શાવી શકાય. તેથી આપણને  $\frac{3001}{10000}$ ,

$\frac{3002}{10000}$ ,  $\frac{3003}{10000}$ , ...,  $\frac{6998}{10000}$ ,  $\frac{6999}{10000}$  સંખ્યાઓ પણ  $\frac{3}{10}$  અને  $\frac{7}{10}$  વચ્ચે આવેલી સંખ્યાઓ છે. આ સંખ્યાઓ 3999 જેટલી થાય.

આ રીતે આગળ ને આગળ આપણે  $\frac{3}{10}$  અને  $\frac{7}{10}$  વચ્ચે સંમેય સંખ્યાઓ ઉમેરતાં જઈ શકીએ. તેથી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જેમ, બે સંખ્યાઓની વચ્ચે આવેલ સંમેય સંખ્યાઓની સંખ્યા નિશ્ચિત નથી. અહીં બીજું ઉદાહરણ પણ આપેલ છે.

$\frac{-1}{10}$  અને  $\frac{3}{10}$  વચ્ચે કેટલી સંમેય સંખ્યાઓ હશે ?

સ્પષ્ટ છે કે  $\frac{0}{10}$ ,  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{2}{10}$  સંમેય સંખ્યાઓ  $\frac{-1}{10}$  અને  $\frac{3}{10}$  વચ્ચે છે.



4XHNPU

જો આપણે  $\frac{-1}{10}$  ને  $\frac{-10000}{100000}$  અને  $\frac{3}{10}$  ને  $\frac{30000}{100000}$  વડે દર્શાવીએ, તો આપણને  $\frac{-9999}{100000}$ ,  $\frac{-9998}{100000}$ , ...,  $\frac{-29998}{100000}$ ,  $\frac{-29999}{100000}$  સંખ્યાઓ  $\frac{-1}{10}$  અને  $\frac{3}{10}$  વચ્ચે મળે.

આમ, આપણે કહી શકીએ કે આપેલ કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચે આપણને અગણિત સંમેય સંખ્યાઓ મળે.

**ઉદાહરણ 6 :**  $-2$  અને  $0$  વચ્ચે આવતી કોઈ પણ ત્રણ સંમેય સંખ્યા લખો.

**ઉકેલ :**  $-2$  ને  $\frac{-20}{10}$  અને  $0$  ને  $\frac{0}{10}$  વડે દર્શાવી શકાય.

તેથી  $\frac{-19}{10}$ ,  $\frac{-18}{10}$ ,  $\frac{-17}{10}$ ,  $\frac{-16}{10}$ ,  $\frac{-15}{10}$ , ...,  $\frac{-1}{10}$  એ  $-2$  અને  $0$  ની વચ્ચે આવતી સંમેય સંખ્યાઓ છે.

**ઉદાહરણ 7 :**  $\frac{-5}{6}$  અને  $\frac{5}{8}$  વચ્ચે આવતી કોઈ પણ દસ સંમેય સંખ્યાઓ લખો.

**ઉકેલ :** સૌ પ્રથમ આપણે  $\frac{-5}{6}$  અને  $\frac{5}{8}$  ને સમચ્છેદી બનાવીશું. એટલે કે બંને સંખ્યાઓના છેદ સરખા કરીશું.

તેથી  $\frac{-5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{-20}{24}$  અને  $\frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{15}{24}$

તેથી  $\frac{-19}{24}$ ,  $\frac{-18}{24}$ ,  $\frac{-17}{24}$ , ...,  $\frac{14}{24}$  એ સંખ્યાઓ  $\frac{-20}{24}$  અને  $\frac{15}{24}$  વચ્ચે આવેલી સંમેય સંખ્યાઓ છે. આમાંથી આપણે ગમે તે 10 લઈ શકીએ.

## બીજી રીત

ચાલો આપણે  $1$  અને  $2$  વચ્ચે આવતી સંમેય સંખ્યાઓ શોધીએ.  $1.5$  અથવા  $1\frac{1}{2}$  અથવા  $\frac{3}{2}$  એ  $1$  અને  $2$  વચ્ચે આવતી સંખ્યાઓ પૈકીની એક સંખ્યા છે. જે  $1$  અને  $2$ નો મધ્યક છે. તમે ધોરણ 7 માં મધ્યક વિશે શીખી ગયા છો.

આપણે કહી શકીએ કે, આપેલ કોઈ પણ બે સંખ્યાઓ માટે, એવું જરૂરી નથી કે આપેલ બે સંખ્યાઓની વચ્ચે એક પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે, પરંતુ એક સંમેય સંખ્યા તો અવશ્ય મળે.

આપણે મધ્યકના ખ્યાલનો ઉપયોગ કરી આપેલ બે સંમેય સંખ્યાઓની વચ્ચે આપેલ સંમેય સંખ્યાઓ શોધીશું.


**ઉદાહરણ 8 :**  $\frac{1}{4}$  અને  $\frac{1}{2}$  વચ્ચે આવેલ સંમેય સંખ્યા શોધો.

**ઉકેલ :** સૌ પ્રથમ આપણે આપેલ સંખ્યાનો મધ્યક શોધીશું.

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) \div 2 = \left(\frac{1+2}{4}\right) \div 2 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

આમ,  $\frac{3}{8}$  એ  $\frac{1}{4}$  અને  $\frac{1}{2}$  વચ્ચે આવેલી સંમેય સંખ્યા છે.

આ સંખ્યાને આપણે સંખ્યારેખા પર પણ નિરૂપણ કરી શકીએ.



અહીં આપણને ABનું મધ્યબિંદુ C મળે છે. બિંદુ C એ  $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) \div 2 = \frac{3}{8}$  સંખ્યા બતાવે છે.


$$\text{ઉપરાંત } \frac{1}{4} < \frac{3}{8} < \frac{1}{2}.$$

જો  $a$  અને  $b$  બે સંમેય સંખ્યાઓ હોય, તો  $\frac{a+b}{2}$  એ સંમેય સંખ્યાઓ  $a$  અને  $b$  વચ્ચે આવેલ સંમેય સંખ્યા છે. જ્યાં  $a < \frac{a+b}{2} < b$ .

આ બાબત ફરીથી સાબિત કરે છે કે આપેલ કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓની વચ્ચે અગણિત સંમેય સંખ્યાઓ હોય.

**ઉદાહરણ 9 :**  $\frac{1}{4}$  અને  $\frac{1}{2}$  વચ્ચેની ત્રણ સંમેય સંખ્યાઓ શોધો.

**ઉકેલ :** સૌ પ્રથમ આપણે આપેલ બંને સંમેય સંખ્યાનો મધ્યક મેળવીએ. ઉપરના ઉદાહરણમાં જણાવ્યા મુજબ  $\frac{1}{4}$  અને  $\frac{1}{2}$ નો મધ્યક  $\frac{3}{8}$  છે અને  $\frac{1}{4} < \frac{3}{8} < \frac{1}{2}$ .




હવે આપણે સંમેય સંખ્યા  $\frac{1}{4}$  અને  $\frac{3}{8}$  વચ્ચેની બીજી સંમેય સંખ્યા શોધીએ.

તેના માટે ફરીથી  $\frac{1}{4}$  અને  $\frac{3}{8}$ નો મધ્યક મેળવીએ.


$$\therefore \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{8}\right) \div 2 = \frac{5}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{16} \text{ અને}$$

$$\frac{1}{4} < \frac{5}{16} < \frac{3}{8} < \frac{1}{2}$$



હવે  $\frac{3}{8}$  અને  $\frac{1}{2}$  નો મધ્યક મેળવીએ.


$$\therefore \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\right) \div 2 = \frac{7}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{16}$$



આમ, આપણે  $\frac{1}{4} < \frac{5}{16} < \frac{3}{8} < \frac{7}{16} < \frac{1}{2}$  જેવી સંખ્યાઓ મેળવી.

આમ,  $\frac{5}{16}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{7}{16}$  એ ત્રણ સંમેય સંખ્યાઓ  $\frac{1}{4}$  અને  $\frac{1}{2}$  વચ્ચે આવેલી સંખ્યાઓ છે.

આ બાબતને નીચે મુજબ સંખ્યારેખા પર સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવી શકાય :



આ રીતે આપણે આપેલ કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓની વચ્ચે ઈચ્છીએ તેટલી સંમેય સંખ્યાઓ મેળવી શકીએ. અહીં ફરીથી આપણે નોંધીએ કે કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચે અગણિત સંમેય સંખ્યાઓ મળે.



## સ્વાધ્યાય : 1.2

1. નીચે આપેલ સંખ્યાઓનું સંખ્યારેખા પર નિરૂપણ કરો.
  - (i)  $\frac{7}{4}$                       (ii)  $\frac{-5}{6}$
2. સંખ્યાઓ  $\frac{-2}{11}$ ,  $\frac{-5}{11}$ ,  $\frac{-9}{11}$  ને સંખ્યારેખા પર દર્શાવો.
3. 2 થી નાની હોય તેવી પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ લખો.
4.  $\frac{-2}{5}$  અને  $\frac{1}{2}$  વચ્ચે આવતી દસ સંમેય સંખ્યાઓ લખો.
5. નીચે આપેલી સંખ્યાઓ વચ્ચે આવતી પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ લખો.
  - (i)  $\frac{2}{3}$  અને  $\frac{4}{5}$               (ii)  $\frac{-3}{2}$  અને  $\frac{5}{3}$               (iii)  $\frac{1}{4}$  અને  $\frac{1}{2}$
6.  $-2$  થી મોટી હોય તેવી પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ લખો.
7.  $\frac{3}{5}$  અને  $\frac{3}{4}$  વચ્ચે આવતી હોય તેવી દસ સંમેય સંખ્યાઓ લખો.

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. સંમેય સંખ્યાઓ સરવાળો, બાદબાકી અને ગુણાકારની ક્રિયા અંગે સંવૃત્ત હોય છે.
2. સરવાળા અને ગુણાકારની ક્રિયા દરમિયાન,
  - (i) સંમેય સંખ્યાઓ માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
  - (ii) સંમેય સંખ્યાઓ માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે.
3. સંમેય સંખ્યા શૂન્ય (0) એ સંમેય સંખ્યાઓ માટે સરવાળાનો તટસ્થ ઘટક છે.
4. સંમેય સંખ્યા 1 (એક) એ સંમેય સંખ્યાઓ માટે ગુણાકારનો તટસ્થ ઘટક છે.
5. સંમેય સંખ્યા  $\frac{a}{b}$  ની વિરોધી સંખ્યા  $\frac{-a}{b}$  છે. ઉલટું પણ સાચું છે.
6. જો  $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = 1$  હોય તો સંમેય સંખ્યા  $\frac{a}{b}$  એ સંમેય સંખ્યા  $\frac{c}{d}$  નો વ્યસ્ત છે.
7. સંમેય સંખ્યા માટે વિભાજનનો ગુણધર્મ : સંમેય સંખ્યાઓ  $a$ ,  $b$  અને  $c$  માટે,
 
$$a(b + c) = ab + ac$$
 અને  $a(b - c) = ab - ac$
8. સંમેય સંખ્યાઓને સંખ્યારેખા પર નિરૂપણ કરી શકાય.
9. કોઈ પણ બે સંમેય સંખ્યાઓની વચ્ચે અગણિત સંમેય સંખ્યાઓ આવેલ હોય છે. બે સંખ્યાઓના મધ્યકનો ખ્યાલ બે સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંખ્યાઓ શોધવામાં મદદરૂપ બને છે.





## એક ચલ સુરેખ સમીકરણ

પ્રકરણ

2

### 2.1 પ્રાસ્તાવિક

અગાઉના ધોરણમાં તમે કેટલીક બૈજિક પદાવલિઓ અને સમીકરણો વિશે જાણકારી મેળવી છે. એવી પદાવલિઓ, જે આપણે શીખ્યાં છીએ, તેનાં થોડાંક ઉદાહરણ :

$$5x, 2x - 3, 3x + y, 2xy + 5, xyz + x + y + z, x^2 + 1, y + y^2$$

અને સમીકરણનાં થોડાં ઉદાહરણ :  $5x = 25$ ,  $2x - 3 = 9$ ,  $2y + \frac{5}{2} = \frac{37}{2}$ ,  $6z + 10 = -2$   
તમને યાદ હશે કે સમીકરણમાં હંમેશાં સમતા (બરાબર) (=) ના ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે પદાવલિમાં તેનો ઉપયોગ થતો નથી.

ઉપરની અમુક પદાવલિઓમાં એકથી વધારે ચલનો ઉપયોગ કરેલ છે. ઉદાહરણ તરીકે  $2xy + 5$ માં બે ચલ છે. તેમ છતાં, હવે આપણે સમીકરણ બનાવવા ફક્ત એક જ ચલનો ઉપયોગ કરીશું. તદુપરાંત, ફક્ત સુરેખ પદાવલિઓ જ સમીકરણ બનાવવા ઉપયોગમાં લઈશું એટલે કે પદાવલિમાં રહેલા ચલની મોટામાં મોટી ઘાત 1 હશે.

સુરેખ પદાવલિના ઉદાહરણ આ મુજબ છે.

$$2x, 2x + 1, 3y - 7, 12 - 5z, \frac{5}{4}(x - 4) + 10$$


નીચે મુજબની પદાવલિઓ સુરેખ પદાવલિઓ નથી.

$$x^2 + 1, y + y^2, 1 + z + z^2 + z^3 \text{ (અહીં ચલની અધિકતમ ઘાત 1 કરતાં વધારે છે.)}$$

હવે આપણે સમીકરણોમાં એક ચલવાળી સુરેખ પદાવલિઓનો જ ઉપયોગ કરીશું. આવા સમીકરણને એક ચલ સુરેખ સમીકરણ કહે છે. અગાઉના ધોરણમાં તમે જે સાદાં સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવવાનું શીખ્યા હતા તે આ પ્રકારનાં હતાં.

ચાલો, હવે જે જાણીએ છીએ તેનું ટૂંકમાં પુનરાવર્તન કરીએ.

- (a) બૈજિક સમીકરણ એ ચલોના ઉપયોગથી બનતી સમતા છે. તેમાં સમતા (બરાબર) (=) નું ચિહ્ન હોય છે. સમતાના ચિહ્નની ડાબી બાજુની પદાવલિને ડા.બા. (LHS) તથા જમણી બાજુની પદાવલિને જ.બા. (RHS) કહે છે.



(b) સમીકરણમાં ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુએ આવેલી પદાવલિઓનું મૂલ્ય સમાન હોય છે. આવું, ફક્ત ચલનાં અમુક ચોક્કસ મૂલ્યો માટે જ સાચું છે. તેથી આવાં મૂલ્યને સમીકરણનો ઉકેલ કહે છે.

$x = 5$  એ સમીકરણ  $2x - 3 = 7$ નો ઉકેલ છે.  
 $x = 5$  માટે ડા.બા. =  $2 \times 5 - 3 = 7 =$  જ.બા.  
જ્યારે  $x = 10$  એ સમીકરણનો ઉકેલ નથી.  
 $x = 10$  માટે ડા.બા. =  $2 \times 10 - 3 = 17$   
જે જ.બા.ને બરાબર નથી.

(c) સમીકરણનો ઉકેલ કેવી રીતે મેળવીશું ?  
આપણે સમીકરણની બંને બાજુ ત્રાજવાનાં બે પલ્લાંની જેમ સંતુલિત છે તેમ માનીએ છીએ. આથી આપણે સમીકરણની બંને બાજુએ સમાન ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીશું જેથી તેની સંતુલિતતા ખોરવાય નહીં. આવાં થોડાંક પદો પછી તમને સમીકરણનો ઉકેલ મળી જશે.



## 2.2 એક બાજુ સુરેખ પદાવલિ હોય અને બીજી બાજુ સંખ્યા હોય તેવાં સમીકરણોનો ઉકેલ

ચાલો, થોડાંક ઉદાહરણો વડે સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવાની પદ્ધતિ યાદ કરીએ. ધ્યાનથી ચકાસો, સમીકરણનો ઉકેલ કોઈ પણ સંમેય સંખ્યા હોઈ શકે છે.

**ઉદાહરણ 1 :** ઉકેલ શોધો :  $2x - 3 = 7$

**ઉકેલ :**

**સોપાન 1 :** બંને બાજુ 3 ઉમેરતાં,

$$2x - 3 + 3 = 7 + 3$$

$$\therefore 2x = 10$$

(સંતુલન ખોરવાયું નથી.)

**સોપાન 2 :** બંને બાજુને 2 વડે ભાગતાં,

$$\frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$$

$$\therefore x = 5$$

(અપેક્ષિત ઉકેલ)

**ઉદાહરણ 2 :** ઉકેલ શોધો :  $2y + 9 = 4$

**ઉકેલ :** 9 ને જ.બા. તરફ લઈ જતાં

$$2y = 4 - 9$$

$$\therefore 2y = -5$$

$$\text{બંને બાજુને 2 વડે ભાગતાં } y = \frac{-5}{2}$$

(ઉકેલ)

**તાળો મેળવો :** ડા.બા. =  $2 \left( \frac{-5}{2} \right) + 9 = -5 + 9 = 4 =$  જ.બા.

(અપેક્ષિત ઉકેલ)

શું તમે ધ્યાનમાં લીધું કે ઉકેલ  $\left( \frac{-5}{2} \right)$  એક સંમેય સંખ્યા છે ? ધોરણ 7માં આપણે જે સમીકરણના ઉકેલ મેળવ્યા હતા તે આવી સંખ્યાઓ નહોતી.

**ઉદાહરણ 3 :** ઉકેલ શોધો :  $\frac{x}{3} + \frac{5}{2} = \frac{-3}{2}$

**ઉકેલ :**  $\frac{5}{2}$  ને જ.બા. લઈ જતાં,  $\frac{x}{3} = \frac{-3}{2} - \frac{5}{2} = -\frac{8}{2}$  મળે.

અથવા  $\frac{x}{3} = -4$

બંને બાજુને 3 વડે ગુણતાં,  $x = -4 \times 3$

$\therefore x = -12$  (ઉકેલ)

**તાળો મેળવો :** ડા.બા. =  $-\frac{12}{3} + \frac{5}{2} = -4 + \frac{5}{2} = \frac{-8+5}{2} = \frac{-3}{2} =$  જ.બા. (અપેક્ષિત ઉકેલ)

તમે જોયું, અહીં ચલનો સહગુણક પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવી જરૂરી નથી.

**ઉદાહરણ 4 :** ઉકેલ શોધો :  $\frac{15}{4} - 7x = 9$

**ઉકેલ :**  $\frac{15}{4} - 7x = 9$  આપેલ છે.

$\therefore -7x = 9 - \frac{15}{4}$  ( $\frac{15}{4}$  ને જ.બા. લઈ જતાં)

$\therefore -7x = \frac{21}{4}$

$\therefore x = \frac{21}{4 \times (-7)}$  (બંને બાજુને -7 વડે ભાગતાં)

$\therefore x = -\frac{3 \times 7}{4 \times 7}$

$\therefore x = -\frac{3}{4}$  (ઉકેલ)

**તાળો મેળવો :** ડા.બા. =  $\frac{15}{4} - 7\left(\frac{-3}{4}\right) = \frac{15}{4} + \frac{21}{4} = \frac{36}{4} = 9 =$  જ.બા. (અપેક્ષિત

ઉકેલ)

## સ્વાધ્યાય 2.1

નીચેનાં સમીકરણ ઉકેલો :

1.  $x - 2 = 7$

2.  $y + 3 = 10$

3.  $6 = z + 2$

4.  $\frac{3}{7} + x = \frac{17}{7}$

5.  $6x = 12$

6.  $\frac{t}{5} = 10$

7.  $\frac{2x}{3} = 18$

8.  $1.6 = \frac{y}{1.5}$

9.  $7x - 9 = 16$

10.  $14y - 8 = 13$

11.  $17 + 6p = 9$

12.  $\frac{x}{3} + 1 = \frac{7}{15}$



### 2.3 કેટલાક ઉપયોગો



આપણે એક સરળ ઉદાહરણથી શરૂઆત કરીએ. બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 74 છે. આમાંની એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 10 વધારે હોય તો બંને સંખ્યાઓ શોધો.

આ એક ક્રૂટપ્રશ્ન છે. આપણે બંનેમાંથી એક પણ સંખ્યા જાણતા નથી અને આપણે તે સંખ્યાઓ શોધવાની છે. અહીં આપણને બે શરત આપેલ છે.

(i) એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 10 વધારે છે.

(ii) બંને સંખ્યાનો સરવાળો 74 છે.

આપણે ધોરણ 7 માં આવા ક્રૂટપ્રશ્નની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી તે શીખ્યા હતા. જો નાની સંખ્યાને  $x$  લઈએ તો મોટી સંખ્યા  $x$  થી 10 વધારે અર્થાત્  $x + 10$  થાય. બીજી શરત પ્રમાણે બંને સંખ્યાનો સરવાળો 74 છે.

$$\text{એટલે કે, } x + (x + 10) = 74$$

$$\therefore 2x + 10 = 74$$

$$10\text{ને જ.બા. લઈ જતાં, } 2x = 74 - 10$$

$$\therefore 2x = 64$$

બંને બાજુને 2 વડે ભાગતાં,  $x = 32$ . આ નાની સંખ્યા છે.

$$\therefore \text{મોટી સંખ્યા } x + 10 = 32 + 10 = 42$$

અપેક્ષિત સંખ્યાઓ 32 અને 42 છે. (બંનેનો સરવાળો 74 થાય છે અને મોટી સંખ્યા નાની સંખ્યા કરતાં 10 વધારે છે.)

આ પદ્ધતિની ઉપયોગિતા દર્શાવવા આપણે થોડાંક વધારે ઉદાહરણો વિચારીએ.

**ઉદાહરણ 5 :** સંમેય સંખ્યા  $-\frac{7}{3}$ ના બમણામાં કઈ સંખ્યા ઉમેરતાં  $\frac{3}{7}$  મળે ?

**ઉકેલ :** સંમેય સંખ્યા  $-\frac{7}{3}$ ની બમણી સંખ્યા  $2 \times \left[-\frac{7}{3}\right] = \frac{-14}{3}$  છે. ધારો કે, આ સંખ્યામાં  $x$  ઉમેરતાં

આપણને  $\frac{3}{7}$  મળે છે. આથી,

$$x + \left(\frac{-14}{3}\right) = \frac{3}{7}$$

$$\therefore x - \frac{14}{3} = \frac{3}{7}$$

$$\therefore x = \frac{3}{7} + \frac{14}{3}$$

( $\frac{14}{3}$ ને ડા.બા. લઈ જતાં)

$$\therefore x = \frac{(3 \times 3) + (14 \times 7)}{21}$$

$$= \frac{9 + 98}{21} = \frac{107}{21}$$

આમ,  $2 \times \left(\frac{-7}{3}\right)$  માં  $\frac{107}{21}$  ઉમેરતાં  $\frac{3}{7}$  મળે.

**ઉદાહરણ 6 :** એક લંબચોરસની પરિમિતિ 13 સેમી અને તેની પહોળાઈ  $2\frac{3}{4}$  સેમી હોય તો તેની લંબાઈ શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે લંબચોરસની લંબાઈ  $x$  સેમી છે.

$$\text{લંબચોરસની પરિમિતિ} = 2 \times (\text{લંબાઈ} + \text{પહોળાઈ})$$

$$= 2 \times (x + 2\frac{3}{4})$$

$$= 2 \times (x + \frac{11}{4})$$



પરિમિતિ 13 સેમી આપેલ છે.

$$\text{માટે, } 2(x + \frac{11}{4}) = 13$$

$$\therefore x + \frac{11}{4} = \frac{13}{2}$$

(બંને બાજુને 2 વડે ભાગતાં)

$$x = \frac{13}{2} - \frac{11}{4}$$

$$= \frac{26}{4} - \frac{11}{4} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$$

આમ, લંબચોરસની લંબાઈ  $3\frac{3}{4}$  સેમી છે.

**ઉદાહરણ 7 :** સાહિલની માતાની હાલની ઉંમર સાહિલની હાલની ઉંમર કરતાં ત્રણ ગણી છે. 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો 66 વર્ષ થાય છે તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે સાહિલની હાલની ઉંમર  $x$  વર્ષ છે.

સાહિલની 5 વર્ષ પછીની ઉંમરને પણ  $x$  ધારીને ઉકેલ મેળવી શકાય. તમે આ રીતે પ્રયત્ન કરો.

	સાહિલ	માતા	સરવાળો
હાલની ઉંમર	$x$	$3x$	
5 વર્ષ પછીની ઉંમર	$x + 5$	$3x + 5$	$4x + 10$

તેમની ઉંમરનો સરવાળો 66 વર્ષ આપેલ છે.

$$\text{માટે, } 4x + 10 = 66$$

આ સમીકરણ સાહિલની હાલની ઉંમર દર્શાવે છે. જે  $x$  વર્ષ છે. સમીકરણના ઉકેલ માટે,



10 ને જ.બા. લઈ જતાં

$$4x = 66 - 10$$

$$\therefore 4x = 56$$

$$\therefore x = \frac{56}{4} = 14$$

(ઉકેલ)

આમ, સાહિલની હાલની ઉંમર 14 વર્ષ અને માતાની ઉંમર 42 વર્ષ છે. (તમે ચકાસી શકો છો કે 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો 66 વર્ષ થશે.)

**ઉદાહરણ 8 :** બંસી પાસે 2 રૂપિયાના તથા 5 રૂપિયાના કેટલાક સિક્કા છે. બે રૂપિયાના સિક્કાઓની સંખ્યા પાંચ રૂપિયાના સિક્કાઓની સંખ્યા કરતાં ત્રણ ગણી છે. જો સિક્કાઓનું કુલ મૂલ્ય ₹ 77 હોય તો દરેક મૂલ્યના સિક્કાની સંખ્યા શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે બંસી પાસે રહેલા ₹ 5ના સિક્કાની સંખ્યા  $x$  છે.

માટે, ₹ 2ના સિક્કાઓની સંખ્યા  $3x$  થાય.

આથી,

(i) 5 રૂપિયાના સિક્કાઓનું કુલ મૂલ્ય, ₹  $5 \times x = ₹ 5x$

(ii) 2 રૂપિયાના સિક્કાઓનું કુલ મૂલ્ય, ₹  $2 \times 3x = ₹ 6x$  થાય.

આમ, તેની પાસે રહેલા સિક્કાઓનું કુલ મૂલ્ય = ₹  $11x$

પરંતુ, કુલ મૂલ્ય ₹ 77 આપેલ છે.

$$\text{માટે, } 11x = 77$$

$$\therefore x = \frac{77}{11} = 7$$

આમ, 5 રૂપિયાના સિક્કાઓની સંખ્યા =  $x = 7$

2 રૂપિયાના સિક્કાઓની સંખ્યા =  $3x = 21$

(તમે ચકાસી શકો છો કે બંસી પાસે કુલ ₹ 77 છે.)

(ઉકેલ)

**ઉદાહરણ 9 :** 11ના ત્રણ ક્રમિક ગુણિતનો સરવાળો 363 હોય તો આ ગુણિતો શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે 11નો એક ગુણિત  $x$  છે. આથી, તેની પછીનો ગુણિત  $x + 11$  થાય અને તેના પછીનો ગુણિત  $x + 11 + 11$  અથવા  $x + 22$  થાય. આમ, આપણે 11ના ત્રણ ક્રમિક ગુણિત અનુક્રમે  $x$ ,  $x + 11$  અને  $x + 22$  લઈએ.



અહીં, 11 ના ત્રણેય ગુણિતોનો સરવાળો 363 આપેલ છે. આથી આપણને નીચે પ્રમાણેનું સમીકરણ મળે :

$$x + (x + 11) + (x + 22) = 363$$

$$\therefore x + x + 11 + x + 22 = 363$$

$$\therefore 3x + 33 = 363$$

$$\therefore 3x = 363 - 33$$


$$\therefore 3x = 330$$

$$\therefore x = \frac{330}{3}$$

$$\therefore x = 110$$

આમ, 110, 121 અને 132 એ ત્રણ ક્રમિક ગુણિતો છે (જવાબ).

અહીં, આપણે જોયું કે કૂટપ્રશ્નનો ઉકેલ જુદી-જુદી રીતે પણ મેળવી શકાય.



**વૈકલ્પિક ઉકેલ :** 11 ના ત્રણ ક્રમિક ગુણિતમાં જો મધ્યમાં રહેલ ગુણિતને  $x$  લઈએ તો તેની અગાઉનો ગુણિત  $x - 11$  અને તેની પછીનો ગુણિત  $x + 11$  થાય. આમ, આપણને સમીકરણ  $(x - 11) + x + (x + 11) = 363$  મળે.

$$\therefore 3x = 363$$

$$x = \frac{363}{3} = 121$$

આથી,

$$x = 121, x - 11 = 110, x + 11 = 132$$

આમ, 110, 121, 132 એ 11 ના ત્રણ ક્રમિક ગુણિતો છે.

**ઉદાહરણ 10 :** બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો તફાવત 66 છે. જો તેમનો ગુણોત્તર 2 : 5 હોય તો તે સંખ્યાઓ શોધો.

**ઉકેલ :** બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 2 : 5 હોવાથી આપણે એક સંખ્યાને  $2x$  તથા બીજી સંખ્યાને  $5x$  લઈશું. (ધ્યાન આપો,  $2x : 5x$  એ  $2 : 5$  નું જ સ્વરૂપ છે.)

બંને સંખ્યાઓનો તફાવત  $(5x - 2x)$  છે. પરંતુ, તફાવત આપણને 66 આપેલ છે. માટે,

$$5x - 2x = 66$$

$$3x = 66$$

$$x = 22$$

પરંતુ, સંખ્યાઓ  $2x$  અને  $5x$  છે. માટે, માંગેલ સંખ્યાઓ અનુક્રમે  $2 \times 22 = 44$  અને  $5 \times 22 = 110$  છે. બંને સંખ્યાઓનો તફાવત  $110 - 44 = 66$  જ થાય છે.

**ઉદાહરણ 11 :** દેવેશી પાસે ₹ 50, ₹ 20 અને ₹ 10ના મૂલ્યની કુલ ₹ 590 ની ચલણી નોટો છે. ₹ 50 અને ₹ 20ના મૂલ્યની ચલણી નોટોનો ગુણોત્તર 3 : 5 છે. જો તેની પાસે કુલ 25 ચલણી નોટો હોય તો ઉપરોક્ત મૂલ્યવાળી નોટોની સંખ્યા શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે ₹ 50 અને ₹ 20ના મૂલ્યવાળી નોટોની સંખ્યા અનુક્રમે  $3x$  અને  $5x$  છે. તેની પાસે કુલ 25 નોટો છે.

$$\begin{aligned} \text{માટે ₹ 10ના મૂલ્યવાળી નોટોની સંખ્યા} &= 25 - (3x + 5x) \\ &= 25 - 8x \end{aligned}$$

તેની પાસે રહેલ રકમ,

$$\text{₹ 50ની નોટ દ્વારા, } 3x \times 50 = 150x$$

$$\text{₹ 20ની નોટ દ્વારા, } 5x \times 20 = 100x$$

$$\text{₹ 10ની નોટ દ્વારા, } (25 - 8x) \times 10 = (250 - 80x)$$

$$\text{આમ, તેની પાસે રહેલ કુલ રકમ} = 150x + 100x + (250 - 80x) = ₹ (170x + 250)$$

પરંતુ, તેની પાસે કુલ ₹ 590 છે. માટે,  $170x + 250 = 590$

$$\therefore 170x = 590 - 250 = 340$$

$$\therefore x = \frac{340}{170} = 2$$

$$\therefore x = 2$$

$$\text{તેણી પાસે રહેલી ₹ 50ના મૂલ્યની નોટોની સંખ્યા} = 3x$$

$$= 3 \times 2 = 6$$

$$\text{તેણી પાસે રહેલી ₹ 20ના મૂલ્યની નોટોની સંખ્યા} = 5x = 5 \times 2 = 10$$

$$\text{તેણી પાસે રહેલી ₹ 10ના મૂલ્યની નોટોની સંખ્યા} = 25 - 8x$$

$$= 25 - (8 \times 2)$$

$$= 25 - 16 = 9$$



## સ્વાધ્યાય 2.2



1. એક સંખ્યામાંથી  $\frac{1}{2}$  બાદ કરીને મળતાં પરિણામને  $\frac{1}{2}$  વડે ગુણતાં જો  $\frac{1}{8}$  મળે તો તે સંખ્યા શોધો.
2. એક લંબચોરસ સ્વીર્મીંગ પુલની પરિમિતિ 154 મી છે. જો તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈના બમણાથી બે વધારે હોય તો સ્વીર્મીંગ પુલની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો.
3. એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના પાયાનું માપ  $\frac{4}{3}$  સેમી છે. જો ત્રિકોણની પરિમિતિ  $4\frac{2}{15}$  સેમી હોય તો ત્રિકોણની બે સમાન બાજુઓની લંબાઈ શોધો.
4. બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 95 છે. એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 15 વધારે હોય તો તે સંખ્યાઓ શોધો.
5. બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 5 : 3 અને તેમનો તફાવત 18 હોય તો તે સંખ્યાઓ શોધો.
6. જો ત્રણ ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો 51 હોય, તો તે સંખ્યાઓ શોધો.
7. 8ના ત્રણ ક્રમિક ગુણિતનો સરવાળો 888 છે તો તે ગુણિત શોધો.
8. ચઢતા ક્રમમાં રહેલી ત્રણ ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને અનુક્રમે 2, 3 તથા 4 વડે ગુણાકાર કરી અને સરવાળો કરતાં જો સરવાળો 74 આવે તો તે સંખ્યાઓ શોધો.
9. રાહુલ અને હારુનની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 7 છે. 4 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો 56 વર્ષ થાય તો તેમની હાલની ઉંમર શોધો.
10. વર્ગખંડમાં છોકરા અને છોકરીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર 7 : 5 છે. જો છોકરાઓની સંખ્યા છોકરીઓની સંખ્યા કરતાં 8 વધારે હોય તો વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા શોધો.
11. ભરતના પિતાજી ભરતના દાદા કરતાં 26 વર્ષ નાના અને ભરત કરતાં 29 વર્ષ મોટા છે. જો ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 135 વર્ષ હોય તો ત્રણેયની ઉંમર શોધો.
12. 15 વર્ષ પછી રવિની ઉંમર તેની હાલની ઉંમર કરતાં ચાર ગણી થાય તો રવિની હાલની ઉંમર શોધો.
13. એક સંમેય સંખ્યાને  $\frac{5}{2}$  વડે ગુણી અને પરિણામમાં  $\frac{2}{3}$  ઉમેરતાં આપણને  $\frac{-7}{12}$  મળે તો તે સંખ્યા શોધો.



14. લક્ષ્મી એક બેંકમાં ખજાનચી છે. તેની પાસે અનુક્રમે ₹ 100, ₹ 50 અને ₹ 10ના મૂલ્યની ચલણી નોટો છે. આ નોટોની સંખ્યાનો ગુણોત્તર અનુક્રમે 2 : 3 : 5 છે. જો કુલ રકમ ₹ 4,00,000 હોય તો લક્ષ્મી પાસે દરેક મૂલ્યની કેટલી ચલણી નોટો હશે ?
15. મારી પાસે ₹ 1, ₹ 2 અને ₹ 5ના મૂલ્યવાળા કુલ ₹ 300ના સિક્કા છે. ₹ 2ના સિક્કાની સંખ્યા, ₹ 5ના સિક્કા કરતાં ત્રણ ગણી છે. જો સિક્કાની કુલ સંખ્યા 160 હોય તો દરેક મૂલ્યના સિક્કાઓની સંખ્યા શોધો.
16. એક નિબંધ સ્પર્ધાના આયોજકોએ પ્રત્યેક વિજેતાને ₹ 100 તથા વિજયી ન બનનારા દરેક સ્પર્ધકને ₹ 25નો પુરસ્કાર આપવાનું નક્કી કરેલ છે. જો પુરસ્કાર સ્વરૂપે આપવામાં આવેલ કુલ રકમ ₹ 3,000 હોય તો કુલ 63 સ્પર્ધકોમાંથી વિજેતા થનાર સ્પર્ધકની સંખ્યા શોધો.

## 2.4 બંને બાજુ ચલ હોય તેવા સમીકરણોનો ઉકેલ

સમીકરણ એ બે પદાવલિઓનાં મૂલ્યો વચ્ચેની સમતા છે.

સમીકરણ  $2x - 3 = 7$  માં રહેલી બે



પદાવલિઓ અનુક્રમે  $2x - 3$  અને  $7$  છે. અત્યાર સુધી આપણે લીધેલા દરેક ઉદાહરણમાં જમણી બાજુ ફક્ત સંખ્યા જ હતી. પરંતુ, આવું આવશ્યક નથી. બંને બાજુ ચલવાળી પદાવલિ પણ હોઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે  $2x - 3 = x + 2$  માં બંને બાજુએ ચલ હોય તેવી પદાવલિઓ છે. ડાબી બાજુની પદાવલિ  $2x - 3$  છે અને જમણી બાજુની પદાવલિ  $x + 2$  છે.

- હવે આપણે બંને બાજુ ચલવાળી પદાવલિઓ હોય તેવાં સમીકરણોનો ઉકેલ કેવી રીતે મેળવવો તે વિશે ચર્ચા કરીએ.

**ઉદાહરણ 12 :** ઉકેલ શોધો :  $2x - 3 = x + 2$

**ઉકેલ :** આપણી પાસે

$$\therefore 2x = x + 2 + 3$$

$$\therefore 2x = x + 5$$

$$\therefore 2x - x = x + 5 - x \quad (\text{બંને બાજુથી } x \text{ બાદ કરતાં})$$

$$x = 5 \quad (\text{ઉકેલ})$$

અહીંયાં આપણે સમીકરણની બંને બાજુથી ફક્ત સંખ્યા (અચળ પદ) જ નહીં પરંતુ ચલવાળું પદ પણ બાદ કરેલ છે. કારણ કે ચલ પોતે પણ એક સંખ્યા જ છે. ધ્યાન રાખો અહીં બંને બાજુથી  $x$  બાદ કરવું તે હકીકતમાં  $x$  ને ડાબી બાજુ લઈ જવાની ક્રિયા છે.

**ઉદાહરણ 13 :** ઉકેલ શોધો :  $5x + \frac{7}{2} = \frac{3}{2}x - 14$

**ઉકેલ :** બંને બાજુને 2 વડે ગુણતાં,

$$2 \times (5x + \frac{7}{2}) = 2 \times (\frac{3}{2}x - 14)$$

$$\therefore (2 \times 5x) + (2 \times \frac{7}{2}) = (2 \times \frac{3}{2}x) - (2 \times 14)$$

$$\therefore 10x + 7 = 3x - 28$$

$$\therefore 10x - 3x + 7 = -28 \quad (3x \text{ ને ડા.બા. લઈ જતાં})$$

$$\therefore 7x + 7 = -28$$

$$7x = -28 - 7$$

$$\therefore 7x = -35$$

$$\therefore x = \frac{-35}{7} \quad \text{અથવા} \quad x = -5 \quad (\text{ઉકેલ})$$



## સ્વાધ્યાય 2.3

નીચેનાં સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવો અને જવાબ ચકાસો :



1.  $3x = 2x + 18$
2.  $5t - 3 = 3t - 5$
3.  $5x + 9 = 5 + 3x$
4.  $4z + 3 = 6 + 2z$
5.  $2x - 1 = 14 - x$
6.  $8x + 4 = 3(x - 1) + 7$
7.  $x = \frac{4}{5}(x + 10)$
8.  $\frac{2x}{3} + 1 = \frac{7x}{15} + 3$
9.  $2y + \frac{5}{3} = \frac{26}{3} - y$
10.  $3m = 5m - \frac{8}{5}$

### 2.5 થોડાક વધારે ઉદાહરણો

**ઉદાહરણ 14 :** બે અંકોની એક સંખ્યાના અંકોનો તફાવત 3 છે. અંકોની અદલાબદલી કરીને મળતી નવી સંખ્યાને મૂળ સંખ્યામાં ઉમેરતાં 143 મળે છે તો મૂળ સંખ્યા શોધો.

**ઉકેલ :** દાખલા તરીકે, બે અંકોવાળી એક સંખ્યા, ધારો કે 56 લઈએ.

આને આપણે આ પ્રકારે લખી શકીએ.

$$56 = (10 \times 5) + 6$$

હવે સંખ્યાના અંકોની અદલાબદલી કરતાં આપણને 65 મળે જેને આપણે  $(10 \times 6) + 5$  પ્રમાણે લખી શકીએ. ધારો કે બે અંકોવાળી સંખ્યામાં, એકમનો અંક  $b$  છે. હવે, બંને અંકોનો તફાવત 3 છે તેથી દશકનો એક  $b + 3$  થાય. આમ, બે અંકોવાળી સંખ્યા  $10(b + 3) + b = 10b + 30 + b = 11b + 30$  થાય.

અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળતી નવી સંખ્યા

$$10b + (b + 3) = 11b + 3 \text{ થાય.}$$

બંને સંખ્યાનો સરવાળો કરતાં  $(11b + 30) + (11b + 3)$

$$= 11b + 11b + 30 + 3$$

$$= 22b + 33 \text{ મળે.}$$

બંને સંખ્યાનો સરવાળો 143 છે. માટે  $22b + 33 = 143$

$$\therefore 22b = 143 - 33$$

$$\therefore 22b = 110$$

$$\therefore b = \frac{110}{22}$$

$$\therefore b = 5$$

આમ, એકમનો અંક 5 છે, માટે દશકનો અંક

$$5 + 3 = 8$$

$$\therefore \text{મૂળ સંખ્યા} = 85$$

**તાળો મેળવો :** અંકોની અદલાબદલી કરતાં 58 મળે છે અને 58

અને 85નો સરવાળો પ્રશ્નમાં જણાવ્યા મુજબ 143 થાય છે.

શું આપણે દશકનો અંક  $(b - 3)$  લઈ શકીએ ? પ્રયત્ન કરો અને જુઓ શું જવાબ મળે છે.

ધ્યાન રાખો, આ ઉકેલમાં આપણે દશકનો અંક એકમના અંક કરતાં ત્રણ વધારે લીધો છે. દશકના અંકને  $(b - 3)$  લઈને જુઓ શું ઉકેલ મળે છે ?

ઉદાહરણમાં આપેલ કૂટ પ્રશ્ન 58 અને 85 બંને સંખ્યા માટે સાચો છે. આમ બંને ઉત્તર સાચા છે.



**ઉદાહરણ 15 :** અર્જુનની હાલની ઉંમર શ્રીયાની હાલની ઉંમરથી બમણી છે. 5 વર્ષ પહેલાં અર્જુનની ઉંમર શ્રીયાની ઉંમર કરતાં ત્રણ ગણી હતી તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે શ્રીયાની હાલની ઉંમર  $x$  વર્ષ છે. માટે, અર્જુનની હાલની ઉંમર  $2x$  વર્ષ થાય.

શ્રીયાની 5 વર્ષ પહેલાંની ઉંમર :  $(x - 5)$  વર્ષ

∴ અર્જુનની 5 વર્ષ પહેલાંની ઉંમર :  $(2x - 5)$  વર્ષ

5 વર્ષ પહેલાં અર્જુનની ઉંમર શ્રીયાની ઉંમર કરતાં ત્રણ ગણી હતી.

$$\text{માટે, } 2x - 5 = 3(x - 5)$$

$$\therefore 2x - 5 = 3x - 15$$

$$15 - 5 = 3x - 2x$$

$$10 = x$$

આમ, શ્રીયાની હાલની ઉંમર  $x = 10$  વર્ષ

માટે, અર્જુનની હાલની ઉંમર =  $2x = 2 \times 10 = 20$  વર્ષ

## સ્વાધ્યાય 2.4

1. અમીના એક સંખ્યા ધારે છે. તે આ સંખ્યામાંથી  $\frac{5}{2}$  બાદ કરી અને મળેલ પરિણામનો 8 વડે ગુણાકાર કરે છે. જો મળેલ નવું પરિણામ ધારેલ સંખ્યાનું ત્રણ ગણું હોય તો અમીનાએ ધારેલી સંખ્યા શોધો.
2. બે ધન સંખ્યાઓમાં પહેલી સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં 5 ગણી છે. દરેક સંખ્યામાં 21 ઉમેરતાં નવી મળેલ બંને સંખ્યાઓમાંથી પહેલી સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં બમણી થાય છે તો મૂળ સંખ્યાઓ શોધો.
3. બે અંકની સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 છે. જો અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળેલ નવી સંખ્યા, મૂળ સંખ્યા કરતાં 27 વધારે હોય તો, મૂળ સંખ્યા શોધો.
4. બે અંકની સંખ્યાના અંકો પૈકી એક અંક બીજા અંક કરતાં ત્રણ ગણો છે. અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળેલ નવી સંખ્યાને, મૂળ સંખ્યામાં ઉમેરતાં 88 મળે છે, તો મૂળ સંખ્યા શોધો.
5. સરોજની માતાની હાલની ઉંમર, સરોજની હાલની ઉંમર કરતાં છ ગણી છે. 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર તેની માતાની હાલની ઉંમર કરતાં ત્રીજા ભાગની થશે. તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો.
6. મહુલી ગામમાં જમીનનો એક સાંકડો લંબચોરસ ટુકડો શાળા બનાવવા માટે ફાળવેલ છે. પ્લોટની લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણોત્તર 11 : 4 છે. જો આ પ્લોટની ફરતે વાડ બનાવવા માટે ગ્રામપંચાયતને ₹ 100 પ્રતિ મીટરના દરે ₹ 75,000 ખર્ચ કરવા પડે તો પ્લોટની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો.
7. હસન ગણવેશ બનાવવા માટે બે પ્રકારનું કાપડ ખરીદે છે. શર્ટ માટેના કાપડનો ભાવ ₹ 50 પ્રતિ મીટર છે તથા પાટલૂનના કાપડનો ભાવ ₹ 90 પ્રતિ મીટર છે. શર્ટના પ્રત્યેક 3 મીટર કાપડ માટે



તે પાટલૂનનું 2 મીટર કાપડ ખરીદે છે. તે આ કાપડને અનુક્રમે 12% અને 10% નફા સાથે વેચે છે, તેને કુલ ₹ 36,600 મળે છે, તો તેણે પાટલૂન માટે કેટલું કાપડ ખરીદ્યું હશે ?

8. હરણના એક ઝુંડમાંથી અડધાં હરણ ખેતરમાં ચરી રહ્યાં છે. બાકી બચેલાં હરણના ત્રણ ચતુર્થાંશ ભાગનાં હરણ ઊછળકૂદ કરી રહ્યાં છે અને બાકીનાં 9 હરણ તળાવમાંથી પાણી પી રહ્યાં છે. તો ઝુંડમાં રહેલાં હરણની સંખ્યા શોધો.
9. દાદાજીની ઉંમર તેમની પૌત્રીની ઉંમર કરતાં દસ ગણી છે. જો તેમની ઉંમર તેમની પૌત્રીની ઉંમર કરતાં 54 વર્ષ વધારે હોય તો બંનેની ઉંમર શોધો.
10. અમનની હાલની ઉંમર તેના પુત્રની હાલની ઉંમર કરતાં ત્રણ ગણી છે. 10 વર્ષ પહેલાં તેની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમર કરતાં પાંચગણી હોય તો તેમની હાલની ઉંમર શોધો.



## 2.6 સમીકરણનું સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ

**ઉદાહરણ 16 :** ઉકેલ શોધો :  $\frac{6x+1}{3} + 1 = \frac{x-3}{6}$

**ઉકેલ :** બંને બાજુને 6 વડે ગુણતાં

$$\frac{6(6x+1)}{3} + 6 \times 1 = \frac{6(x-3)}{6}$$

$$\therefore 2(6x+1) + 6 = x-3$$

$$\therefore 12x + 2 + 6 = x-3$$

$$\therefore 12x + 8 = x-3$$

$$\therefore 12x - x + 8 = -3$$

$$\therefore 11x + 8 = -3$$

$$\therefore 11x = -3 - 8$$

$$\therefore 11x = -11$$

$$\therefore x = -1$$

6 વડે જ કેમ ? અહીં બંને બાજુ પર રહેલ પદોના છેદનો લ. સા. અ. 6 છે.

(કૌંસ છોડતાં)

(જોઈતું પરિણામ)

$$\begin{aligned} \text{ચકાસો : ડા.બા. } \frac{6(-1)+1}{3} + 1 &= \frac{-6+1}{3} + 1 = \frac{-5}{3} + \frac{3}{3} \\ &= \frac{-5+3}{3} = \frac{-2}{3} \end{aligned}$$

$$\text{જ.બા. } = \frac{(-1)-3}{6} = \frac{-4}{6} = \frac{-2}{3}$$

$$\therefore \text{ડા.બા.} = \text{જ.બા.}$$

**ઉદાહરણ 17 :** ઉકેલ શોધો :  $5x - 2(2x - 7) = 2(3x - 1) + \frac{7}{2}$

**ઉકેલ :** કૌંસને દૂર કરતાં,

$$\text{ડા.બા. } = 5x - 4x + 14 = x + 14$$

$$\text{જ.બા.} = 6x - 2 + \frac{7}{2} = 6x - \frac{4}{2} + \frac{7}{2} = 6x + \frac{3}{2}$$

$$\text{આમ સમીકરણ, } x + 14 = 6x + \frac{3}{2}$$

$$\therefore 14 = 6x - x + \frac{3}{2}$$

$$\therefore 14 = 5x + \frac{3}{2}$$

$$\therefore 14 - \frac{3}{2} = 5x$$

$$\therefore \frac{28-3}{2} = 5x$$

$$\therefore \frac{25}{2} = 5x$$

$$\therefore x = \frac{25}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{5 \times 5}{2 \times 5} = \frac{5}{2}$$

આમ,  $x = \frac{5}{2}$  એ સમીકરણનો જરૂરી ઉકેલ છે.

$$\text{ચકાસો : ડા.બા.} = 5 \times \frac{5}{2} - 2 \left( \frac{5}{2} \times 2 - 7 \right)$$

$$= \frac{25}{2} - 2(5 - 7) = \frac{25}{2} - 2(-2)$$

$$= \frac{25}{2} + 4 = \frac{25+8}{2} = \frac{33}{2}$$

$$\text{જ.બા.} = 2\left(\frac{5}{2} \times 3 - 1\right) + \frac{7}{2} = 2\left(\frac{15}{2} - \frac{2}{2}\right) + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{2 \times 13}{2} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{26+7}{2} = \frac{33}{2} = \text{ડા.બા.}$$



$\left(\frac{3}{2}\right)$  ને ડા.બા. લઈ જતાં)

શું તમે જોયું કે સમીકરણને આપણે કેવી રીતે સરળ બનાવ્યું ? અહીંયાં, બંને તરફની પદાવલિઓમાં રહેલા પદોના છેદના લ. સા. અ. વડે બંને બાજુનો ગુણાકાર કર્યો.

ધ્યાન આપો, આ ઉદાહરણમાં આપણે કૌંસને ખોલી અને બંને બાજુએ રહેલાં સમાન પદોને મેળવીને સમીકરણને સરળ બનાવેલ છે.

## સ્વાધ્યાય 2.5

નીચેનાં સુરેખ સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવો :

1.  $\frac{x}{2} - \frac{1}{5} = \frac{x}{3} + \frac{1}{4}$

2.  $\frac{n}{2} - \frac{3n}{4} + \frac{5n}{6} = 21$

3.  $x + 7 - \frac{8x}{3} = \frac{17}{6} - \frac{5x}{2}$

4.  $\frac{x-5}{3} = \frac{x-3}{5}$

5.  $\frac{3t-2}{4} - \frac{2t+3}{3} = \frac{2}{3} - t$

6.  $m - \frac{m-1}{2} = 1 - \frac{m-2}{3}$



સાદુંરૂપ આપી નીચેનાં સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવો :

$$7. 3(t - 3) = 5(2t + 1)$$

$$8. 15(y - 4) - 2(y - 9) + 5(y + 6) = 0$$

$$9. 3(5z - 7) - 2(9z - 11) = 4(8z - 13) - 17$$

$$10. 0.25(4f - 3) = 0.05(10f - 9)$$

## 2.7 સુરેખ સ્વરૂપે બદલી શકાય તેવા સમીકરણ

**ઉદાહરણ 18 :** ઉકેલ શોધો :  $\frac{x+1}{2x+3} = \frac{3}{8}$

**ઉકેલ :** ધ્યાન આપો, આપેલ સમીકરણ સુરેખ સમીકરણ નથી. કારણ કે ડાબી બાજુની પદાવલિ સુરેખ નથી. પરંતુ આપણે તેને સુરેખ સમીકરણના સ્વરૂપમાં બદલી શકીએ છીએ. સમીકરણની બંને બાજુનો  $(2x + 3)$  વડે ગુણાકાર કરતાં

$$\left(\frac{x+1}{2x+3}\right) \times (2x+3) = \frac{3}{8}(2x+3)$$

ડા.બા. એથી  $(2x + 3)$ નો છેદ ઊડી જશે આથી આપણને

$$x + 1 = \frac{3(2x+3)}{8} \text{ મળશે.}$$

હવે, આપણી પાસે એક સુરેખ સમીકરણ છે. જેનો ઉકેલ આપણને મેળવતાં આવડે છે. બંને બાજુને 8 વડે ગુણતાં

$$8(x + 1) = 3(2x + 3)$$

$$\therefore 8x + 8 = 6x + 9$$

$$\therefore 8x = 6x + 9 - 8$$

$$\therefore 8x = 6x + 1$$

$$\therefore 8x - 6x = 1$$

$$\therefore 2x = 1$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}$$

**ઉકેલ :**  $x = \frac{1}{2}$

**તાબો મેળવો :** ડા.બા.નો અંશ =  $\frac{1}{2} + 1 = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$

ડા.બા.નો છેદ =  $2x + 3 = 2 \times \frac{1}{2} + 3 = 1 + 3 = 4$

$$\therefore \text{ડા.બા.} = \text{અંશ} \div \text{છેદ} = \frac{3}{2} \div 4$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$\therefore \text{ડા.બા.} = \text{જ.બા.}$$

ધ્યાન આપો

$$2x + 3 \neq 0$$

(કેમ ?)

આ પદને આપણે ચોકડી ગુણાકારથી પણ મેળવી શકીએ

$$\frac{x+1}{2x+3} \times \frac{3}{8}$$

**ઉદાહરણ 19 :** અનુ અને રાજની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે. 8 વર્ષ પછીની તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 6 થાય તો તેમની હાલની ઉંમર શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે અનુ અને રાજની હાલની ઉંમર અનુક્રમે  $4x$  અને  $5x$  છે.

8 વર્ષ પછી, અનુની ઉંમર =  $(4x + 8)$  વર્ષ

8 વર્ષ પછી, રાજની ઉંમર =  $(5x + 8)$  વર્ષ

આમ, 8 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર =  $\frac{4x + 8}{5x + 8}$

પરંતુ, ગુણોત્તર 5 : 6 આપેલ છે.

માટે,  $\frac{4x + 8}{5x + 8} = \frac{5}{6}$

ચોકડી ગુણાકાર કરતાં  $6(4x + 8) = 5(5x + 8)$

$$\therefore 24x + 48 = 25x + 40$$

$$\therefore 24x + 48 - 40 = 25x$$

$$\therefore 24x + 8 = 25x$$

$$\therefore 8 = 25x - 24x$$

$$\therefore 8 = x$$

આમ, અનુની હાલની ઉંમર =  $4x = 4 \times 8 = 32$  વર્ષ

રાજની હાલની ઉંમર =  $5x = 5 \times 8 = 40$  વર્ષ

## સ્વાધ્યાય 2.6

નીચે આપેલાં સમીકરણો ઉકેલો :

1.  $\frac{8x - 3}{3x} = 2$

2.  $\frac{9x}{7 - 6x} = 15$

3.  $\frac{z}{z + 15} = \frac{4}{9}$

4.  $\frac{3y + 4}{2 - 6y} = \frac{-2}{5}$

5.  $\frac{7y + 4}{y + 2} = \frac{-4}{3}$

6. હરિ અને હેરીની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 : 7 છે. 4 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 : 4 હશે તો તેમની હાલની ઉંમર શોધો.

7. એક અપૂર્ણાંકનો છેદ તેના અંશ કરતાં 8 વધારે છે. જો તેના અંશમાં 17 ઉમેરવામાં આવે અને છેદમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે તો મળતો નવો અપૂર્ણાંક  $\frac{3}{2}$  હોય તો મૂળ અપૂર્ણાંક શોધો.





## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. બૈજિક સમીકરણ એ ચલોના ઉપયોગથી બનતી સમતા છે. તે દર્શાવે છે કે સમતાના ચિહ્નની એક બાજુ આવેલ પદાવલિનું મૂલ્ય તેની બીજી બાજુ આવેલ પદાવલિના મૂલ્ય જેટલું જ હોય.
2. ધોરણ VI, VII અને VIII માં આપણે જેનો અભ્યાસ કર્યો હતો તે સમીકરણો એક ચલ સુરેખ સમીકરણો હતાં. આ સમીકરણોમાં સમીકરણ બનાવવા ઉપયોગ થયેલ પદાવલિમાં ફક્ત એક જ ચલ હતો અને આ બધાં જ સમીકરણો સુરેખ હતાં અર્થાત્ સમીકરણમાં રહેલા ચલની અધિકતમ ઘાત 1 હતી.
3. સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ કોઈપણ સંમેય સંખ્યા હોઈ શકે છે.
4. સમીકરણની બંને બાજુએ સુરેખ પદાવલિઓ હોઈ શકે છે. ધોરણ 6 અને 7 માં અભ્યાસ કરેલ સમીકરણમાં કોઈપણ એક બાજુ ફક્ત સંખ્યા હતી.
5. સંખ્યાની જેમ જ ચલને પણ એક બાજુથી બીજી બાજુ તરફ લઈ જઈ શકાય છે.
6. ક્યારેક ઉકેલ લાવતાં પહેલાં, સમીકરણ બનાવવામાં વપરાયેલ પદાવલિઓને તેમના સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં અમુક સમીકરણ સુરેખ નથી હોતાં પરંતુ સમીકરણની બંને બાજુઓને યોગ્ય પદાવલિ વડે ગુણીને તેમને સુરેખ સમીકરણમાં બદલી શકાય છે.
7. વિવિધ પ્રકારના કૂટપશ્નોનો ઉકેલ મેળવવામાં સુરેખ સમીકરણ ઉપયોગી છે. સંખ્યા, ઉંમર, પરિમિતિ, ચલણી સિક્કા તથા નોટો પર આધારિત કૂટપશ્નોના ઉકેલ સુરેખ સમીકરણના ઉપયોગથી મેળવી શકાય છે.





## ચતુષ્કોણની સમજ

પ્રકરણ

3

### 3.1 પ્રાસ્તાવિક

તમે જાણો છો કે કાગળ એક સમતલની પ્રતિકૃતિ છે. જ્યારે તમે કાગળ પર પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર તેના પર રહેલાં બિંદુઓને એકબીજાં સાથે જોડો છો (માત્ર એક બિંદુ ના હોય તેવા આકૃતિના કોઈ પણ ભાગને રેખાંકિત કર્યા વગર) ત્યારે તમને સમતલીય વક મળે છે.

અગાઉના ધોરણમાં અભ્યાસ કરેલ અલગ-અલગ પ્રકારના વકને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

નીચેની આકૃતિઓને તેના પ્રકાર સાથે મેળવો : (સૂચના : એક આકૃતિના એકથી વધારે પ્રકાર હોઈ શકે છે.)

આકૃતિ	પ્રકાર
(1)	(a) સરળ બંધ વક
(2)	(b) બંધ વક કે જે સરળ નથી
(3)	(c) સરળ વક જે બંધ નથી
(4)	(d) વક જે સરળ નથી


તમારા મિત્રો સાથે તમે કરેલ જોડની તુલના કરો. શું તે તમારી સાથે સહમત છે ?

### 3.2 બહુકોણ

ફક્ત રેખાખંડથી બનતા સાદા બંધ વકને બહુકોણ કહે છે.



વક જે બહુકોણ છે











વક જે બહુકોણ નથી

બહુકોણનાં થોડાં વધારે ઉદાહરણ આપવાનો પ્રયત્ન કરો તથા થોડાં એવાં પણ ઉદાહરણ આપો કે જે બહુકોણ ના હોય. એક બહુકોણની કાચી આકૃતિ દોરો અને તેની બાજુઓ તથા શિરોબિંદુઓની ઓળખ મેળવો.


### 3.2.1 બહુકોણનું વર્ગીકરણ

આપણે બહુકોણનું વર્ગીકરણ તેની બાજુઓ(અથવા શિરોબિંદુઓ)ની સંખ્યાના આધારે કરીએ છીએ.

બાજુઓ અથવા શિરોબિંદુઓની સંખ્યા	વર્ગીકરણ	આકૃતિ
3	ત્રિકોણ	
4	ચતુષ્કોણ	
5	પંચકોણ	
6	ષટ્કોણ	
7	સપ્તકોણ	
8	અષ્ટકોણ	
9	નવકોણ	
10	દસકોણ	
⋮	⋮	⋮
$n$	$n$ -કોણ	

### 3.2.2 વિકર્ણ

બહુકોણનો વિકર્ણ એ કમ્બિક ના હોય તેવાં શિરોબિંદુઓને જોડવાથી મળતો રેખાખંડ છે.




તમે, ઉપરોક્ત આકૃતિમાં રહેલા વિકર્ણનાં નામ આપી શકશો ? (આકૃતિ 3.1)

શું  $\overline{PQ}$  વિકર્ણ છે ?  $\overline{LN}$  માટે શું કહી શકાય ?

એક બંધ વક્રમાં અંતર્ભાગ અને બહિર્ભાગ કોને કહેવાય તેનાથી આપ સુપરિચિત છો. (આકૃતિ 3.2)



અંતર્ભાગ




બહિર્ભાગ

આકૃતિ 3.2

અંતર્ભાગની એક સીમા હોય છે. શું બહિર્ભાગને પણ સીમા હોય ? તમારા મિત્રો સાથે આ વિશે ચર્ચા કરો.

### 3.2.3 બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણ

અહીં થોડા બહિર્મુખ (Convex) બહુકોણ અને થોડા અંતર્મુખ (Concave) બહુકોણ આપેલ છે. (આકૃતિ 3.3)



બહિર્મુખ બહુકોણ

અંતર્મુખ બહુકોણ


આકૃતિ 3.3


તમે કહી શકો, કે આ પ્રકારના બહુકોણ એકબીજાથી કેવી રીતે અલગ છે ? જે બહુકોણ બહિર્મુખ હોય છે તેમના વિકર્ણનો કોઈપણ ભાગ બહુકોણના બહિર્ભાગમાં હોતો નથી. અથવા બહુકોણના અંતર્ભાગમાં રહેલ બે ભિન્ન બિંદુઓને જોડતો કોઈ એક રેખાખંડ સંપૂર્ણપણે તેના અંતર્ભાગમાં જ હોય છે. શું આ વાક્ય અંતર્મુખ બહુકોણ માટે પણ સત્ય છે ? આપેલ આકૃતિઓનો અભ્યાસ કરો. તદુપરાંત પોતાના શબ્દોમાં બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણનું વર્ણન કરવાનો પ્રયત્ન કરો અને દરેક પ્રકારના બહુકોણની બે કાચી આકૃતિ દોરો.

આ ધોરણમાં આપણે ફક્ત બહિર્મુખ બહુકોણની જ ચર્ચા કરીશું.

### 3.2.4 નિયમિત અને અનિયમિત બહુકોણ

એક નિયમિત બહુકોણ સમબાજુ તથા સમકોણીય હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચોરસમાં બાજુના તથા ખૂણાનાં માપ સમાન હોય છે. આથી તે નિયમિત બહુકોણ છે. લંબચોરસ સમકોણીય છે પરંતુ સમબાજુ નથી. તો શું તે નિયમિત બહુકોણ છે ? શું સમબાજુ ત્રિકોણ નિયમિત બહુકોણ છે ? કેમ ?





નિયમિત બહુકોણ

બહુકોણ કે જે નિયમિત નથી

[નોંધ :  $\times\times$  અથવા  $\sphericalangle$ ની નિશાની સમાન લંબાઈવાળા રેખાખંડ દર્શાવે છે.]

અગાઉના ધોરણમાં તમે એવા કોઈ ચતુષ્કોણનો અભ્યાસ કર્યો છે કે જે સમબાજુ હોય પણ સમકોણ ના હોય ?

અગાઉના ધોરણમાં આવેલ ચતુષ્કોણની આકૃતિઓ યાદ કરો જેવી કે, લંબચોરસ, ચોરસ, સમબાજુ ચતુષ્કોણ વગેરે.

કોઈ એવો ત્રિકોણ છે કે જે સમબાજુ હોય પણ સમકોણ ના હોય ?


### 3.2.5 ખૂણાના સરવાળાનો ગુણધર્મ

તમને ત્રિકોણના ખૂણાના સરવાળાનો ગુણધર્મ યાદ છે ? ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો  $180^\circ$  થાય છે. આ નિત્યસમ સમજવા ઉપયોગમાં આવેલ પદ્ધતિને યાદ કરો. હવે આપણે આ નિત્યસમનો ઉપયોગ ચતુષ્કોણ માટે કરીશું.

#### આટલું કરો




1. એક ચતુષ્કોણ ABCD લો (આકૃતિ 3.4). તેનો એક વિકર્ણ દોરીને તેને બે ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરો. તમને છ ખૂણા 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 મળશે. ત્રિકોણ માટેના ખૂણાના સરવાળાના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને બતાવો કે કેવી રીતે  $\angle A$ ,  $\angle B$ ,  $\angle C$  તથા  $\angle D$ ના માપનો સરવાળો  $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$  થાય.




આકૃતિ 3.4

2. કોઈ એક ચતુષ્કોણની પૂંઠામાંથી બનાવેલ ચાર એવી પ્રતિકૃતિ લો કે જેમાં ખૂણા દર્શાવેલ હોય [આકૃતિ 3.5 (i)]. આ પ્રતિકૃતિઓને, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એવી રીતે ગોઠવો કે જેથી  $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$  એક જ બિંદુ પર મળે. (આકૃતિ 3.5(ii)).



(i)



(ii)

આકૃતિ 3.5

$\angle 1, \angle 2, \angle 3$  અને  $\angle 4$ ના સરવાળા વિશે શું કહી શકાય ?

(નોંધ : આપણે ખૂણાઓને  $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \dots$  તથા તેમના માપને  $m\angle 1, m\angle 2, m\angle 3, \dots$  વડે દર્શાવીશું.)


ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાના માપનો સરવાળો ..... થાય છે.

તમે ઉપરોક્ત પરિણામ અન્ય પદ્ધતિ દ્વારા પણ તારવી શકો છો.


આવું કરવા માટે તમારે ખૂણાઓની બાજુઓને વ્યવસ્થિત રીતે દોરવી પડે.



3. ચતુષ્કોણ ABCD પર પુનઃવિચાર કરો. (આકૃતિ 3.6) ધારો કે તેના અંતર્ભાગમાં કોઈ એક બિંદુ P આવેલ છે. બિંદુ P ને શિરોબિંદુઓ A, B, C, D સાથે જોડો. આકૃતિમાં ત્રિકોણ PAB વિશે વિચારો. અહીં આપણને  $x = 180^\circ - m\angle 2 - m\angle 3$  મળે છે. તેવી જ રીતે  $\Delta PBC$  માં,  $y = 180^\circ - m\angle 4 - m\angle 5$ ,  $\Delta PCD$  માં,  $z = 180^\circ - m\angle 6 - m\angle 7$  અને  $\Delta PDA$  માં  $w = 180^\circ - m\angle 8 - m\angle 1$  મળે. આનો ઉપયોગ કરીને કુલ માપ  $m\angle 1 + m\angle 2 + \dots + m\angle 8$  શોધો. શું આ તમને પરિણામ સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે ? યાદ રાખો.  $\angle x + \angle y + \angle z + \angle w = 360^\circ$  છે.
4. આ ચતુષ્કોણ બહિર્મુખ હતા. જો આ ચતુષ્કોણ બહિર્મુખ ન હોત તો શું થાત ? ચતુષ્કોણ ABCD પર વિચાર કરો. તેને બે ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરી તેના અંતઃકોણનો સરવાળો શોધો. (આકૃતિ 3.7)



આકૃતિ 3.6



આકૃતિ 3.7

### સ્વાધ્યાય 3.1


1. અહીં કેટલીક આકૃતિઓ આપેલ છે.



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



પ્રત્યેકનું નીચે દર્શાવેલ આધાર પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરો.

- (a) સરળ વક્ર (b) સરળ બંધ વક્ર (c) બહુકોણ  
(d) બહિર્મુખ બહુકોણ (e) અંતર્મુખ બહુકોણ

2. નીચે દર્શાવેલ પ્રત્યેકને કેટલા વિકર્ણ છે તે જણાવો.  
(a) બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ (b) નિયમિત ષટ્કોણ (c) ત્રિકોણ
3. બહિર્મુખ ચતુષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય ? હવે જો, ચતુષ્કોણ બહિર્મુખ ના હોય તો, શું આ ગુણધર્મ લાગુ પડશે ? (એક બહિર્મુખ ના હોય તેવો ચતુષ્કોણ બનાવો અને પ્રયત્ન કરો.)
4. નીચેનું કોષ્ટક જુઓ. (અહીં પ્રત્યેક આકૃતિને ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરેલ છે અને તેના પરથી ખૂણાના માપનો સરવાળો શોધેલ છે.)

આકૃતિ				
બાજુ	3	4	5	6
ખૂણાના માપનો સરવાળો	$180^\circ$	$2 \times 180^\circ$ $= (4 - 2) \times 180^\circ$	$3 \times 180^\circ$ $= (5 - 2) \times 180^\circ$	$4 \times 180^\circ$ $= (6 - 2) \times 180^\circ$




નિમ્નલિખિત સંખ્યા દર્શાવતી બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણના ખૂણાના માપના સરવાળા વિશે શું કહી શકાય ?

- (a) 7                      (b) 8                      (c) 10                      (d)  $n$


5. નિયમિત બહુકોણ એટલે શું ? એવા નિયમિત બહુકોણનાં નામ આપો જેમાં :

- (i) 3 બાજુ હોય      (ii) 4 બાજુ હોય      (iii) 6 બાજુ હોય


6. નીચેની આકૃતિઓમાં  $x$  (ખૂણાનું માપ) શોધો :




(a)



(b)




(c)




(d)

7.



(a)  $x + y + z$  શોધો.




(b)  $x + y + z + w$  શોધો.

### 3.3 એક બહુકોણનાં બહિષ્કોણનાં માપનો સરવાળો

કેટલાક પ્રસંગોમાં બહિષ્કોણ અંગેનું જ્ઞાન અંતઃકોણ તેમજ બાજુઓના પ્રકાર જાણવામાં મદદરૂપ થાય છે.

### આટલું કરો


ચોકના ટુકડાથી જમીન પર એક બહુકોણ બનાવો. (આકૃતિમાં, એક પંચકોણ ABCDE દર્શાવેલ છે.) (આકૃતિ 3.8). આપણે બધા જ ખૂણાના માપનો સરવાળો જાણવા માંગીએ છીએ, અર્થાત્  $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 4 + m\angle 5$ . શિરોબિંદુ A થી શરૂઆત કરીને  $\overline{AB}$  તરફ ચાલવાનું શરૂ કરો. B પર પહોંચ્યા બાદ, તમારે  $m\angle 1$  પર વળવું પડશે જેનાથી તમે  $\overline{BC}$  તરફ ચાલી શકશો. C પર પહોંચ્યા બાદ,  $\overline{CD}$  તરફ ચાલવા માટે તમારે  $m\angle 2$  પરથી વળવું પડશે. આ રીતે, બાજુ AB પર પરત ન ફરો ત્યાં સુધી ચાલવાનું ચાલુ રાખો. આ રીતે તમે એક ચક્કર પૂરું કરશો. આમ,  $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 4 + m\angle 5 = 360^\circ$ . ઉપરોક્ત પરિણામ, ગમે તેટલી બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણ માટે સત્ય છે. આથી, એક બહુકોણમાં બહિષ્કોણનાં માપનો સરવાળો  $360^\circ$  છે.



આકૃતિ 3.8

**ઉદાહરણ 1 :** આકૃતિ 3.9માં  $x$  નું માપ શોધો :

**ઉકેલ :**  $x + 90^\circ + 50^\circ + 110^\circ = 360^\circ$  (કેમ ?)  
 $x + 250^\circ = 360^\circ$   
 $x = 110^\circ$




આકૃતિ 3.9

### પ્રયત્ન કરો

એક નિયમિત ષટ્કોણ લો (આકૃતિ 3.10).

- તેના બહિષ્કોણ  $x, y, z, p, q$  તથા  $r$ નાં માપનો સરવાળો કેટલો છે ?
- $x = y = z = p = q = r$  છે ? કેમ ?
- નીચેના પ્રત્યેકનું માપ કેટલું હશે ?
  - બહિષ્કોણ
  - અંત:કોણ
- આ પ્રવૃત્તિ નીચે આપેલ સ્થિતિ માટે ફરીથી કરો.
  - નિયમિત અષ્ટકોણ
  - નિયમિત 20-કોણ



આકૃતિ 3.10

**ઉદાહરણ 2 :** એક નિયમિત બહુકોણના પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ  $45^\circ$  હોય તો તેની બાજુઓની સંખ્યા શોધો.

**ઉકેલ :** બધા જ, બહિષ્કોણનાં માપનો સરવાળો =  $360^\circ$   
 પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ =  $45^\circ$



એટલે, બહિષ્કોણની સંખ્યા =  $\frac{360}{45} = 8$

આપેલ બહુકોણને 8 બાજુ હશે.



## સ્વાધ્યાય 3.2

1. નીચેની આકૃતિઓમાં  $x$  શોધો.




2. નીચે પ્રમાણેની બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણમાં બહિષ્કોણનું માપ શોધો.  
(a) 9 બાજુ (b) 15 બાજુ
3. એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુઓ હોય તો તેના દરેક બહિષ્કોણનું માપ  $24^\circ$  થાય ?
4. એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુઓ હોય તો તેના દરેક અંતઃકોણનું માપ  $165^\circ$  થાય ?
5. (a) એવો નિયમિત બહુકોણ શક્ય છે કે જેમાં દરેક બહિષ્કોણનું માપ  $22^\circ$  હોય ?  
(b) શું આ માપ નિયમિત બહુકોણના અંતઃકોણનું હોઈ શકે ? કેમ ?
6. (a) નિયમિત બહુકોણમાં અંતઃકોણનું ઓછામાં ઓછું માપ કેટલું હોઈ શકે ? કેમ ?  
(b) નિયમિત બહુકોણમાં બહિષ્કોણનું વધુમાં વધુ માપ કેટલું હોઈ શકે ?

### 3.4 ચતુષ્કોણના પ્રકાર


ચતુષ્કોણની બાજુઓ તથા ખૂણાના પ્રકારના આધારે, તેને નામ આપવામાં આવે છે.

#### 3.4.1 સમલંબ ચતુષ્કોણ (Trapezium)

સમલંબ ચતુષ્કોણ એક એવો ચતુષ્કોણ છે, જેમાં સામસામેની બાજુની ફક્ત એક જ જોડની બાજુઓ પરસ્પર સમાંતર હોય છે.



સમલંબ ચતુષ્કોણ છે




સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી

ઉપરની આકૃતિઓનો અભ્યાસ કરો અને મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો કે, કેમ આમાંથી કેટલાક સમલંબ ચતુષ્કોણ છે જ્યારે બીજા નથી. (નોંધ : તીરની નિશાની સમાંતર રેખાઓ દર્શાવે છે.)

### આટલું કરો

1. બાજુઓનાં માપ 3 સેમી, 4 સેમી અને 5 સેમી હોય તેવા એકરૂપ ત્રિકોણના, એકસરખા ટુકડાઓ લો. તેમને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગોઠવો.



આકૃતિ 3.11

અહીં તમને એક સમલંબ ચતુષ્કોણ મળશે. (નિરીક્ષણ કરો!) કઈ બાજુઓ પરસ્પર સમાંતર છે ? અસમાંતર બાજુઓનું માપ સમાન છે ?


અહીં ઉપયોગમાં લીધેલ એકરૂપ ત્રિકોણના ઉપયોગથી તમને બીજા બે સમલંબ ચતુષ્કોણ મળી શકે છે. તેમને શોધી તેમના આકારની ચર્ચા કરો.

- તમારા તથા તમારા મિત્રોના “કંપાસબોક્સ”(જિઓમટ્રી બોક્સ)માંથી ચાર કાટખૂણિયા લો. તેમને અલગ-અલગ સંખ્યામાં ઉપયોગ કરી સાથે-સાથે રાખીને અલગ-અલગ પ્રકારના સમલંબ ચતુષ્કોણ મેળવો.


સમલંબ ચતુષ્કોણમાં પરસ્પર સમાંતર ન હોય તેવી બાજુઓ જો સમાન લંબાઈની હોય તો તે ચતુષ્કોણને સમદ્વિબાજુ સમલંબ ચતુષ્કોણ કહે છે. ઉપરોક્ત નિરીક્ષણમાં તમને એક પણ સમદ્વિબાજુ સમલંબ ચતુષ્કોણ મળ્યો ?

### 3.4.2 પતંગ (પતંગાકાર ચતુષ્કોણ) (Kite)

પતંગ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો ચતુષ્કોણ છે. દરેક આકૃતિમાં એકસરખી નિશાનીવાળી બાજુઓની લંબાઈ સમાન છે. દા.ત.,  $AB = AD$  અને  $BC = CD$ .



આ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે.



આ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ નથી.

આપેલ આકૃતિઓનો અભ્યાસ કરી અને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ વિશે સમજાવો. ધ્યાન આપો.

- પતંગને 4 બાજુઓ હોય છે (તે ચતુષ્કોણ છે).
- તેમાં સમાન લંબાઈવાળી પાસ-પાસેની બાજુની બે અલગ-અલગ જોડ હોય છે. ચોરસને પતંગ કહી શકાય કે નહીં તે ચકાસો.

### આટલું કરો

એક જાડો કાગળ લો. તેને વચ્ચેથી વાળો.

આકૃતિ 3.12માં બતાવ્યા પ્રમાણે અલગ-અલગ લંબાઈના બે રેખાખંડ દોરો.

આ રેખાખંડને કાપી અને કાગળને ખોલો.


તમને એક પતંગનો આકાર મળશે. (આકૃતિ 3.13)

પતંગમાં કોઈ સંમિત રેખા છે ?

પતંગના બંને વિકર્ણ પર ગડી વાળો. હવે આ વિકર્ણ કાટખૂણે છેદે છે કે નહીં તે કાટખૂણિયાની મદદથી ચકાસો. શું આ વિકર્ણની લંબાઈ સમાન છે ? વિકર્ણ પરસ્પર દુભાગે છે કે નહીં તે ચકાસો. (કાગળની ગડી વાળીને અથવા માપીને) પતંગના એક ખૂણાને, વિકર્ણની વિપરીત દિશામાં વાળીને સમાન માપના ખૂણા ચકાસો.


વિકર્ણ પર પડેલ ગડીનું નિરીક્ષણ કરો, શું તે એમ દર્શાવે છે કે વિકર્ણ એક ખૂણાનો દ્વિભાજક છે ?

તમારાં અવલોકનો તમારા મિત્રોને જણાવો અને તેની સૂચિ બનાવો. આ પરિણામોનો સારાંશ આ પ્રકરણમાં કોઈ એક જગ્યાએ આપેલ છે.



અહીં બતાવો કે  $\Delta ABC$  અને  $\Delta ADC$  એકરૂપ છે. તમે આમાંથી શું તારણ કાઢશો ?

આકૃતિ 3.12




આકૃતિ 3.13



**3.4.3 સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ (Parallelogram)**

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ એક ચતુષ્કોણ છે. તેના નામ પ્રમાણે તેનો સંબંધ સમાંતર રેખાઓ સાથે છે.



સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ નથી.

આ આકૃતિઓનો અભ્યાસ કરો અને પોતાના શબ્દોમાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરો કે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય ? તમારું નિરીક્ષણ તમારા મિત્રોને જણાવો.

લંબચોરસને સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ કહી શકાય કે નહીં તે ચકાસો.

**આટલું કરો**

પૂંઠાની બે અલગ-અલગ પહોળાઈવાળી લંબચોરસ પટ્ટીઓ લો. (આકૃતિ 3.14)



પટ્ટી-1



પટ્ટી-2

**આકૃતિ 3.14**

એક પૂંઠાની પટ્ટીને સમક્ષિતિજ રાખીને આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તેની લંબાઈની દિશામાં બે રેખા દોરો. (આકૃતિ 3.15)




**આકૃતિ 3.15**

હવે બીજી પટ્ટીને દોરેલી રેખાઓ ઉપર ત્રાંસી રાખીને આ જ પ્રમાણે બીજી બે રેખા દોરો. (આકૃતિ 3.16)

આ ચાર રેખા વડે બનતી બંધ આકૃતિ ચતુષ્કોણ છે. આ પરસ્પર સમાંતર રેખાની બે જોડ દ્વારા બનેલ છે. (આકૃતિ 3.17) જે એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.



આકૃતિ 3.16




આકૃતિ 3.17

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ એક એવો ચતુષ્કોણ છે જેમાં સામસામેની બાજુની દરેક જોડમાં બાજુઓ પરસ્પર સમાંતર હોય છે.

### 3.4.4 સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનાં અંગો

એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણને ચાર બાજુ અને ચાર ખૂણા હોય છે. આમાંથી અમુક સમાન માપના હોય છે. આ અંગોને સંબંધિત કેટલાક શબ્દો તમારે યાદ રાખવા પડશે.




આકૃતિ 3.18

એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD આપેલ છે (આકૃતિ 3.18).  $\overline{AB}$  અને  $\overline{CD}$  તેની સામસામેની બાજુ છે.  $\overline{AD}$  તથા  $\overline{BC}$  સામસામેની બાજુની બીજી જોડ બનાવે છે.  $\angle A$  તથા  $\angle C$  સામસામેના ખૂણાની એક જોડ છે અને આ પ્રકારે  $\angle B$  તથા  $\angle D$  સામસામેના ખૂણાની બીજી એક જોડ છે.

$\overline{AB}$  અને  $\overline{BC}$  પાસપાસેની બાજુ છે અર્થાત્ એક બાજુના અંત્યબિંદુથી બીજી બાજુની શરૂઆત થાય છે. શું  $\overline{BC}$  અને  $\overline{CD}$  પાસપાસેની બાજુ છે ? બીજી બે પાસપાસેની બાજુની જોડ શોધવાનો પ્રયત્ન કરો.  $\angle A$  અને  $\angle B$  સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના પાસપાસેના ખૂણા છે. આ ખૂણાઓ કોઈ એક બાજુનાં અંત્યબિંદુઓ પર બનેલા હોય છે.  $\angle B$  તથા  $\angle C$  પણ પાસપાસેના ખૂણા છે. આવી બીજી પાસ પાસેના ખૂણાની જોડને સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.

### આટલું કરો

એકરૂપ હોય તેવા બે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના ટુકડાઓ ABCD તથા A'B'C'D' લો (આકૃતિ 3.19).



આકૃતિ 3.19

અહીં  $\overline{AB}$  અને  $\overline{A'B'}$  સમાન છે, પરંતુ તેમના નામ અલગ છે. આવી જ રીતે બીજી સંગત બાજુની જોડ પણ સમાન માપની હશે.

હવે  $\overline{A'B'}$  ને  $\overline{DC}$  પર મૂકો. શું તે સુસંગત છે ? હવે તમે  $\overline{AB}$  અને  $\overline{DC}$  ની લંબાઈ વિશે શું કહેશો ?

આ જ પ્રમાણે  $\overline{AD}$  અને  $\overline{BC}$  ની લંબાઈનું નિરીક્ષણ કરો. તમને શું જોવા મળ્યું ?

આ જ પરિણામ તમને  $\overline{AB}$  અને  $\overline{DC}$  ની લંબાઈ માપીને પણ મળી શકશે.


**ગુણધર્મ :** સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુની લંબાઈ સમાન હોય છે.

### પ્રયત્ન કરો


$30^\circ-60^\circ-90^\circ$ ના ખૂણા ધરાવતા બે કાટખૂણિયા લો. હવે તેમને એ પ્રમાણે ગોઠવો કે જેથી સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ બને (આકૃતિ 3.20). શું આ પ્રવૃત્તિ તમને ઉપરોક્ત ગુણધર્મને ચકાસવામાં મદદ કરશે ?

તમે આ ગુણધર્મને તાર્કિક દલીલોથી પણ પ્રભાવશાળી બનાવી શકો છો.

એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD લો (આકૃતિ 3.21). તેનો વિકર્ણ  $\overline{AC}$  દોરો. આપણે જોઈએ છીએ કે  $\angle 1 = \angle 2$  અને  $\angle 3 = \angle 4$  (કેમ ?)



આકૃતિ 3.21



આકૃતિ 3.20

હવે ત્રિકોણ ABC અને ADCમાં,  $\angle 1 = \angle 2, \angle 3 = \angle 4$  અને  $\overline{AC}$  સામાન્ય બાજુ છે. તેથી એકરૂપતાની ખૂબાખૂ (ASA) શરત દ્વારા  $\Delta ABC \cong \Delta CDA$  (અહીં ખૂબાખૂ શરતનો ઉપયોગ કેવી રીતે થયો ?)

એટલે,  $AB = DC$  અને  $BC = AD$


**ઉદાહરણ 3 :** આકૃતિ 3.22 માં દર્શાવેલ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ PQRSની પરિમિતિ શોધો.

**ઉકેલ :** સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુનું માપ સમાન હોય છે.

એટલે,  $PQ = SR = 12$  સેમી

અને  $QR = PS = 7$  સેમી

$$\begin{aligned} \therefore \text{પરિમિતિ} &= PQ + QR + RS + SP \\ &= 12 \text{ સેમી} + 7 \text{ સેમી} + 12 \text{ સેમી} + 7 \text{ સેમી} \\ &= 38 \text{ સેમી} \end{aligned}$$



આકૃતિ 3.22


### 3.4.5 સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના ખૂણાઓ

આપણે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુનાં માપ સંબંધિત ગુણધર્મનો અભ્યાસ કર્યો. હવે ખૂણાઓ વિશે શું કહી શકાય ?

#### આટલું કરો



ધારો કે એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD છે (આકૃતિ 3.23) 'ટ્રેસિંગ' કાગળ પર આની એક નકલ A'B'C'D' દોરો. હવે A'B'C'D'ને ચતુષ્કોણ ABCD પર મૂકો. ચતુષ્કોણના વિકર્ણના છેદબિંદુ પર એક ટાંકણી લગાવો. હવે 'ટ્રેસિંગ' કાગળને 180°ના ખૂણો બનાવે તે રીતે ફેરવો. આ ચતુષ્કોણ હજુ પણ એકબીજાને સુસંગત હશે, પરંતુ હવે તમે જોશો કે બિંદુ A', બિંદુ C પર તથા તે જ રીતે બિંદુ B', બિંદુ D પર હશે.



આકૃતિ 3.23

ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિ દ્વારા તમને ખૂણા  $\angle A$  તથા ખૂણા  $\angle C$ ના માપ વિશે કાંઈ જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ ? આ જ રીતે  $\angle B$  તથા  $\angle D$ ના માપની જાણકારી મેળવો અને તમારું તારણ જણાવો.

**ગુણધર્મ :** સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણાનાં માપ સમાન હોય છે.


#### પ્રયત્ન કરો



30°-60°-90°ના માપ ધરાવતાં બે કાટખૂણિયા લઈને અગાઉની જેમ એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ બનાવો. શું આ રીતે બનેલ આકૃતિ ઉપરોક્ત ગુણધર્મની પુષ્ટિ કરે છે ?

ઉપરોક્ત ગુણધર્મને તમે તાર્કિક દલીલો દ્વારા પણ પુરવાર કરી શકો છો.


જો  $\overline{AC}$  અને  $\overline{BD}$  સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ હોય (આકૃતિ 3.24) તો તમને  $\angle 1 = \angle 2$ , અને  $\angle 3 = \angle 4$  મળે (કેમ ?)



આકૃતિ 3.24

$\triangle ABC$  અને  $\triangle ADC$  (આકૃતિ 3.25)નો અલગ-અલગ અભ્યાસ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે એકરૂપતાની ખૂબાખૂ (ASA) શરત પ્રમાણે,

$$\triangle ABC \cong \triangle CDA \text{ (કેવી રીતે ?)}$$



આકૃતિ 3.25

આ દર્શાવે છે કે  $\angle B$  અને  $\angle D$  નાં માપ સમાન છે. આ જ પ્રમાણે  $m\angle A = m\angle C$ .


**ઉદાહરણ 4 :** આકૃતિ 3.26 માં, BEST એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.  $x, y, z$  નાં મૂલ્ય શોધો.

**ઉકેલ :** બિંદુ S, બિંદુ Bની સામે છે.

તેથી  $x = 100^\circ$  (સામેના ખૂણાનો ગુણધર્મ)

$y = 100^\circ$  ( $\angle x$  નો અનુકોણ)

$z = 80^\circ$  ( $\angle y$  અને  $\angle z$  રેખિક જોડ બનાવે છે.)



આકૃતિ 3.26

હવે આપણે આપણું ધ્યાન સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના પાસપાસેના ખૂણાઓ ઉપર કેન્દ્રિત કરીએ. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD માં, (આકૃતિ 3.27)

$\angle A$  અને  $\angle D$ ,  $\overline{DC} \parallel \overline{AB}$  ની છેદિકા  $\overline{DA}$  થી બનતા છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણ હોવાથી તે એકબીજાના પૂરકકોણ છે.

$\angle A$  અને  $\angle B$  પણ એકબીજાના પૂરકકોણ છે. કેમ ?

$\angle A$  અને  $\angle B$ ,  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$  ની છેદિકા  $\overline{BA}$  થી બનતા છેદિકાની એકતરફના અંતઃકોણ છે.

આકૃતિ પરથી પૂરકકોણની આવી બીજી બે જોડ શોધો.

**ગુણધર્મ :** સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં પાસપાસેના ખૂણા એકબીજાના પૂરક હોય છે.

**ઉદાહરણ 5 :** સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ RING (આકૃતિ 3.28)માં, જો  $m\angle R = 70^\circ$  હોય તો બીજા ખૂણાનાં માપ શોધો.

**ઉકેલ :** અહીં  $m\angle R = 70^\circ$  આપેલ છે.


આથી  $m\angle N = 70^\circ$  થાય.

કારણ કે,  $\angle R$  અને  $\angle N$  સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના સામસામેના ખૂણા છે.

હવે  $\angle R$  અને  $\angle I$  એકબીજાના પૂરકકોણ હોવાથી  $m\angle I = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$

અને  $m\angle G = 110^\circ$ ,  $\angle G$  અને  $\angle I$  સામસામેના ખૂણા હોવાથી

આથી,  $m\angle R = m\angle N = 70^\circ$  અને  $m\angle I = m\angle G = 110^\circ$



આકૃતિ 3.27



આકૃતિ 3.28





## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

$m\angle R = m\angle N = 70^\circ$  દર્શાવ્યા બાદ, બીજી કોઈ રીતે  $m\angle I$  અને  $m\angle G$  નું માપ શોધી શકાય ?

### 3.4.6 સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ

સામાન્ય રીતે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણના માપ સમાન હોતા નથી. (શું તમે આ તમારી અગાઉની પ્રવૃત્તિઓમાં ચકાસ્યું ?) છતાં પણ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ એક વિશિષ્ટ ગુણધર્મ ધરાવે છે.

### આટલું કરો



સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનો એક કાપેલો ટુકડો (ધારો કે ABCD) લો. તેના વિકર્ણ એકબીજાને બિંદુ Oમાં છેદે છે.

બિંદુ C, બિંદુ A પર આવે તે રીતે ગડી વાળીને  $\overline{AC}$  નું મધ્યબિંદુ શોધો. શું આ મધ્યબિંદુ, બિંદુ O છે ?

શું આ બતાવે છે કે વિકર્ણ  $\overline{DB}$ , વિકર્ણ  $\overline{AC}$  ને બિંદુ Oમાં દુભાગે છે ? તમારા મિત્રો સાથે આની ચર્ચા કરો અને  $\overline{DB}$  નું મધ્યબિંદુ ક્યાં મળશે તે શોધવા આ પ્રવૃત્તિ ફરી કરો.

**ગુણધર્મ :** સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ એકબીજાને (તેમના છેદબિંદુમાં જ) દુભાગે છે.

ઉપરોક્ત ગુણધર્મને તાર્કિક દલીલોથી પુરવાર કરવો મુશ્કેલ નથી. આકૃતિ 3.30 માં એકરૂપતાની ખૂબાખૂ (ASA) શરતનો ઉપયોગ કરવાથી આપણે જોઈ શકીએ કે

$\triangle AOB \cong \triangle COD$  (અહીં ખૂબાખૂ શરત કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ ?)

તેથી  $AO = CO$  અને  $BO = DO$ .


**ઉદાહરણ 6 :** આકૃતિ 3.31 માં, HELP એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે (લંબાઈ સેમીમાં આપેલ છે). અહીં  $OE = 4$  અને HL, PE કરતાં 5 વધારે છે. તો OH શોધો.

**ઉકેલ :** જો,  $OE = 4$  હોય તો  $OP = 4$  (કેમ ?)


તેથી,  $PE = 8$  (કેમ ?)

આથી,  $HL = 8 + 5 = 13$


માટે,  $OH = \frac{1}{2} \times 13 = 6.5$  (સેમી)



આકૃતિ 3.29



આકૃતિ 3.30



આકૃતિ 3.31

## સ્વાધ્યાય 3.3


1. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD આપેલ છે. દરેક વિધાનને તેમાં ઉપયોગ કરવામાં આવેલ વ્યાખ્યા અથવા ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને પૂરું કરો.

(i)  $AD = \dots\dots$

(ii)  $\angle DCB = \dots\dots$


(iii)  $OC = \dots\dots$

(iv)  $m\angle DAB + m\angle CDA = \dots\dots$





2. નીચેના સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં  $x, y$  અને  $z$  નાં મૂલ્ય શોધો.



3. શું ચતુષ્કોણ ABCD, સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ થઈ શકે, જો .....

(i)  $\angle D + \angle B = 180^\circ$  ?

(ii)  $AB = DC = 8$  સેમી,  $AD = 4$  સેમી અને  $BC = 4.4$  સેમી ?


(iii)  $\angle A = 70^\circ$  અને  $\angle C = 65^\circ$  ?

4. એક એવા ચતુષ્કોણની કાચી (Rough) આકૃતિ દોરો કે જે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ના હોય પરંતુ સામસામેના ખૂણાની એક જોડ સમાન હોય.




5. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં બે પાસપાસેના ખૂણાના માપનો ગુણોત્તર 3:2 છે, તો ચતુષ્કોણના બધા જ ખૂણાના માપ શોધો.

6. એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના પાસપાસેના ખૂણાની એક જોડના ખૂણાના માપ સમાન છે. તો ચતુષ્કોણના બધા જ ખૂણાના માપ શોધો.

7. આકૃતિમાં એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ HOPE દર્શાવેલ છે.  $x, y, z$  ખૂણાના માપ શોધો. ખૂણો શોધવા કયા ગુણધર્મનો ઉપયોગ કર્યો છે તે જણાવો.




8. નીચેની આકૃતિ GUNS અને RUNS સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.  $x$  અને  $y$  શોધો. (લંબાઈ સેમીમાં છે.)




ઉપરની આકૃતિમાં RISK અને CLUE સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે, તો  $x$  શોધો.


10. નીચેની આકૃતિ સમલંબ ચતુષ્કોણ કેવી રીતે છે, તે સમજાવો. કઈ બે બાજુ પરસ્પર સમાંતર છે ? (આકૃતિ 3.32)



આકૃતિ 3.32



આકૃતિ 3.33



આકૃતિ 3.34

11. આકૃતિ 3.33 માં, જો  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$  હોય, તો  $m\angle C$  શોધો.  
12. આકૃતિ 3.34 માં, જો  $\overline{SP} \parallel \overline{RQ}$  હોય, તો  $\angle P$  અને  $\angle S$ નું માપ શોધો. (જો તમે  $m\angle R$  શોધતા હોય, તો શું,  $m\angle P$  શોધવાની અન્ય પદ્ધતિઓ હશે ?)




### 3.5 વિશિષ્ટ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ

#### 3.5.1 સમબાજુ ચતુષ્કોણ (Rhombus)


પતંગાકાર ચતુષ્કોણની (જે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ નથી) એક વિશેષ સ્થિતિમાં આપણને સમબાજુ ચતુષ્કોણ (તમે જોશો, કે તે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ હશે) મળે છે.

#### આટલું કરો

તમે પોતે બનાવેલ પતંગાકાર ચતુષ્કોણને યાદ કરો.



પતંગ-કાપ



સમબાજુ ચતુષ્કોણ-કાપ


જ્યારે તમે ABCની દિશામાં કાગળને કાપીને ખોલો છો ત્યારે તમને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ મળે છે. અહીં AB અને BCની લંબાઈ અલગ-અલગ છે. હવે જો તમે  $AB = BC$  દોરો, તો મળેલ પતંગાકાર ચતુષ્કોણને, સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય.

ધ્યાન રાખો, સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં બધી જ બાજુની લંબાઈ સમાન હોય છે, પરંતુ પતંગાકાર ચતુષ્કોણમાં આ આવશ્યક નથી. સમબાજુ ચતુષ્કોણ એક એવો ચતુષ્કોણ છે કે જેમાં બધી જ બાજુની લંબાઈ સમાન હોય છે.

હવે, સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુની લંબાઈ સમાન હોવાથી તે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ પણ થાય. તેથી સમબાજુ ચતુષ્કોણ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ અને પતંગ બંનેના બધા જ ગુણધર્મ ધરાવે છે. તેમની યાદી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. ત્યાર બાદ, તમે બનાવેલ યાદીને આ પુસ્તકમાં આપેલ યાદી સાથે સરખાવો.



પતંગાકાર ચતુષ્કોણ



સમબાજુ ચતુષ્કોણ


સમબાજુ ચતુષ્કોણનો સૌથી અગત્યનો ગુણધર્મ તેના વિકર્ણ વિશે છે.  
**ગુણધર્મ :** સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ એકબીજાને કાટખૂણે દુભાગે છે.

### આટલું કરો

સમબાજુ ચતુષ્કોણની કાગળની એક પ્રતિકૃતિ લો. હવે આ કાગળની ગડી વાળી અને ચકાસો કે બે વિકર્ણાનું છેદબિંદુ એ જ તેમનું મધ્યબિંદુ છે કે નહીં ? કાટખૂણિયાનો ઉપયોગ કરીને ચકાસો કે બે વિકર્ણ એકબીજાને કાટખૂણે છેદે છે.



અહીં આ ગુણધર્મને તાર્કિક દલીલોથી પુરવાર કરતું એક રેખાચિત્ર આપેલ છે. ABCD એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ (આકૃતિ 3.35) છે. તેથી, તે એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ પણ છે. તેના વિકર્ણ એકબીજાને દુભાગે છે. માટે,  $OA = OC$  અને  $OB = OD$  થાય. અહીં,  $m\angle AOD = m\angle COD = 90^\circ$  સાબિત કરવાનું છે.



આકૃતિ 3.35

એકરૂપતાની બાબાબા (SSS) શરતને આધારે

$$\Delta AOD \cong \Delta COD$$

માટે  $m\angle AOD = m\angle COD$


હવે  $\angle AOD$  અને  $\angle COD$ , રેખિક જોડના ખૂણા હોવાથી,

$$m\angle AOD = m\angle COD = 90^\circ$$

અહીં  $AO = CO$  (કેમ ?)  
 $AD = CD$  (કેમ ?)  
 $OD = OD$

### ઉદાહરણ 7 :

RICE સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે (આકૃતિ 3.36).  $x, y, z$  શોધો અને તેની સત્યાર્થતા પુરવાર કરો.



આકૃતિ 3.36

### ઉકેલ :

$$\begin{aligned} x &= OE & y &= OR & z &= \text{સમબાજુ ચતુષ્કોણની બાજુ છે} \\ &= OI \text{ (વિકર્ણ દુભાગે છે)} & &= OC \text{ (વિકર્ણ દુભાગે છે)} & &= 13 \text{ (બધી બાજુઓ સમાન હોય)} \\ &= 5 & &= 12 & & \end{aligned}$$

### 3.5.2 લંબચોરસ (Rectangle)

લંબચોરસ એક સમાન માપના ખૂણા ધરાવતો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે. (આકૃતિ 3.37)

ઉપરની વ્યાખ્યાનો અર્થ શું થાય ? તમારા મિત્રો જોડે ચર્ચા કરો.

હવે જો, લંબચોરસના બધા જ ખૂણાના માપ સમાન હોય તો દરેક ખૂણાનું માપ કેટલું હશે ?

ધારો કે દરેક ખૂણાનું માપ  $x^\circ$  છે.

તેથી,  $4x^\circ = 360^\circ$  (કેમ ?)

$$\therefore x^\circ = 90^\circ$$

તેથી, લંબચોરસનો દરેક ખૂણો કાટખૂણો હોય છે.

આમ લંબચોરસ, એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે. જેના બધા જ ખૂણા કાટખૂણા હોય છે.


સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ હોવાને લીધે લંબચોરસની સામસામેની બાજુઓ સમાન લંબાઈની હોય છે તથા તેના વિકર્ણ એકબીજાને દુભાગે છે.




આકૃતિ 3.37

લંબચોરસમાં વિકર્ણની લંબાઈ અસમાન હોઈ શકે ? (ચકાસો); તમને આશ્ચર્ય થશે કે લંબચોરસ(વિશેષ હોવાથી)ના વિકર્ણ સમાન લંબાઈના હોય છે.


ગુણધર્મ : લંબચોરસના વિકર્ણની લંબાઈ સમાન હોય છે.



આકૃતિ 3.38



આકૃતિ 3.39



આકૃતિ 3.40

આ પુરવાર કરવું એકદમ સરળ છે. જો ABCD લંબચોરસ હોય (આકૃતિ 3.38) અને તેમાં બનતા ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ ABD (અનુક્રમે આકૃતિ 3.39 અને 3.40)નું અલગ-અલગ નિરીક્ષણ કરતાં આપણને

$$\Delta ABC \cong \Delta ABD \text{ મળે}$$

$$\begin{aligned} \text{કારણ કે, } AB &= AB && \text{(સામાન્ય બાજુ)} \\ BC &= AD && \text{(કેમ ?)} \\ m\angle A &= m\angle B = 90^\circ && \text{(કેમ ?)} \end{aligned}$$

આ એકરૂપતા બાખૂબા (SAS) શરતને અનુસરે છે.

$$\text{તેથી } AC = BD$$

અને લંબચોરસમાં વિકર્ણ સમાન લંબાઈના હોવા ઉપરાંત એકબીજાને દુભાગે પણ છે. (કેમ ?)


**ઉદાહરણ 8 :** RENT, લંબચોરસ છે. તેના વિકર્ણ પરસ્પર બિંદુ O માં છેદે છે. જો  $OR = 2x + 4$  અને  $OT = 3x + 1$  હોય, તો  $x$  શોધો.

**ઉકેલ :**  $\overline{OT}$  ની લંબાઈ, વિકર્ણ  $\overline{TE}$  ની લંબાઈથી અર્ધી છે અને  $\overline{OR}$  ની લંબાઈ, વિકર્ણ  $\overline{RN}$  કરતાં અર્ધી છે. બંને વિકર્ણની લંબાઈ સમાન છે. (કેમ ?)

તેથી, તેમના અર્ધા ભાગ પણ સમાન લંબાઈના થાય.

$$\text{માટે, } 3x + 1 = 2x + 4$$

$$\therefore x = 3$$



આકૃતિ 3.41


### 3.5.3 ચોરસ (Square)

ચોરસ, એક સમાન લંબાઈવાળી બાજુ ધરાવતો લંબચોરસ છે.

આમ ચોરસ, લંબચોરસના બધા જ ગુણધર્મો ધરાવે છે તેમજ બધી જ બાજુની લંબાઈ સમાન હોવાનો એક વધારાનો ગુણધર્મ પણ ધરાવે છે.

લંબચોરસની જેમ જ ચોરસના વિકર્ણ પણ સમાન લંબાઈના હોય છે.

લંબચોરસના વિકર્ણ પરસ્પર કાટખૂણે હોય તે જરૂરી નથી. (ચકાસો)



BELT એક ચોરસ છે.  $BE = EL = LT = TB$

$\angle B, \angle E, \angle L, \angle T$  કાટખૂણા છે.

$BL = ET$  અને  $\overline{BL} \perp \overline{ET}$  છે.

$OB = OL$  અને  $OE = OT$ .



કોઈ પણ ચોરસમાં વિકર્ણ


- (i) પરસ્પર દુભાગે. (ચોરસ એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ હોવાથી)
- (ii) સમાન લંબાઈના હોય. (ચોરસ એક લંબચોરસ હોવાથી)
- (iii) પરસ્પર લંબ હોય.

તેથી આપણને નીચે પ્રમાણેનો ગુણધર્મ મળે.

ગુણધર્મ : ચોરસના વિકર્ણ એકબીજાને કાટખૂણે દુભાગે છે.

### આટલું કરો

એક ચોરસ ટુકડો PQRS લો. (આકૃતિ 3.42) તેના વિકર્ણ પરથી તેની ગડી વાળો. શું બંને વિકર્ણનું મધ્યબિંદુ એક જ છે ? કાટખૂણિયાની મદદથી ખૂણા O નું માપ  $90^\circ$  છે કે નહીં તે ચકાસો. આ ઉપરોક્ત ગુણધર્મને સાબિત કરે છે.



આકૃતિ 3.42

આ ગુણધર્મને આપણે તાર્કિક દલીલો દ્વારા પણ સાબિત કરી શકીએ :

ચોરસ ABCD ના વિકર્ણ પરસ્પર બિંદુ Oમાં છેદે છે. (આકૃતિ 3.43)


OA = OC (ચોરસ એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ હોવાથી)

એકરૂપતાની બાબાબા શરત પ્રમાણે આપણને,

$$\Delta AOD \cong \Delta COD \text{ (કેમ ?)}$$

માટે  $m\angle AOD = m\angle COD$

આ ખૂણાઓ રૈખિક જોડના હોવાથી દરેક ખૂણો કાટખૂણો છે.



આકૃતિ 3.43

### સ્વાધ્યાય 3.4

1. નીચેનાં વિધાનો સાચાં છે કે ખોટાં તે જણાવો.

- (a) દરેક લંબચોરસ ચોરસ છે.
- (b) દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.
- (c) દરેક ચોરસ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે તેમજ લંબચોરસ પણ છે.
- (d) દરેક ચોરસ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ નથી.
- (e) દરેક પતંગાકાર ચતુષ્કોણ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે.
- (f) દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે.
- (g) દરેક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.
- (h) દરેક ચોરસ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.

2. એવા ચતુષ્કોણનાં નામ આપો કે જેમાં :

- (a) ચારેય બાજુની લંબાઈ સમાન હોય. (b) ચાર કાટખૂણા હોય.

3. કેવી રીતે એક ચોરસ એ


- (i) ચતુષ્કોણ (ii) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ (iii) સમબાજુ ચતુષ્કોણ (iv) લંબચોરસ છે તે વિગતવાર સમજાવો.

4. નીચે દર્શાવ્યા મુજબ વિકર્ણ ધરાવતાં ચતુષ્કોણનાં નામ આપો.

- (i) પરસ્પર દુભાગે (ii) પરસ્પરના લંબદ્વિભાજક હોય (iii) સમાન હોય

5. લંબચોરસ એક બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે, સમજાવો.

6. કાટકોણ ત્રિકોણ ABCમાં કાટખૂણાની સામેની બાજુનું મધ્યબિંદુ O છે. શિરોબિંદુઓ A, B અને Cથી બિંદુ O કેવી રીતે સમાન અંતરે આવે છે તે સમજાવો. (અહીં તૂટક રેખાઓ તમારી સહાયતા માટે દોરેલ છે.)







## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

- કડિયો કોંક્રિટનો એક 'સ્લેબ' બનાવે છે. તે તેને લંબચોરસ બનાવવા માંગે છે. કેટલા અલગ-અલગ પ્રકારથી, તે આ 'સ્લેબ' લંબચોરસ જ છે તેવી ચકાસણી કરી શકશે ?
- સમાન લંબાઈની બાજુઓ ધરાવતા લંબચોરસ તરીકે ચોરસને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો હતો. આપણે તેને સમાન ખૂણા ધરાવતાં સમબાજુ ચતુષ્કોણ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ ? સ્પષ્ટતા કરો.
- સમલંબ ચતુષ્કોણના બધા જ ખૂણા સમાન હોઈ શકે ? તેની દરેક બાજુઓ સમાન હોઈ શકે ? સ્પષ્ટતા કરો.

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

ચતુષ્કોણ	ગુણધર્મ
<p>સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ :</p> <p>સામસામેની બાજુની પ્રત્યેક જોડ સમાંતર હોય તેવો ચતુષ્કોણ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) સામસામેની બાજુની લંબાઈ સમાન હોય.</li> <li>(2) સામસામેનાં ખૂણાનાં માપ સમાન હોય.</li> <li>(3) વિકર્ણ પરસ્પર દુભાગે.</li> </ol>
<p>સમબાજુ ચતુષ્કોણ :</p> <p>સમાન લંબાઈની બાજુ ધરાવતો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના બધા જ ગુણધર્મો.</li> <li>(2) વિકર્ણ પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે.</li> </ol>
<p>લંબચોરસ :</p> <p>કાટકોણ ધરાવતો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના બધા જ ગુણધર્મો.</li> <li>(2) દરેક ખૂણો કાટખૂણો હોય.</li> <li>(3) વિકર્ણની લંબાઈ સમાન હોય.</li> </ol>
<p>ચોરસ :</p> <p>સમાન લંબાઈની બાજુ ધરાવતો લંબચોરસ.</p>	<p>સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ, સમબાજુ ચતુષ્કોણ અને લંબચોરસના બધા જ ગુણધર્મો.</p>
<p>પતંગાકાર ચતુષ્કોણ :</p> <p>પાસપાસેની બાજુઓની ફક્ત બે જોડ સમાન લંબાઈની હોય તેવો ચતુષ્કોણ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) વિકર્ણ પરસ્પર કાટખૂણે હોય.</li> <li>(2) એક વિકર્ણ, બીજા વિકર્ણને દુભાગે.</li> <li>(3) આપેલ આકૃતિમાં <math>m\angle B = m\angle D</math> પણ <math>m\angle A \neq m\angle C</math></li> </ol>



## પ્રાયોગિક ભૂમિતિ

પ્રકરણ

4

### 4.1 પ્રાસ્તાવિક

ધોરણ 7 માં તમે ત્રિકોણ કઈ રીતે દોરવો તે શીખી ચૂક્યા છો. ત્રિકોણને ત્રણ ખૂણા અને ત્રણ બાજુઓ હોય છે. કોઈ પણ નિશ્ચિત ત્રિકોણ દોરવા માટે આપણી પાસે ત્રણ ખૂણા અને ત્રણ બાજુઓમાંથી કોઈ પણ ત્રણનાં માપ હોવાં જરૂરી છે.

આમ, નિશ્ચિત ત્રિકોણ દોરવા માટે ત્રણ માપ પૂરતાં છે. તો હવે આપણને સહજ પ્રશ્ન થશે કે તો શું એક ચાર બાજુવાળી બંધ આકૃતિ એટલે કે ચતુષ્કોણ (Quadrilateral)ને દોરવા માટે ચાર માપ પૂરતાં છે ?

### આટલું કરો

10 સેમી લંબાઈની સળીઓની એક જોડ લો. સળીઓની બીજી જોડ 8 સેમી લંબાઈની લો. હવે આકૃતિ 4.1માં દર્શાવ્યા મુજબ ચારે સળીઓને જોડી એક લંબચોરસ બનાવો કે જેની લંબાઈ 10 સેમી અને પહોળાઈ 8 સેમી હોય.


આ લંબચોરસ આપેલા ચાર માપથી બનાવવામાં આવ્યો છે.

હવે લંબચોરસના પાયા (BC) ને જરા ડાબી બાજુ ખસેડો, જેથી આકૃતિ 4.2 જેવો આકાર પ્રાપ્ત થશે. શું આ પ્રાપ્ત થયેલો આકાર (આકૃતિ 4.2) લંબચોરસ છે ? ના, તમે જોઈ શકો છો કે લંબચોરસ હવે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ બની ચૂક્યો છે.


શું તમે સળીઓની લંબાઈમાં ફેરફાર કર્યો ? ના, બાજુઓનાં માપ જેમના તેમ જ છે તેમાં કશો ફેરફાર કરેલ નથી.

હવે ફરી ચતુષ્કોણ ABCD ના પાયા BC ને વિરૂદ્ધ દિશામાં ખસેડો. તમને કેવો આકાર પ્રાપ્ત થયો ? તમને ફરીથી એક જુદા પ્રકારનો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ પ્રાપ્ત થશે જે આકૃતિ 4.3માં દર્શાવેલ છે. હજુ પણ ચતુષ્કોણની બાજુઓ તો પહેલાં હતી તે જ છે.


આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા જાણવા મળે છે કે નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ દોરવા માટે ચાર માપ પૂરતાં નથી, તો શું પાંચ માપ પૂરતાં છે ? ચાલો, આ બાબત ચકાસવા બીજી પ્રવૃત્તિ કરીએ.



આકૃતિ 4.1




આકૃતિ 4.2



આકૃતિ 4.3

હવે ધારો કે તમે 10 સેમી લંબાઈની બે સળીઓ અને 8 સેમી લંબાઈની બે સળીઓનો ઉપયોગ કરી, એક લંબચોરસ બનાવ્યો છે. હવે BD લંબાઈની એક સળીને આકૃતિ 4.4માં બતાવ્યા મુજબ B અને D સાથે જોડી દો. જુઓ, હવે તમે લંબચોરસના પાયા BC ને ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ ખસેડીને આકાર બદલી શકો છો ? ના, આકૃતિને ખોલ્યા સિવાય આ શક્ય નથી. આમ, પાંચમી સળીને લંબચોરસના વિકર્ણ (Diagonal) તરીકે ગોઠવતાં એક નિશ્ચિત લંબચોરસ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો બીજો કોઈ ચતુષ્કોણ (આપેલ બાજુઓની લંબાઈ ધરાવતો) શક્ય નથી. આ રીતે આપણે અહીં જોયું કે પાંચ માપ દ્વારા નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ શું પાંચ માપ (ખૂણા અને બાજુ) એક નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ દોરવા માટે પૂરતાં છે ?



## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

અર્ષદ પાસે ચતુષ્કોણ ABCD ના પાંચ માપ આ મુજબ છે;  $AB = 5$  સેમી,  $\angle A = 50^\circ$ ,  $AC = 4$  સેમી,  $BD = 5$  સેમી અને  $AD = 6$  સેમી, તો શું એક નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ રચી શકાશે ? તમારા જવાબનું કારણ આપો.

## 4.2 ચતુષ્કોણ રચો

નીચે આપેલાં માપના આધારે આપણે નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ કેવી રીતે રચી શકાય તે શીખીશું :


- જ્યારે ચાર બાજુ અને એક વિકર્ણ આપ્યો હોય.
- જ્યારે બે વિકર્ણો અને ત્રણ બાજુ આપી હોય.
- જ્યારે પાસ-પાસેની બે બાજુ અને ત્રણ ખૂણા આપ્યા હોય.
- જ્યારે ત્રણ બાજુ અને તેના બે અંતર્ગત ખૂણા આપ્યા હોય.
- જ્યારે અન્ય ખાસ લાક્ષણિકતા જાણતા હોઈએ.

તો ચાલો, એક પછી એક આ બધી રચનાઓ લઈએ.

### 4.2.1 જ્યારે ચાર બાજુ અને એક વિકર્ણની લંબાઈ આપ્યા હોય

આ પ્રકારની રચના આપણે એક ઉદાહરણથી સમજીએ.

**ઉદાહરણ 1 :** ચતુષ્કોણ PQRS રચો, જ્યાં  $PQ = 4$  સેમી,  $QR = 6$  સેમી,  $RS = 5$  સેમી,  $PS = 5.5$  સેમી અને  $PR = 7$  સેમી.




આકૃતિ 4.5

**ઉકેલ :** (આકૃતિ 4.5માં આપણે ચતુષ્કોણની કાચી આકૃતિ દોરેલ છે. જે આપણને ચતુષ્કોણ સમજવામાં ઉપયોગી થશે. આપણે પહેલા ચતુષ્કોણને દોરી અને પછી નામ નિદર્શન કરેલ છે.)



**સોપાન 1 :** આકૃતિ 4.5 પરથી આપણે સરળતાથી જોઈ શકીએ છીએ કે બાબાબા રચનાની શરત મુજબ આપણે  $\Delta PQR$  રચી શકીએ.


આકૃતિ 4.6માં આપણે  $\Delta PQR$  રચ્યો.



આકૃતિ 4.6


**સોપાન 2 :** હવે આપણે ચોથું બિંદુ S દર્શાવીશું. આ બિંદુ S એ PRની સાપેક્ષે Qની વિરુદ્ધ દિશામાં દર્શાવીશું. આ માટે આપણી પાસે બે માપ છે.

બિંદુ S એ બિંદુ P થી 5.5 સેમી દૂર છે. તેથી, Pને કેન્દ્ર રાખી 5.5 સેમીની એક ચાપ દોરો. (બિંદુ S એ આ ચાપ ઉપર ક્યાંક હશે.) (આકૃતિ 4.7)



આકૃતિ 4.7


**સોપાન 3 :** બિંદુ S એ બિંદુ R થી 5 સેમી દૂર છે. તેથી, Rને કેન્દ્ર લઈને 5 સેમીની ચાપ રચો. (બિંદુ S એ આ ચાપ ઉપર પણ ક્યાંક હશે.) (આકૃતિ 4.8)



આકૃતિ 4.8



સોપાન 4 : બિંદુ S આપણે દોરેલી બંને ચાપ પર હોવું જોઈએ. તેથી તે બંને ચાપનું છેદબિંદુ છે. તેને S દર્શાવીને ચતુષ્કોણ PQRS પૂર્ણ કરો. આ PQRS એ માગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ છે. (આકૃતિ 4.9)



આકૃતિ 4.9

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો



- (i) આપણે જોયું કે ચતુષ્કોણના પાંચ માપ એક નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ નિર્ધારિત કરે છે. શું તમે કહી શકશો કે ચતુષ્કોણનાં કોઈ પણ પાંચ માપ દ્વારા આ રીતે નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ નિર્ધારિત થશે ?
- (ii) શું તમે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ BATS એવો દોરી શકો કે જ્યાં  $BA = 5$  સેમી,  $AT = 6$  સેમી અને  $AS = 6.5$  સેમી હોય ? શા માટે ?
- (iii) શું તમે સમબાજુ ચતુષ્કોણ ZEAL એવો દોરી શકો કે જ્યાં  $ZE = 3.5$  સેમી, વિકર્ણ  $EL = 5$  સેમી હોય ? શા માટે ?
- (iv) એક વિદ્યાર્થીએ ચતુષ્કોણ PLAY દોરવા પ્રયત્ન કર્યો, જ્યાં  $PL = 3$  સેમી,  $LA = 4$  સેમી,  $AY = 4.5$  સેમી,  $PY = 2$  સેમી અને  $LY = 6$  સેમી હોય, પરંતુ તે દોરી ન શક્યો. શું કારણ હોય ? (સૂચન : કાચી આકૃતિ દોરી ચર્ચા કરો.)

### સ્વાધ્યાય 4.1



1. નીચેના ચતુષ્કોણની રચના કરો.

(i) ચતુષ્કોણ ABCD

$$AB = 4.5 \text{ સેમી}$$

$$BC = 5.5 \text{ સેમી}$$

$$CD = 4 \text{ સેમી}$$

$$AD = 6 \text{ સેમી}$$

$$AC = 7 \text{ સેમી}$$

(iii) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ MORE

$$OR = 6 \text{ સેમી}$$

$$RE = 4.5 \text{ સેમી}$$

$$EO = 7.5 \text{ સેમી}$$

(ii) ચતુષ્કોણ JUMP

$$JU = 3.5 \text{ સેમી}$$

$$UM = 4 \text{ સેમી}$$

$$MP = 5 \text{ સેમી}$$

$$PJ = 4.5 \text{ સેમી}$$

$$PU = 6.5 \text{ સેમી}$$

(iv) સમબાજુ ચતુષ્કોણ BEST

$$BE = 4.5 \text{ સેમી}$$

$$ET = 6 \text{ સેમી}$$



### 4.2.2 જ્યારે બે વિકર્ણ અને ત્રણ બાજુ આપી હોય


જ્યારે ચાર બાજુ અને એક વિકર્ણ આપ્યા હોય ત્યારે આપણે આપેલી માહિતી પરથી પહેલાં ત્રિકોણ દોરીએ છીએ અને પછી ચોથું બિંદુ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એ જ રીતનો ઉપયોગ આપણે અહીંયાં કરીશું.



**ઉદાહરણ 2 :** ચતુષ્કોણ ABCD રચો, જ્યાં  $BC = 4.5$  સેમી,  $AD = 5.5$  સેમી,  $CD = 5$  સેમી, વિકર્ણ  $AC = 5.5$  સેમી અને વિકર્ણ  $BD = 7$  સેમી આપેલા હોય.


**ઉકેલ :**

અહીંયાં આકૃતિ 4.10માં ચતુષ્કોણ ABCD ની કાચી આકૃતિ દર્શાવેલ છે. આ આકૃતિનો અભ્યાસ કરો. આપણે સરળતાથી જોઈ શકીશું કે પ્રથમ  $\triangle ACD$  દોરવો શક્ય છે. (કઈ રીતે ?)




આકૃતિ 4.10

**સોપાન 1 :** બાબાબા રચનાના આધારે  $\triangle ACD$  રચો. (આકૃતિ 4.11) (હવે આપણે D ની વિરુદ્ધ બાજુએ બિંદુ B એવું મેળવીશું કે જે C બિંદુથી 4.5 સેમી અને D બિંદુથી 7 સેમી દૂર હોય.)





આકૃતિ 4.11

**સોપાન 2 :** Dને કેન્દ્ર રાખી 7 સેમી ત્રિજ્યાની એક ચાપ રચો. (બિંદુ B આ ચાપ પર ક્યાંક હશે.) (આકૃતિ 4.12)




આકૃતિ 4.12

**સોપાન 3 :** C ને કેન્દ્ર રાખી 4.5 સેમી ત્રિજ્યાની એક ચાપ રચો. (બિંદુ B આ ચાપ ઉપર પણ ક્યાંક હશે.) (આકૃતિ 4.13)



આકૃતિ 4.13

સોપાન 4 : હવે B બંને ચાપ ઉપર આવેલ છે. માટે B એ બંને ચાપના છેદબિંદુ પર આવેલ હશે. હવે B દર્શાવીને ABCD પૂર્ણ કરો. આમ, ABCD એ માંગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ છે. (આકૃતિ 4.14)



આકૃતિ 4.14

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો



- શું ઉપરના ઉદાહરણમાં આપણે પહેલા  $\triangle ABD$  દોરી પછી ચોથું બિંદુ C શોધીને, ચતુષ્કોણ દોરી શકીએ ?
- શું તમે ચતુષ્કોણ PQRS એવો રચી શકો જ્યાં  $PQ = 3$  સેમી,  $RS = 3$  સેમી,  $PS = 7.5$  સેમી,  $PR = 8$  સેમી અને  $SQ = 4$  સેમી હોય ? તમારા જવાબને ચકાસો.

### સ્વાધ્યાય 4.2

1. નીચેના ચતુષ્કોણની રચના કરો.

(i) ચતુષ્કોણ LIFT

LI = 4 સેમી

IF = 3 સેમી

TL = 2.5 સેમી

LF = 4.5 સેમી

IT = 4 સેમી

(iii) સમબાજુ ચતુષ્કોણ BEND

BN = 5.6 સેમી

DE = 6.5 સેમી

(ii) ચતુષ્કોણ GOLD

OL = 7.5 સેમી

GL = 6 સેમી

GD = 6 સેમી

LD = 5 સેમી

OD = 10 સેમી

#### 4.2.3 જ્યારે પાસ-પાસેની બે બાજુ અને ત્રણ ખૂણા જાણતા હોઈએ


આ અગાઉ આપણે રચનાની શરૂઆતમાં એક ત્રિકોણ રચી પછી ચોથું બિંદુ મેળવી અને ચતુષ્કોણ પૂર્ણ કરેલ છે.

**ઉદાહરણ 3 :** ચતુષ્કોણ MIST રચો, જ્યાં  $MI = 3.5$  સેમી,  $IS = 6.5$  સેમી,  $\angle M = 75^\circ$ ,  $\angle I = 105^\circ$  અને  $\angle S = 120^\circ$  હોય.




4ZGV2D

**ઉકેલ :** અહીં આકૃતિ 4.15માં ચતુષ્કોણ MIST ની કાચી આકૃતિ દર્શાવેલ છે જે આપણને રચનાનાં સોપાનો નક્કી કરવામાં ઉપયોગી થશે.




આકૃતિ 4.15

**સોપાન 1 :** તમે બિંદુઓ કેવી રીતે દર્શાવશો ? તમારી પાસે શરૂઆત કરવા માટેના વિકલ્પો કયા છે અને પહેલું સોપાન શું હોઈ શકે ? આટલું વિચારી તમે (આકૃતિ 4.16) માં દર્શાવ્યા મુજબ, 3.5 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ MI રચ્યા બાદ I બિંદુ પાસે  $\angle MIS = 105^\circ$  રચી શકો.



આકૃતિ 4.16


**સોપાન 2 :** હવે બિંદુ S પાસે  $\angle ISY = 120^\circ$  રચો. (આકૃતિ 4.17)



આકૃતિ 4.17



સોપાન 3 : બિંદુ M પાસે  $\angle IMZ = 75^\circ$  રચો. (આમ કરવાથી શું SY અને MZ એકબીજાને છેદે છે ?) આ બિંદુને T વડે દર્શાવો. આ રીતે આપણને માગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ MIST પ્રાપ્ત થશે (આકૃતિ 4.18).



આકૃતિ 4.18



### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

- જો આપણી પાસે  $\angle M$  એ  $75^\circ$ ને બદલે  $100^\circ$  હોય, તો શું તમે ઉપરનો ચતુષ્કોણ MIST રચી શકો ?
- જો  $PL = 6$  સેમી,  $LA = 9.5$  સેમી,  $\angle P = 75^\circ$ ,  $\angle L = 150^\circ$  અને  $\angle A = 140^\circ$  હોય, તો તમે ચતુષ્કોણ PLAN રચી શકો ? (સૂચન : ખૂણાના સરવાળાની લાક્ષણિકતા યાદ કરો.)
- સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં પાસ-પાસેની બાજુઓ (Adjacent Sides)ની લંબાઈ જાણતાં હોઈએ તો પણ ઉપરના ઉદાહરણની રચના માટે ખૂણાના માપની જરૂર રહેશે ?



### સ્વાધ્યાય 4.3

- નીચેના ચતુષ્કોણની રચના કરો.

(i) ચતુષ્કોણ MORE

MO = 6 સેમી

OR = 4.5 સેમી

$\angle M = 60^\circ$

$\angle O = 105^\circ$

$\angle R = 105^\circ$

(iii) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ HEAR

HE = 5 સેમી

EA = 6 સેમી

$\angle R = 85^\circ$

(ii) ચતુષ્કોણ PLAN

PL = 4 સેમી

LA = 6.5 સેમી

$\angle P = 90^\circ$

$\angle A = 110^\circ$

$\angle N = 85^\circ$

(iv) લંબચોરસ OKAY

OK = 7 સેમી

KA = 5 સેમી


### 4.2.4 જ્યારે ત્રણ બાજુ અને તેના બે અંતર્ગત ખૂણા આપ્યા હોય

આ રીતમાં આપણે જ્યારે કાચી આકૃતિ દોરતાં હોઈએ ત્યારે “અંતર્ગત” ખૂણા દર્શાવવામાં સાવચેતી રાખવી.

**ઉદાહરણ 4 :** ચતુષ્કોણ ABCD રચો. જ્યાં  $AB = 4$  સેમી,  $BC = 5$  સેમી,  $CD = 6.5$  સેમી અને  $\angle B = 105^\circ$  અને  $\angle C = 80^\circ$  છે.


#### ઉકેલ :

હંમેશની માફક આપણે પહેલાં કાચી આકૃતિ દોરીશું, જેથી આપણને શરૂઆત કઈ રીતે કરવી તેનો ખ્યાલ આવે (આકૃતિ 4.19).




આકૃતિ 4.19

**સોપાન 1 :** સૌ પ્રથમ આપણે 5 સેમીનો રેખાખંડ BC રચીશું. બિંદુ B પાસે  $105^\circ$ નો ખૂણો રચાય તેવું કિરણ BX રચો. હવે કિરણ BX પર B બિંદુથી 4 સેમી દૂર A બિંદુ દર્શાવો. હવે આપણી પાસે B, C અને A એમ ત્રણ બિંદુ છે. (આકૃતિ 4.20)



આકૃતિ 4.20

**સોપાન 2 :** હવે ચોથું બિંદુ D એ કિરણ CY પર એવું મળે કે જેથી કિરણ CY એ કિરણ BC સાથે  $80^\circ$ નો ખૂણો બનાવે. આમ કરવા માટે BC પરના બિંદુ C આગળ  $\angle BCY = 80^\circ$  રચો. (આકૃતિ 4.21)




આકૃતિ 4.21






સોપાન 3 : હવે બિંદુ C ને કેન્દ્ર રાખી 6.5 સેમીની ચાપ દોરો, આ ચાપ કિરણ CY ને D માં છેદે છે. (આકૃતિ 4.22)



આકૃતિ 4.22

સોપાન 4 : ચતુષ્કોણ ABCD પૂર્ણ કરો. આ ચતુષ્કોણ ABCD માંગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ છે. (આકૃતિ 4.23)



આકૃતિ 4.23



### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

- ઉપરના ઉદાહરણમાં આપણે સૌ પ્રથમ રેખાખંડ BC રચ્યો. તેના બદલે આપણે બીજા કયાં બિંદુઓથી શરૂ કરી શકીએ ?
- અત્યાર સુધી આપણે કેટલાક પાંચ માપનો ઉપયોગ કરીને ચતુષ્કોણની રચના કરી. શું આપણે અત્યાર સુધી લીધેલા પાંચ માપ સિવાયના અન્ય પાંચ માપના સમૂહથી ચતુષ્કોણ રચી શકીએ ?  
નીચેના પ્રશ્નો તમને જવાબ આપવામાં ઉપયોગી થશે.
  - ચતુષ્કોણ ABCD માં  $AB = 5$  સેમી,  $BC = 5.5$  સેમી,  $CD = 4$  સેમી,  $AD = 6$  સેમી અને  $\angle B = 80^\circ$
  - ચતુષ્કોણ PQRS માં  $PQ = 4.5$  સેમી,  $\angle P = 70^\circ$ ,  $\angle Q = 100^\circ$ ,  $\angle R = 80^\circ$  અને  $\angle S = 110^\circ$

ચતુષ્કોણની રચના માટે પૂરતાં અને અપૂરતાં માપ દર્શાવતાં બીજા કેટલાંક ઉદાહરણો તમે તમારી જાતે રચો.

## સ્વાધ્યાય 4.4

1. નીચેના ચતુષ્કોણની રચના કરો.

(i) ચતુષ્કોણ DEAR

DE = 4 સેમી

EA = 5 સેમી

AR = 4.5 સેમી

$\angle E = 60^\circ$

$\angle A = 90^\circ$

(ii) ચતુષ્કોણ TRUE

TR = 3.5 સેમી

RU = 3 સેમી

UE = 4 સેમી

$\angle R = 75^\circ$

$\angle U = 120^\circ$



### 4.3 કેટલાક ખાસ કિસ્સાઓ

ચતુષ્કોણની રચના માટે આપણે પાંચ માપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શું પ્રાપ્ત માપો કરતાં ઓછી સંખ્યાના માપથી આપણે કોઈ નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ રચી શકીએ ?

આવા ખાસ કિસ્સાઓ માટે નીચે આપેલાં ઉદાહરણો ચકાસો.

**ઉદાહરણ 5 :** 4.5 સેમી બાજુવાળો ચોરસ રચો.

**ઉકેલ :** પહેલી નજરે અહીં આપણને માત્ર એક જ માપ આપેલ છે તેવું દેખાશે. પરંતુ વાસ્તવમાં આપણી પાસે બીજી ઘણી માહિતીઓ છે. કારણ કે આ આકૃતિ નિશ્ચિત ચતુષ્કોણ દર્શાવે છે, જેને આપણે ચોરસના નામથી ઓળખીએ છીએ. ચોરસની ચારે બાજુ સરખી હોય છે અને ચારે ખૂણા કાટખૂણા હોય છે. (આકૃતિ 4.24ની કાચી આકૃતિ જુઓ.)

આકૃતિ 4.24ની મદદથી આપણે રચના કરી શકીશું.

સૌ પ્રથમ બાખૂબા શરતને આધારે આપણે  $\triangle ABC$  રચીશું. પછી આપણે સરળતાથી બિંદુ D પણ દર્શાવી શકીશું. તો આપેલા માપના ચોરસની રચના તમારી જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરો.


**ઉદાહરણ 6 :** શું એવો સમબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD રચવો શક્ય છે કે જ્યાં  $AC = 7$  સેમી અને  $BD = 6$  સેમી હોય ? તમારા જવાબની સત્યાર્થતા ચકાસો.

**ઉકેલ :** સમબાજુ ચતુષ્કોણના માત્ર બે વિકર્ણોના જ માપ આપ્યાં છે. આમ છતાં, સમબાજુ ચતુષ્કોણની લાક્ષણિકતાને કારણે આપણને ઘણી મદદ મળી રહેશે.


સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ એકબીજાના લંબદ્વિભાજક હોય છે. તેથી સૌપ્રથમ 7 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ AC રચો. ત્યાર બાદ તેનો લંબદ્વિભાજક રચો. તે પરસ્પર O બિંદુમાં છેદે છે.

હવે બંને વિકર્ણના છેદબિંદુને કેન્દ્રસ્થાને લઈને 3 સેમીની ચાપ રચો. જે લંબદ્વિભાજકને બિંદુ B અને બિંદુ D માં છેદશે. હવે સીધીપટ્ટીની મદદથી બિંદુ A, B, C અને D ને જોડો. જે માગ્યા મુજબનો સમબાજુ ચતુષ્કોણ પ્રાપ્ત થશે.

આ વર્ણનના આધારે હવે તમે તમારી જાતે આ સમબાજુ ચતુષ્કોણ રચવાનો પ્રયત્ન કરો. (આકૃતિ 4.25ને કાચી આકૃતિ તરીકે ધ્યાને લો.)




આકૃતિ 4.24



આકૃતિ 4.25

### આટલું કરો

- જો તમે માત્ર PQ અને QR ની લંબાઈ જાણતા હશો તો લંબચોરસ PQRS કઈ રીતે રચશો ?
- જો આકૃતિ 4.26માં  $AY = 8$  સેમી,  $EY = 4$  સેમી અને  $SY = 6$  સેમી હોય તો પતંગ EASYની રચના કરો. પતંગની કઈ લાક્ષણિકતા તમે રચના દરમિયાન ઉપયોગમાં લેશો ?



આકૃતિ 4.26



## સ્વાધ્યાય 4.5

નીચેની રચના કરો.

1.  $RE = 5.1$  સેમી ધરાવતો ચોરસ READ રચો.
2. જેના વિકર્ણોની લંબાઈ 5.2 સેમી અને 6.4 સેમી હોય તેવો સમબાજુ ચતુષ્કોણ રચો.
3. એવા લંબચોરસની રચના કરો કે જેની પાસપાસેની બાજુઓની લંબાઈ 5 સેમી અને 4 સેમી હોય.
4. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ OKAY રચો જ્યાં  $OK = 5.5$  સેમી,  $KA = 4.2$  સેમી હોય, શું આ અનન્ય છે ?

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. ચતુષ્કોણના પાંચ માપ, એક અનન્ય ચતુષ્કોણ સુનિશ્ચિત કરે છે.
2. જો ચતુષ્કોણની ચાર બાજુ અને એક વિકર્ણ આપેલ હોય તો તેના દ્વારા એક અનન્ય ચતુષ્કોણ સુનિશ્ચિત થાય છે.
3. જો ચતુષ્કોણના બે વિકર્ણ અને ત્રણ બાજુઓ જાણતાં હોઈએ તો એક અનન્ય ચતુષ્કોણ સુનિશ્ચિત થાય.
4. જો ચતુષ્કોણની પાસ-પાસેની બે બાજુઓ અને ત્રણ ખૂણાઓ જાણતાં હોઈએ તો તેના દ્વારા એક અનન્ય ચતુષ્કોણ સુનિશ્ચિત થાય.
5. જો ત્રણ બાજુઓ અને તેના બે અંતર્ગત ખૂણાઓ આપ્યા હોય તો એક અનન્ય ચતુષ્કોણ સુનિશ્ચિત થાય.





## માહિતીનું નિયમન

પ્રકરણ

5

### 5.1 માહિતી

તમારાં રોજબરોજનાં જીવનમાં તમને ઘણી બધી માહિતી મળે છે. જેમ કે,

- છેલ્લી 10 ક્રિકેટ ટેસ્ટ મેચમાં બેટ્સમેને બનાવેલ રન.
- છેલ્લી 10 વન-ડે ક્રિકેટ મેચમાં બોલરે લીધેલી વિકેટો.
- તમારા વર્ગમાં ગણિતની એકમ કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ ગુણ.
- તમારા દરેક મિત્રએ વાંચેલી વાર્તાની ચોપડીઓની સંખ્યા વગેરે.















ઉપરોક્ત કિસ્સાઓ જેવા અનેક કિસ્સામાં એકત્રિત કરાતી વિગતને માહિતી (Data) કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આપણે જે પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવાનો હોય તેને સંગત માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ વર્ગશિક્ષક તેના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈનું સરેરાશ માપ શોધવા માગે છે તો તેણે સૌ પ્રથમ પોતાના વર્ગના બધા જ વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈનાં માપ લખવાં જોઈએ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે વર્ગીકરણ કરવું જોઈએ. ત્યાર બાદ તેનું અર્થઘટન કરવું જોઈએ.

કેટલીક વખત ‘માહિતી’નો સ્પષ્ટ ચિતાર મેળવવા તેને આલેખ સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે છે. તમે અગાઉનાં વર્ષોમાં વિવિધ પ્રકારના આલેખ વિશે અભ્યાસ કર્યો છે શું તમે તે યાદ કરી શકશો ?

1. ચિત્ર આલેખ : આપેલી ‘માહિતી’ને સંકેતનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવતી ચિત્રાત્મક રજૂઆત એટલે ચિત્ર આલેખ (A Pictograph).

ઉદાહરણ : નીચેનું દૃષ્ટાંત જુઓ :


	 = 100 કાર ← એક સંકેત 100 કાર દર્શાવે છે.
જુલાઈ	   = 250      અહીં  = 50 કાર
ઓગસ્ટ	   = 300
સપ્ટેમ્બર	    = ?

(i) જુલાઈ માસમાં કુલ કેટલી મોટરકારનું ઉત્પાદન થયું ?

(ii) કયા માસમાં સૌથી વધુ મોટરકારનું ઉત્પાદન થયું ?



2. લંબ આલેખ (દંડ આલેખ) : રેખાખંડ કે સમાન પહોળાઈવાળા સ્તંભોની મદદથી કરવામાં આવેલી માહિતીની રજૂઆતને લંબાલેખ (A Bar Graph) કહે છે. આ સ્તંભોની ઊંચાઈ જે-તે ચલની કિંમતના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તેની જાડાઈનું કશું મહત્ત્વ હોતું નથી.



સ્તંભની ઊંચાઈ જે-તે શૈક્ષણિક વર્ષ (વિભાગ) માટે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (માત્રા) દર્શાવે છે.


સ્તંભની પહોળાઈ સરખી છે તેમની વચ્ચેની જગ્યા પણ સરખી છે.

- લંબાલેખ દ્વારા કઈ માહિતી દર્શાવવામાં આવી છે ?
- કયા વર્ષમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો સૌથી મહત્તમ છે ?
- કયા વર્ષમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે ?
- નીચેનું વિધાન ખરું છે કે ખોટું ?

‘વર્ષ 2005-06 ના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વર્ષ 2003-04 કરતાં બમણી છે.’

3. દ્વિ-લંબાલેખ : જે લંબાલેખમાં બે પ્રકારની માહિતીને એકસાથે દર્શાવવામાં આવે છે તેને દ્વિ-લંબાલેખ (Double Bar Graph) કહેવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ :



- દ્વિ-લંબાલેખ દ્વારા કઈ માહિતી દર્શાવવામાં આવી છે ?
- કયા વિષયના દેખાવમાં સૌથી વધુ વધારો થયો છે ?
- કયા વિષયના દેખાવમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો છે ?
- કયા વિષયમાં દેખાવ સમાન છે ?



## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

જો લંબાલેખના કોઈ સ્તંભની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો, શું આપેલી માહિતીનું અર્થઘટન બદલાય છે ? શા માટે ?



### પ્રયત્ન કરો

નીચેની માહિતી દર્શાવતા યોગ્ય આલેખ દોરો.

મહિના	જુલાઈ	ઓગસ્ટ	સપ્ટેમ્બર	ઓક્ટોબર	નવેમ્બર	ડિસેમ્બર
વેચાયેલ ઘડિયાળની સંખ્યા	1000	1500	1500	2000	2500	1500

વિદ્યાર્થીની પસંદગી	શાળા A	શાળા B	શાળા C
ચાલવું (Walking)	40	55	15
સાયકલ સવારી (Cycling)	45	25	35

3. વન-ડે ક્રિકેટમાં વિશ્વની શ્રેષ્ઠ 8 ક્રિકેટ ટીમના વિજયનું પ્રતિશત પ્રમાણ

ટીમ	ચેમ્પિયન ટ્રોફીથી વર્લ્ડ કપ-06 સુધી	2007માં છેલ્લી 10 વન-ડે ક્રિકેટ
સાઉથ આફ્રિકા	75%	78%
ઓસ્ટ્રેલિયા	61%	40%
શ્રીલંકા	54%	38%
ન્યૂઝીલેન્ડ	47%	50%
ઇંગ્લેન્ડ	46%	50%
પાકિસ્તાન	45%	44%
વેસ્ટ ઇન્ડિઝ	44%	30%
ઇન્ડિયા	43%	56%

### 5.2 માહિતીની ગોઠવણી

સામાન્ય રીતે આપણને પ્રાપ્ત થતી માહિતી અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં હોય છે જેથી તેને કાચા પ્રાપ્તક/કાચી માહિતી પણ કહે છે. અર્થપૂર્ણ તારણ મેળવવા માટે આપેલ કાચી માહિતીને સુવ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવવી જોઈએ.

ઉદાહરણ : ધારો કે વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહને તેઓના પસંદગીના વિષય અંગે પૂછવામાં આવતાં નીચે મુજબ માહિતી મળે છે.

કલા, ગણિતશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગણિતશાસ્ત્ર, કલા, અંગ્રેજી, ગણિતશાસ્ત્ર, અંગ્રેજી, કલા, વિજ્ઞાન, કલા, વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ગણિતશાસ્ત્ર, કલા, અંગ્રેજી, કલા, વિજ્ઞાન, ગણિતશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, કલા. વિદ્યાર્થીઓમાં કયો વિષય સૌથી વધુ પસંદગીપાત્ર છે અને કયો સૌથી ઓછો ?



અહીં નોંધાયેલ માહિતી આડી-અવળી રીતે નોંધાયેલી હોઈ ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો એકદમ સરળ નથી. આપણે ઉપરોક્ત માહિતીને કોષ્ટક 5.1 મુજબ આવૃત્તિ ચિહ્નથી ગોઠવીશું.

કોષ્ટક : 5.1

વિષય	આવૃત્તિ ચિહ્ન	વિદ્યાર્થીની સંખ્યા
કલા	≡≡	7
ગણિતશાસ્ત્ર	≡≡	5
વિજ્ઞાન	≡≡	6
અંગ્રેજી		4

ઉપરોક્ત કોષ્ટક 5.1 માં જે-તે વિષયને અનુરૂપ આવૃત્તિચિહ્ન દર્શાવેલ છે જે વિદ્યાર્થીની સંખ્યા દર્શાવે છે. આ સંખ્યાને તે વિષયની આવૃત્તિ કહે છે.

કોઈ ચોક્કસ નોંધ કેટલીવાર આવે છે તે સંખ્યા આવૃત્તિ દર્શાવે છે.

કોષ્ટક 5.1 મુજબ, અંગ્રેજી વિષય પસંદ કરતા વિદ્યાર્થીઓની આવૃત્તિ : 4 તથા ગણિતશાસ્ત્ર વિષય પસંદ કરતા વિદ્યાર્થીઓની આવૃત્તિ : 5

ઉપરોક્ત કોષ્ટકને આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક કહે છે.

### પ્રયત્ન કરો



1. વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહને પાલતુ પ્રાણીઓમાં સૌથી વધુ ગમતાં પ્રાણી વિશે પૂછવામાં આવ્યું. જેનું પરિણામ નીચે મુજબ છે :

કૂતરો, બિલાડી, બિલાડી, માછલી, બિલાડી, સસલું, કૂતરો, બિલાડી, સસલું, કૂતરો, બિલાડી, કૂતરો, કૂતરો, કૂતરો, બિલાડી, ગાય, માછલી, સસલું, કૂતરો, બિલાડી, કૂતરો, બિલાડી, બિલાડી, કૂતરો, સસલું, બિલાડી, માછલી, કૂતરો.

આ માહિતી પરથી આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરો.

### 5.3 વર્ગીકૃત માહિતી

વિષય પસંદગીના ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં દર્શાવેલ ચોક્કસ નોંધ (Entry) એકથી વધુ વખત પુનરાવર્તિત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, કલા વિષય 7 વિદ્યાર્થીઓને પસંદ છે. ગણિતશાસ્ત્ર વિષય 5 વિદ્યાર્થીઓ (એ જ રીતે આગળ...) પસંદ કરે છે (કોષ્ટક 5.1). આ માહિતી ચિત્ર-આલેખ (A Pictograph) અથવા લંબાલેખ (A Bargraph) દ્વારા પણ દર્શાવી શકાય. કોઈ વખત આપણે ખૂબ જ મોટા જથ્થામાં માહિતીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ધોરણ VIII ના 60 વિદ્યાર્થીઓએ ગણિત વિષયના 50 ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણ નીચે મુજબ છે :

21, 10, 30, 22, 33, 5, 37, 12, 25, 42, 15, 39, 26, 32, 18, 27, 28, 19, 29, 35, 31, 24, 36, 18, 20, 38, 22, 44, 16, 24, 10, 27, 39, 28, 49, 29, 32, 23, 31, 21, 34, 22, 23, 36, 24, 36, 33, 47, 48, 50, 39, 20, 7, 16, 36, 45, 47, 30, 22, 17.

જો ઉપરોક્ત અવલોકનોનો ઉપયોગ કરીને આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવામાં આવે તો, કોષ્ટક ખૂબ જ મોટું બનશે. આપણી અનુકૂળતા માટે 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 અને

50-60 એમ વર્ગ બનાવીશું અને તેમાં જે તે અવલોકનોનો સમાવેશ કરીશું. આ રીતે, નીચે મુજબ આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર થશે :

કોષ્ટક 5.2

વર્ગ	આવૃત્તિ ચિહ્ન	આવૃત્તિ
0-10		02
10-20		10
20-30		21
30-40		19
40-50		07
50-60		01
	કુલ	60

ઉપરોક્ત રીતે રજૂ કરેલ ‘માહિતી’ને વર્ગીકૃત માહિતી કહે છે અને વર્ગીકરણને વર્ગીકૃત આવૃત્તિ વિતરણ કહે છે. જેની મદદથી આપણે અર્થપૂર્ણ તારણ કાઢી શકીએ છીએ. જેમ કે,

- (1) મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ ગુણ 20 અને 40 વચ્ચે છે.
- (2) આઠ વિદ્યાર્થીઓએ 40 થી વધુ (50માંથી) ગુણ મેળવ્યા છે.

દરેક વર્ગ 0-10, 10-20, 20-30, ... વગેરેને વર્ગ અંતરાલ અથવા વર્ગ કહે છે.

અહીં આપણે નોંધીએ કે 10 એ 0-10 અને 10-20 બંને વર્ગમાં સમાવિષ્ટ છે. આ જ રીતે, 20 એ 10-20 અને 20-30 એમ બંને વર્ગમાં સમાવિષ્ટ છે, પરંતુ આ અવલોકન (10 કે 20, ...) એ એકસાથે બંને વર્ગમાં સમાવિષ્ટ થાય એ શક્ય નથી. આ વિસંગતતા ટાળવા આપણે એવું સ્વીકારીશું કે જે-તે અવલોકન ઉચ્ચ વર્ગમાં સમાવિષ્ટ રહે. અર્થાત્, 10 નો 0-10 માં નહીં પરંતુ 10-20 વાળા વર્ગમાં સમાવેશ કરવો. આ જ રીતે 20 ને 20-30 માં સમાવિષ્ટ કરીશું (10-20 માં નહીં).

અહીં વર્ગ 10-20 માં 10 ને અધ:સીમા અને 20 ને ઉર્ધ્વસીમા કહે છે. આ જ રીતે, 20-30 ના વર્ગમાં 20 ને અધ:સીમા અને 30 ને ઉર્ધ્વસીમા કહે છે. અહીં, આપણે એ પણ નોંધીએ કે દરેક વર્ગ અંતરાલમાં ઉર્ધ્વ સીમા અને અધ: સીમા વચ્ચેનો તફાવત એ એકસમાન રહે છે. આપણા કિસ્સામાં અહીં 0-10, 10-20, 20-30 ...નો તફાવત 10 છે. ઉર્ધ્વસીમા અને અધ:સીમાના તફાવતને વર્ગની વર્ગલંબાઈ અથવા કદ કહે છે.

### પ્રયત્ન કરો

1. નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. એક કારખાનાનાં 550 કામદારોનું દૈનિક વેતન દર્શાવતું આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક નીચે મુજબ છે :

કોષ્ટક 5.3

વર્ગ અંતરાલ (દૈનિક આવક રૂપિયામાં)	આવૃત્તિ (કામદારની સંખ્યા)
100-125	45
125-150	25





150-175	55
175-200	125
200-225	140
225-250	55
250-275	35
275-300	50
300-325	20
<b>કુલ</b>	<b>550</b>

- અહીં વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે ?
  - કયા વર્ગની આવૃત્તિ સૌથી વધુ છે ?
  - કયા વર્ગની આવૃત્તિ સૌથી ઓછી છે ?
  - વર્ગ અંતરાલ 250-275ની ઉર્ધ્વસીમા શું છે ?
  - કયા બે વર્ગમાં સમાન આવૃત્તિ છે ?
2. એક વર્ગના 20 વિદ્યાર્થીઓના વજન (કિગ્રામાં) દર્શાવતી નીચેની માહિતી માટે એવું આવૃત્તિ વિતરણ-કોષ્ટક તૈયાર કરો જેના વર્ગો 30-35, 35-40 અને એ રીતે આગળ .. હોય ?  
40, 38, 33, 48, 60, 53, 31, 46, 34, 36, 49, 41, 55, 49, 65, 42, 44, 47, 38, 39.



### 5.3.1 લંબ આલેખની ખાસ રજૂઆત (સ્તંભ આલેખ)


આપણે વર્ગીકૃત આવૃત્તિ વિતરણનો જુદી રીતે અભ્યાસ કરીએ.

ધારો કે, એક વર્ગના 60 વિદ્યાર્થીઓએ ગણિત વિષયની કસોટીમાં મેળવેલ માર્ક્સ નીચે મુજબ છે (કોષ્ટક 5.4).

**કોષ્ટક 5.4**

વર્ગ અંતરાલ	આવૃત્તિ
0-10	2
10-20	10
20-30	21
30-40	19
40-50	7
50-60	1
<b>કુલ</b>	<b>60</b>

તેની આલેખાત્મક રજૂઆત તેની બાજુમાં દર્શાવેલ છે (આકૃતિ 5.1).




ધોરણ 7 માં શીખેલ લંબાલેખ કરતાં આ આલેખ કઈ રીતે જુદો પડે છે ? અહીં આપણે નોંધીએ કે, અવલોકનોનો સમૂહ (એટલે કે વર્ગઅંતરાલ) સમક્ષિતિજ રેખા / X- અક્ષ પર દર્શાવેલ છે.

સ્તંભની ઊંચાઈ એ જે-તે વર્ગની આવૃત્તિ દર્શાવે છે. જે રીતે બે વર્ગ અંતરાલ વચ્ચે જગ્યા નથી, તે જ રીતે બે સ્તંભો વચ્ચે પણ જગ્યા નથી.

આ પ્રકારની આલેખાત્મક રજૂઆતને સ્તંભાલેખ (Histogram) કહે છે. નીચે દર્શાવેલ આકૃતિ 5.2 માં એક અન્ય સ્તંભાલેખ છે.

શાળાના 25 શિક્ષકોની ઉંમર



અહીં ઊંચી-નીચી રેખા (—) (અથવા ખંડિત રેખા) આપેલ હોય તો સમજવું કે આપણે આ ચામ પર શૂન્યથી શરૂ કરી સમાન અંતરાલો સતત લીધા નથી એટલે કે આ ઉદાહરણમાં આપણે 0 થી 20 વચ્ચેની સંખ્યા દર્શાવેલ નથી.


આકૃતિ 5.2

ઉપરોક્ત સ્તંભાલેખના સ્તંભ ઉપરથી આપણે નીચે મુજબના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીએ.

- કેટલા શિક્ષકોની ઉંમર 45 વર્ષથી વધુ પરંતુ 50 વર્ષથી ઓછી છે ?
- કેટલા શિક્ષકોની ઉંમર 35 વર્ષથી ઓછી છે ?

### પ્રયત્ન કરો

1. આકૃતિ 5.3 ના સ્તંભાલેખનું અવલોકન કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :



આકૃતિ 5.3

- ઉપરોક્ત સ્તંભાલેખમાં શું માહિતી આપવામાં આવી છે ?
- કયા વર્ગમાં છોકરીઓની સંખ્યા મહત્તમ છે ?





- (iii) કેટલી છોકરીઓની ઊંચાઈ 145 સેમી કે તેથી વધારે છે ?
- (iv) જો આપણે છોકરીઓને નીચે મુજબ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચણી કરીએ તો દરેક વિભાગની સંખ્યા શું થાય ?
- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 150 સેમી કે તેથી વધુ          | જૂથ A |
| 140 સેમી અને 150 સેમીની વચ્ચે | જૂથ B |
| 150 સેમીથી ઓછી                | જૂથ C |



## સ્વાધ્યાય 5.1

- નીચેની માહિતીમાંથી કઈ માહિતી દર્શાવવા સ્તંભાલેખ(Histogram)નો ઉપયોગ કરશો ?
  - ટપાલીના થેલામાં રહેલ જુદા-જુદા વિસ્તારોના પત્રોની સંખ્યા.
  - રમત સ્પર્ધાના સ્પર્ધકોની ઊંચાઈ.
  - પાંચ કંપનીઓ દ્વારા ઉત્પાદન થયેલ કેસેટની સંખ્યા.
  - રેલ્વે સ્ટેશને સવારે 7:00 થી સાંજના 7:00 વાગ્યા દરમિયાન ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનાર મુસાફરોની સંખ્યા.
 ઉપરોક્ત દરેક માટે કારણ આપો.
- એક દુકાનદાર પોતાના 'ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ' પર આવતા પુરુષ (M), સ્ત્રી (W), છોકરો (B) અથવા છોકરી (G) માટે નોંધ કરે છે. નીચેની યાદી દુકાનદારને સવારના પ્રથમ ચાર કલાકમાં આવતા ગ્રાહકોની માહિતી દર્શાવે છે :
 


W, W, W, G, B, W, W, M, G, G, M, M, W, W, W, W, G, B, M, W, B, G, G, M, W, W, M, M, W, W, W, M, W, B, W, G, M, W, W, W, W, G, W, M, M, W, W, M, W, G, W, M, G, W, M, M, B, G, G, W

 ઉપરોક્ત માહિતી પરથી આવૃત્તિ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીને આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરો અને લંબાલેખ દ્વારા દર્શાવો.
- એક કારખાનાના 30 કારીગરોનું સાપ્તાહિક વેતન (₹) નીચે મુજબ છે :
 

830, 835, 890, 810, 835, 836, 869, 845, 898, 890, 820, 860, 832, 833, 855, 845, 804, 808, 812, 840, 885, 835, 835, 836, 878, 840, 868, 890, 806, 840.

 ઉપરોક્ત માહિતી પરથી આવૃત્તિ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીને 800-810, 810-820, ... વર્ગ ધરાવતું આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરો.
- પ્રશ્ન-3 માં આપેલ માહિતી પરથી બનાવેલ આવૃત્તિ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને સ્તંભાલેખ (Histogram) તૈયાર કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
  - કયા વર્ગમાં કારીગરોની સંખ્યા મહત્તમ છે ?
  - ₹ 850 કે તેથી વધુ વેતન મેળવતા કારીગરોની સંખ્યા કેટલી છે ?
  - ₹ 850 થી ઓછું વેતન મેળવતા કારીગરોની સંખ્યા કેટલી છે ?
- ચોક્કસ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રજા દરમિયાન નિહાળેલ ટી.વી.ના કલાકોની સંખ્યા આલેખ દ્વારા દર્શાવેલ છે. જેના પરથી નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો.
  - સૌથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ કેટલા કલાક ટી.વી. જોયું ?
  - કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ 4 કલાકથી ઓછું ટી.વી. જોયું ?

(iii) કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ 5 કલાકથી વધુ સમય ટી.વી. જોવામાં પસાર કર્યો ?




### 5.4 વર્તુળ આલેખ અથવા પાઈ-ચાર્ટ

શું તમે ક્યારેય (આકૃતિ 5.4 મુજબ) વર્તુળાકાર સ્વરૂપે દર્શાવેલ માહિતી ઉપયોગમાં લીધી છે ?



દિવસ દરમિયાન બાળક દ્વારા પસાર કરાતો સમય નગરમાં વસતા લોકોની ઉંમર મુજબ વસ્તી



આકૃતિ 5.4

આવા આલેખને વર્તુળ આલેખ કહે છે. વર્તુળ આલેખ એ આપેલી વિગતનો ચોક્કસ ભાગ અને તેના કુલ ભાગ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. અહીં, આકૃતિ 5.4 માં આખું વર્તુળ એ ચોક્કસ વૃત્તાંશોમાં વહેંચાયેલ છે. દરેક વૃત્તાંશનું કદ એ જે-તે પ્રવૃત્તિઓ કે માહિતીના પ્રમાણમાં દર્શાવેલ છે.

ઉદાહરણ તરીકે,

ઉપરોક્ત આલેખમાં બાળક દ્વારા ગિંધ માટે વપરાતો સમયગાળો (કે ગિંધ માટે વપરાતા કલાકોનું પ્રમાણ)

$$= \frac{\text{ગિંધના કલાકો}}{\text{દિવસના કુલ કલાકો}} = \frac{8 \text{ કલાક}}{24 \text{ કલાક}} = \frac{1}{3}$$

તેથી, ગિંધનો સમયગાળો દર્શાવતા વૃત્તાંશનો ભાગ એ કુલ વર્તુળનો  $\frac{1}{3}$  ભાગ બને. આ જ રીતે,

$$\text{શાળા માટે બાળક દ્વારા વપરાતા કલાકોનું પ્રમાણ} = \frac{\text{શાળાના કલાકો}}{\text{દિવસના કુલ કલાકો}} = \frac{6 \text{ કલાક}}{24 \text{ કલાક}} = \frac{1}{4}$$


આમ, શાળાના સમયગાળા માટે દર્શાવેલ વૃત્તાંશ એ આખા વર્તુળનો  $\frac{1}{4}$  ભાગ છે.

આ જ રીતે, બીજા વૃત્તાંશનો વિસ્તાર (કે કદ) પણ મેળવી શકાય. બધી જ પ્રવૃત્તિઓ માટે જરૂરી વૃત્તાંશ દર્શાવતાં અપૂર્ણાંક ભાગનો સરવાળો કરો. શું તમને સરવાળો એક મળે છે ? વર્તુળ આલેખને પાઈ ચાર્ટ ( $\pi$ -Chart) પણ કહે છે.

### પ્રયત્ન કરો


1. નીચે દર્શાવેલ દરેક પાઈ-આલેખ (આકૃતિ 5.5) એક વર્ગની વિવિધ માહિતી દર્શાવે છે. આ દરેક માહિતી વર્તુળનો કેટલામો ભાગ દર્શાવે છે તે શોધો.

(i)




છોકરીઓ અથવા છોકરાઓ

(ii)

શાળા પરિવહન  
આકૃતિ 5.5

(iii)




ગણિત

2. આકૃતિ 5.6 માં દર્શાવેલ પાઈ-ચાર્ટ પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

(i) કયા પ્રકારના કાર્યક્રમો સૌથી વધુ જોવાય છે ?

(ii) કયા બે પ્રકારના કાર્યક્રમો નિહાળનાર દર્શકોની સંખ્યા રમત વિભાગના કાર્યક્રમો નિહાળનાર દર્શકોની સંખ્યા બરાબર છે ?

ટી.વી. પર વિવિધ કાર્યક્રમોની ચેનલ  
નિહાળનારા દર્શકો

આકૃતિ 5.6

#### 5.4.1 પાઈ-ચાર્ટ દોરવો

શાળાના વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહને જુદા-જુદા પ્રકારના સ્વાદવાળા આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવ્યા તેની ટકાવારી નીચે મુજબ છે :

સ્વાદ	સ્વાદ પસંદગીમાં વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
ચોકલેટ	50 %
વેનિલા	25 %
અન્ય	25 %

ઉપરોક્ત માહિતીનો આપણે પાઈ-ચાર્ટ બનાવીએ.


વર્તુળના કેન્દ્ર પાસે ખૂણાનું કુલ માપ  $360^\circ$  હોય. જે-તે વૃત્તાંશ માટે ખૂણાનું માપ એ  $360^\circ$ નો અપૂર્ણાંક

ભાગ અને. આપણે જુદા-જુદા વૃત્તાંશો માટે તેના કેન્દ્ર પાસે બનતા ખૂણાનું માપ શોધવા માટેનું કોષ્ટક બનાવીએ. (કોષ્ટક 5.5)


કોષ્ટક 5.5

સ્વાદ	સ્વાદ પસંદગીમાં વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી	અપૂર્ણાંક	360°નો ભાગ
ચોકલેટ	50%	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	360°નો $\frac{1}{2}$ ભાગ = 180°
વેનિલા	25%	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	360°નો $\frac{1}{4}$ ભાગ = 90°
અન્ય	25%	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	360°નો $\frac{1}{4}$ ભાગ = 90°

1. યોગ્ય ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરો. તેના કેન્દ્રને O અને ત્રિજ્યાને OA કહો.



2. ચોકલેટી સ્વાદવાળા વૃત્તાંશનો ખૂણો 180° છે. કોણ-માપકનો ઉપયોગ કરીને  $\angle AOB = 180^\circ$  દોરો.



3. બાકીના વૃત્તાંશ માટે પણ કોણમાપકનો ઉપયોગ કરો.




**ઉદાહરણ 1 :** આકૃતિ 5.7 માં દર્શાવ્યા મુજબ વિવિધ વસ્તુઓનો ખર્ચ (ટકાવારીમાં) અને કુટુંબની માસિક બચત દર્શાવતો પાઈ-ચાર્ટ આપેલ છે.

- કઈ વસ્તુનો ખર્ચ મહત્તમ છે ?
- કઈ વસ્તુનો ખર્ચ એ કુટુંબની કુલ બચત જેટલો છે ?
- જો કુટુંબની માસિક બચત ₹ 3000 હોય તો કપડાનો માસિક ખર્ચ કેટલો હોય ?

**ઉકેલ :**

- ખોરાકમાં મહત્તમ ખર્ચ છે.
- બાળકોના શિક્ષણ માટેનો ખર્ચ (અર્થાત્ 15%) એ કુટુંબની બચત બરાબર છે.



આકૃતિ 5.7

(iii) ₹ 3000 એ 15% દર્શાવે છે.

$$\text{તેથી કુલ ખર્ચના 10\%} = ₹ \frac{3000}{15} \times 10 = ₹ 2000$$

**ઉદાહરણ 2 :** કોઈ ચોક્કસ દિવસે, બેકરીની વિવિધ વસ્તુઓનું વેચાણ (₹ માં) નીચે મુજબ આપેલ છે :


સામાન્ય બ્રેડ	: 320
ફૂટ બ્રેડ	: 80
કેક અને પેસ્ટ્રી	: 160
બિસ્કિટ	: 120
અન્ય	: 40
<b>કુલ</b>	<b>: 720</b>

આ માહિતી માટે પાઈ-ચાર્ટ દોરો

**ઉકેલ :** આપણે અહીં દરેક વૃત્તાંશ માટે તેનો કેન્દ્ર પાસેનો ખૂણો શોધીએ. અહીં, કુલ વેચાણ = ₹ 720 છે.

વસ્તુ	વેચાણ (₹)	અપૂર્ણાંક	કેન્દ્ર પાસેનો ખૂણો
સામાન્ય બ્રેડ	320	$\frac{320}{720} = \frac{4}{9}$	$\frac{4}{9} \times 360^\circ = 160^\circ$
બિસ્કિટ	120	$\frac{120}{720} = \frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 360^\circ = 60^\circ$
કેક અને પેસ્ટ્રી	160	$\frac{160}{720} = \frac{2}{9}$	$\frac{2}{9} \times 360^\circ = 80^\circ$
ફૂટ બ્રેડ	80	$\frac{80}{720} = \frac{1}{9}$	$\frac{1}{9} \times 360^\circ = 40^\circ$
અન્ય	40	$\frac{40}{720} = \frac{1}{18}$	$\frac{1}{18} \times 360^\circ = 20^\circ$

હવે, ઉપરોક્ત કોષ્ટક (આકૃતિ 5.8) મુજબ પાઈ-ચાર્ટ બનાવીએ.





## પ્રયત્ન કરો

નીચેની માહિતી માટે પાઈ-ચાર્ટ બનાવો :  
દિવસ દરમિયાન બાળક દ્વારા પસાર કરાતો સમય.

ગ્રંથ	- 8 કલાક
શાળા	- 6 કલાક
ગૃહકાર્ય	- 4 કલાક
રમત	- 4 કલાક
અન્ય	- 2 કલાક



## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

નીચેની માહિતી દર્શાવવા કયા પ્રકારનો આલેખ દોરવો વધુ યોગ્ય છે ?

- રાજ્યનું ખાદ્ય અનાજનું ઉત્પાદન

વર્ષ	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ઉત્પાદન લાખ (ટનમાં)	60	50	70	55	80	85

- લોકોની ખોરાક માટેની પસંદગી

પસંદગીનો ખોરાક	લોકોની સંખ્યા
ઉત્તર ભારતીય	30
દક્ષિણ ભારતીય	40
ગુજરાતી	25
અન્ય	25
કુલ	120

- કારખાનાનાં કામદારોની દૈનિક આવક


દૈનિક આવક (₹)	કામદારોની સંખ્યા
75-100	45
100-125	35
125-150	55
150-175	30
175-200	50
200-225	125
225-250	140
કુલ	480



## સ્વાધ્યાય 5.2

1. એક શહેરના યુવા વર્ગને ગમતાં વિવિધ પ્રકારનાં સંગીત વિશે એક મોજણી (Survey) કરવામાં આવી. બાજુમાં દર્શાવેલ વર્તુળ આલેખ (પાઈ-ચાર્ટ) મુજબ તેનાં પરિણામો મળ્યાં હતાં. આ વર્તુળ આલેખ (પાઈ-ચાર્ટ)ની મદદથી નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો :

- (i) જો 20 યુવાનો શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરે છે તો, કેટલા યુવાનોની મોજણી કરી હતી ?  
(ii) કયા પ્રકારનું સંગીત મહત્તમ યુવાનો પસંદ કરે છે ?  
(iii) જો કોઈ કેસેટ કંપની આ સંગીતની 1000 CD તૈયાર કરે તો દરેક પ્રકારનાં સંગીત માટે કેટલી CD તૈયાર થાય ?



2. 360 લોકોને શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું એમ ત્રણ ઋતુમાંથી પોતાની પસંદગીની ઋતુ માટે મત આપવા જણાવવામાં આવ્યું.

- (i) કઈ ઋતુને સૌથી વધુ મત મળ્યા ?  
(ii) દરેક ઋતુના વૃત્તાંશ માટે તેના કેન્દ્ર પાસેના ખૂણાનું માપ શોધો.  
(iii) ઉપરોક્ત માહિતી દર્શાવતો પાઈ-ચાર્ટ તૈયાર કરો.

ઋતુ	મતની સંખ્યા
ઉનાળો	90
ચોમાસું	120
શિયાળો	150

3. નીચેની માહિતી માટે પાઈ-ચાર્ટ તૈયાર કરો. કોષ્ટકમાં આપેલી વિગતો લોકોના પસંદગીના રંગ અંગેની માહિતી દર્શાવે છે.

રંગ	લોકોની સંખ્યા
વાદળી	18
લીલો	9
લાલ	6
પીળો	3
કુલ	36

દરેક વૃત્તાંશ માટે પ્રમાણ શોધો.


ઉદાહરણ : વાદળી માટે  $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ ; લીલા

માટે  $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$  વિગેરે. સંગત ખૂણો દર્શાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો.

4. અહીં આપેલ પાઈ-ચાર્ટમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હિન્દી, અંગ્રેજી, ગણિતશાસ્ત્ર, સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની પરીક્ષામાં 540 ગુણમાંથી મેળવેલા ગુણ દર્શાવેલ છે.

- (i) કયા વિષયમાં વિદ્યાર્થીઓએ 105 ગુણ મેળવ્યા છે ? (સૂચન : 540 ગુણ માટે વૃત્તાંશકોણ  $360^\circ$  તેથી, 105 ગુણ માટે વૃત્તાંશકોણ કેટલો ?)  
(ii) હિન્દી વિષય કરતાં ગણિતશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ કેટલા વધારે ગુણ મેળવ્યા છે ?  
(iii) ચકાસો કે શું વિજ્ઞાન અને હિન્દી વિષયમાં મેળવેલ ગુણના સરવાળા કરતાં સામાજિક વિજ્ઞાન અને ગણિતશાસ્ત્રમાં મેળવેલ ગુણ વધારે છે ?

(સૂચન : વૃત્તાંશનાં કેન્દ્ર પાસેના ખૂણાના માપનો ઉપયોગ કરો.) હિન્દી



5. એક છાત્રાલયમાં જુદી-જુદી ભાષાઓ બોલતાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે, તો પાઈ-ચાર્ટ તૈયાર કરો :

ભાષા	ગુજરાતી	અંગ્રેજી	ઉર્દુ	હિન્દી	સિંધી	કુલ
વિદ્યાર્થીની સંખ્યા	40	12	9	7	4	72

### 5.5 તક અને સંભાવના

ઘણી વખત ચોમાસાની ઋતુમાં એવું બને છે કે નિયમિત રીતે તમે રેઈન-કોટ સાથે રાખો છો પણ તે દિવસોમાં વરસાદ આવતો નથી અને જે દિવસે તમે તમારો રેઈન-કોટ ભૂલી જાઓ છો તે જ દિવસે ધોધમાર વરસાદ આવે છે.



ઘણી વખત એવું બને છે કે તમે પરીક્ષા માટે નક્કી કરાયેલાં 5 પ્રકરણોમાંથી 4 પ્રકરણ ખૂબ જ સારી રીતે તૈયાર કર્યાં હોય છે અને પ્રશ્નપત્રમાં જુઓ તો જે પ્રકરણ ઓછું તૈયાર કર્યું હોય તેમાંથી જ સૌથી વધુ પ્રશ્નો પૂછાય છે. આ જ રીતે નિયમિત સમય પર દોડતી ટ્રેન પકડવા તમે સમયસર રેલવે-સ્ટેશન પર પહોંચી જાઓ છો, પરંતુ તે દિવસે જ એ ટ્રેન મોડી આવે છે.

આવું ઘણી વખત બને છે કે જે પરિસ્થિતિને તમે સાનુકૂળ બનાવવા પ્રયત્ન કરો એ વખતે જ તમારે પ્રતિકૂળતા ઊભી થાય છે. શું તમે આવાં વધુ ઉદાહરણો આપી શકો ?

ઉપર્યુક્ત ઉદાહરણો એવાં છે કે જેમાં કોઈ ચોક્કસ ઘટના બનશે કે નહીં બને તે એકસમાન હોતું નથી. કોઈ ટ્રેન નિર્ધારિત સમયે જ આવે કે મોડી પહોંચે તેની તકો (chances) એકસમાન હોતી નથી. તમે જ્યારે પ્રતિક્ષાયાદી (waiting list)માં હોય તેવી ટિકિટ ખરીદો છો, ત્યારે ખરેખર તો તમે એક તક ઝડપો છો, એવી આશા સાથે કે તમારી મુસાફરી શરૂ કરવાના સમય પહેલાં તમે તમારી બેઠક (seat) ચોક્કસ મેળવી શકશો.

અહીં, આપણે કેટલાક એવા પ્રયોગો કરીશું કે જેમાં જે-તે ઘટના ઘટવાની તકો એકસમાન હોય.

#### 5.5.1 પરિણામ મેળવવું

તમે એવું નિહાળ્યું હશે કે કોઈ ક્રિકેટ મેચ શરૂ થતાં પહેલાં બંને ટીમના કપ્તાનો એક સિક્કા વડે 'ટોસ' (toss) ઉછાળે છે કે કોણ પ્રથમ બેટિંગ કરશે ?

જ્યારે સિક્કાને ઉછાળવામાં આવે છે ત્યારે સંભવિત પરિણામ શું હોઈ શકે ?

અલબત્ત, H (છાપ) અથવા T (કાંટો). કલ્પના કરો કે તમે એક ટીમના કપ્તાન છો અને તમારો મિત્ર બીજી ટીમનો કપ્તાન છે. તમે 'ટોસ' ઉછાળો છો અને તમારા મિત્રને તે અંગે બોલવા કહો છો. શું તમે આ અંગેનાં પરિણામ પર કાબુ રાખી શકો છો ? શું તમારે (H) જોઈતો હોય તો તે મેળવી શકો છો ? અથવા (T) જોઈતો હોય તો મળે છે ? ના, આ શક્ય નથી. આ પ્રકારના પ્રયોગને યાદચ્છિક પસંદગીના પ્રયોગો કહે છે, અહીં છાપ અથવા કાંટો એ આપણને મળતી બે શક્યતાઓ છે.




#### પ્રયત્ન કરો

1. તમે કોઈ સ્કૂટર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છો તો તેની સંભવિત શક્યતાઓ શું હોઈ શકે ?
2. જ્યારે આપણે એક પાસો (die) ફેંકીએ છીએ ત્યારે કઈ છ સંભવિત શક્યતાઓ રહેલી હોય છે ?




3. આકૃતિ 5.9 માં દર્શાવ્યા મુજબનું એક ચક્ર જ્યારે તમે ઘુમાવો છો ત્યારે શું શક્યતાઓ રહેલી છે ? (યાદી કરો.)

(અહીં શક્યતાઓ એટલે જ્યારે ચક્ર ઊભું રહે ત્યારે દર્શકકાંટો કયા વૃત્તાંશ ઉપર આવશે તે.)



આકૃતિ 5.9



આકૃતિ 5.10

4. તમારી પાસે આકૃતિ 5.10 માં દર્શાવ્યા મુજબના એક ઘડામાં વિવિધ રંગોવાળા પાંચ દડાઓ રાખેલા છે. તમારે તેમાં જોયા વગર કોઈ એક દડો પસંદ કરવાનો છે. તમને કયા રંગનો દડો મળશે તેની પ્રયત્નોની યાદી બનાવો.

## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો



પાસો (Die) ઉછાળવાની રમતમાં,

- શું પહેલા પાસો ફેંકનાર ખેલાડીને 6 મળવાની તકો વધુ રહે છે ?
- શું પ્રથમ ખેલાડી બાદ રમનાર બીજા ખેલાડીને 6 મળવાની તકો ઓછી રહે છે ?
- ધારો કે બીજા ખેલાડીને 6 મળે છે, તો તેનો એવો અર્થ કરી શકાય કે ત્રીજા ખેલાડીને 6 મળવાની કોઈ શક્યતા નથી ?

### 5.5.2 સમસંભાવી શક્યતાઓ

ધારો કે, એક સિક્કો અનેક વખત ઉછાળવામાં આવે છે અને કેટલી વખત H (છાપ) કે T (કાંટો) મળે છે તે નોંધવામાં આવે છે. હવે નીચેનું પરિણામપત્રક જુઓ, જેમાં ટોસ ઉછાળવાની સંખ્યા સતત વધતી જાય છે.

ટોસ ઉછાળવાની સંખ્યા	આવૃત્તિ ચિહ્ન (H માટે)	H ની સંખ્યા	આવૃત્તિ ચિહ્ન (T માટે)	T ની સંખ્યા
50		27		23
60		28		32
70	-	33	-	37
80	-	38	-	42
90	-	44	-	46
100	-	48	-	52



અહીં, આપણે અવલોકન કરી શકીએ છીએ કે જેમ ટોસ (સિક્કો) ઉછાળવાની સંખ્યા વધતી જાય છે તેમ H અને T મળવાની સંખ્યા વધુ ને વધુ નજીક આવતી જાય છે.

આ જ ઘટના પાસો ઉછાળવામાં પણ બને છે. જેમ પાસો ઉછાળવાની સંખ્યા વધતી જાય છે તેમ 1 થી 6 ક્રમાંક મળવાની સંખ્યા લગભગ એકબીજાને સમાન જેવી હોય છે.

આવા કિસ્સાઓમાં આપણે કહી શકીએ કે પ્રયોગ દરમિયાન જુદાં-જુદાં પરિણામો મળવાની તકો સમસંભાવી હોય છે. આનો મતલબ એ થયો કે, પ્રયોગ દરમિયાન દરેક ઘટના બનવાની શક્યતા એકસમાન હોય છે.



### 5.5.3 તક અને સંભાવના વચ્ચે સંબંધ

એક સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ વિચારો. શું શક્યતાઓ હોઈ શકે ? અહીં માત્ર બે જ શક્યતાઓ હોઈ શકે : H (છાપ) અથવા T (કાંટો) બંને પરિણામ મળવાની શક્યતા સમસંભાવી છે. H મળવાની શક્યતા એ કુલ બે શક્યતાઓ પૈકીની એક શક્યતા છે. અર્થાત્  $\frac{1}{2}$ . બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, H

મળવાની સંભાવના =  $\frac{1}{2}$ . તો પછી, T મળવાની સંભાવના કેટલી હોઈ શકે ?

હવે, પાસો ફેંકવાનો પ્રયોગ વિચારો. (અહીં આપણે ઉપયોગમાં લેવાના પાસાની કુલ છ બાજુઓ પર 1 થી 6 નંબર લખેલા હોવા જોઈએ અર્થાત્ દરેક બાજુ પર માત્ર એક જ નંબર અને બધા જ નંબર અલગ-અલગ હોવા જોઈએ.) જો તમે આ પાસો 1 વખત ઉછાળો તો શું શક્યતા (outcomes) હોઈ શકે ?

અહીં, 1, 2, 3, 4, 5, 6 મળવાની શક્યતા છે. આમ, અહીં છ શક્યતાઓ સમાન રીતે એકસરખી બને છે. “2 મળવાની સંભાવના કેટલી થાય ?”

અહીં  $\frac{1}{6}$  ← 2 મળવાની શક્યતાની સંખ્યા  
 $\frac{1}{6}$  ← સમસંભાવી કુલ શક્યતાની સંખ્યા

5 મળવાની સંભાવના શું હોઈ શકે ? 7 મળવાની સંભાવના શું હોઈ શકે ? 6 માંથી 1 મળે તેની સંભાવના કેટલી ?

### 5.5.4 શક્યતા ઘટના સ્વરૂપે

દરેક પ્રયોગમાં મળતી શક્યતા કે શક્યતાઓનો સમૂહ ‘ઘટના’ને સ્વરૂપ આપે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, સિક્કો ઉછાળવાના પ્રયોગમાં ‘H’ મળવો એ એક ઘટના છે અને તે જ રીતે ‘T’ મળવો એ પણ એક ઘટના છે.

પાસો ફેંકવાના પ્રયોગમાં દરેક પ્રયત્નને અંતે મળતી સંખ્યા 1, 2, 3, 4, 5 કે 6 એ એક ઘટના જ છે.



શું યુગ્મ સંખ્યા મળવી એ એક ઘટના છે ? યુગ્મ સંખ્યાઓ 2, 4 અથવા 6 હોઈ શકે, તેથી યુગ્મ સંખ્યા મળવી એ પણ એક ઘટના જ છે. યુગ્મ સંખ્યા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના કેટલી ?

અહીં,  $\frac{3}{6}$  ← શક્યતાની સંખ્યા જે ઘટના બનાવે છે.  
 $\frac{3}{6}$  ← કુલ શક્યતાની સંખ્યા

**ઉદાહરણ 3 :** એક થેલામાં 4 લાલ રંગના અને 2 પીળા રંગના દડા છે. (અહીં, દરેક દડા રંગ સિવાય અન્ય કોઈ રીતે જુદા પડતા નથી.) જો થેલામાં જોયા વગર એક દડો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે (બહાર કાઢવામાં આવે) છે તો આ દડો લાલ રંગનો જ હોય તેની સંભાવના કેટલી ? શું તે સંભાવના પીળા રંગનો દડો હોવાની સંભાવના કરતાં વધુ કે ઓછી છે ?

**ઉકેલ :** આ ઘટના માટે કુલ  $(4 + 2 =)$  6 શક્યતાઓ છે. લાલ રંગનો દડો મળે તેવી શક્યતા 4 છે. (શા માટે ?) તેથી યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરેલો દડો લાલ રંગનો હોય તેની સંભાવના  $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$  થાય.

આ જ રીતે, યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરેલ દડો પીળા રંગનો હોય તેની સંભાવના  $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$  થાય. (શા માટે ?) આમ, પસંદ થયેલ દડો લાલ રંગનો હોય તેની સંભાવના પીળા રંગનો દડો હોવાની સંભાવના કરતાં વધુ છે.

### પ્રયત્ન કરો

ધારો કે તમે એક ચક્ર ઘુમાવો છો.

1. (i) આકૃતિ 5.11 માં દર્શાવ્યા મુજબ, લીલા રંગનું વૃત્તાંશ હોય તેવી શક્યતાની યાદી કરો અને લીલા રંગનું વૃત્તાંશ ન હોય તેવી શક્યતાની યાદી કરો.
- (ii) લીલા રંગનું વૃત્તાંશ મળે તેની સંભાવના શોધો.
- (iii) લીલા રંગનું વૃત્તાંશ ન મળે તેની સંભાવના શોધો.



આકૃતિ 5.11

### 5.5 વ્યવહારિક જીવનમાં તકો અને સંભાવનાઓ

જે દિવસે તમારી પાસે રેઈનકોટ ન હોય તે જ દિવસે વરસાદ આવે તેવી તકો વિશે આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી.

તમે આ તકને સંભાવનાના સ્વરૂપમાં શું કહી શકો ? શું ચોમાસાના 10 દિવસમાંથી માત્ર એક દિવસ જ આવું બને ? તો તેનો અર્થ એવો થયો કે વરસાદ આવવાની સંભાવના  $\frac{1}{10}$  છે અને તેથી વરસાદ ન આવવાની સંભાવના  $\frac{9}{10}$  છે. (અહીં, આપણે ધારી લઈએ કે જે-તે દિવસે વરસાદ આવે કે ન આવે તેની શક્યતા એક્સરખી છે.)

આપણા વ્યવહારુ જીવનમાં ઘણા કિસ્સામાં સંભાવનાનો ઉપયોગ થાય છે.

1. કોઈ એક મોટા સમૂહની લાક્ષણિકતા શોધવા માટે તે જ સમૂહના નાનકડા ભાગની લાક્ષણિકતા શોધવી.  
 ઉદાહરણ તરીકે, ચૂંટણી દરમિયાન એક્ઝિટ પોલ (Exit poll) લેવામાં આવે છે. આમાં જે લોકો પોતાનો મત આપીને આવ્યા હોય છે તેવા લોકોમાંથી એક સમૂહ બનાવી તેઓનો અભિપ્રાય લેવામાં આવે છે. આવું દરેક વિસ્તારના લોકો (સમૂહ) સાથે કરવામાં આવે છે અને તેના પરથી દરેક ઉમેદવારની જીતવાની તકો વિશે અનુમાન કરાય છે.




2. ભૂતકાળનાં વર્ષોની માહિતી પરથી તે વખતના પ્રવાહો (Trends)નું અવલોકન કરી હવામાન ખાતું (Metrological department) હવામાન વિશે આગાહી કરે છે.

### સ્વાધ્યાય 5.3

1. અહીં આપેલા પ્રયોગમાં તમને જોવા મળતી શક્યતાઓની યાદી બનાવો.  
 (a) ફરતું ચક્ર (b) એક સાથે બે સિક્કા ઉછાળવા



2. પાસાને ફેંકવાથી મળતાં પરિણામની મદદથી નીચે પૈકીની ઘટના બનવાની શક્યતા  
 (i) (a) અવિભાજ્ય સંખ્યા (b) અવિભાજ્ય ન હોય તેવી સંખ્યા  
 (ii) (a) 5 કરતાં મોટી સંખ્યા (b) 5 કરતાં મોટી ન હોય તેવી સંખ્યા
3. સંભાવના શોધો.  
 (a) પ્રશ્ન 1 (a)ની આકૃતિમાં દર્શક કાંટો વૃત્તાંશ D પર સ્થિર થાય.  
 (b) સારી રીતે ચીપેલાં (Well shuffled) 52 પાનાની જોડમાંથી એક પાનું યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરીએ અને તે એકી હોય.  
 (c) લાલ સફરજન મળવાની શક્યતા.



4. એક ચબરખી પર માત્ર એક જ નંબર લખેલ હોય તેવી કુલ 10 ચબરખી પર 1 થી 10 અંકો લખીને તેને એક ખોખામાં રાખી તેને સારી રીતે ભેળવવામાં (Mix) આવે છે. તેમાંથી કોઈ એક ચબરખી જોયા વગર પસંદ કરવામાં આવે છે. તો, નીચેની ઘટનાઓ માટે સંભાવના શોધો.  
 (i) ચબરખી પરની સંખ્યા 6 હોય.  
 (ii) ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા 6 કરતાં નાની હોય.  
 (iii) ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા 6 કરતાં મોટી હોય.  
 (iv) ચબરખી પર લખાયેલ સંખ્યા એક અંકવાળી હોય.
5. જો તમારી પાસે 3 લીલાં રંગનાં વૃત્તાંશો, 1 વાદળી રંગનું વૃત્તાંશ અને 1 લાલ રંગનું વૃત્તાંશ ધરાવતું ફરતું ચક્ર હોય તો લીલા રંગનું વૃત્તાંશ મળવાની સંભાવના કેટલી ? વાદળી રંગનું ન હોય, તેવાં વૃત્તાંશ મળવાની સંભાવના કેટલી ?
6. ઉપરોક્ત પ્રશ્ન-2 માં આપેલી ઘટનાઓ માટે સંભાવના શોધો.

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. સામાન્ય રીતે આપણને મળતી માહિતી અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપે મળતી હોય છે જેને કાચી માહિતી કહે છે.
2. જો આપણી પાસે રહેલ માહિતી પરથી કોઈ ચોક્કસ તારણ મેળવવું હોય તો આ માહિતીને સુવ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવવી પડે છે.
3. કોઈ ચોક્કસ નોંધ (Entry) કેટલી વખત બની તે દર્શાવતી સંખ્યાને આવૃત્તિ કહે છે.
4. કાચી માહિતીને સમૂહ કે વર્ગમાં ગોઠવી રજૂ કરી શકાય છે અને આવી ગોઠવણ ધરાવતાં કોષ્ટકને વર્ગીકૃત આવૃત્તિ વિતરણ કહે છે.
5. વર્ગીકૃત માહિતીને સ્તંભાલેખ (histogram) સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે. સ્તંભાલેખ એ લંબાલેખનો જ એક પ્રકાર છે જેમાં, વર્ગ અંતરાલ(class intervals)ને તેના સમક્ષિતિજ અક્ષ(X-અક્ષ) પર દર્શાવાય છે અને સ્તંભની ઊંચાઈ એ આવૃત્તિ દર્શાવે છે જે શિરોલંબ અક્ષ(Y-અક્ષ)ની મદદથી દર્શાવાય છે.  
ઉપરાંત, અહીં બે સ્તંભ વચ્ચે કોઈ અંતરાલ (Gap) હોતો નથી. અર્થાત્ બધા જ સ્તંભ એકબીજાને અડેલા હોય છે.
6. માહિતીને વર્તુળ આલેખ કે પાઈ-ચાર્ટની મદદથી પણ દર્શાવી શકાય છે. વર્તુળ આલેખ એ સમગ્ર માહિતી અને તેના થોડા ભાગ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે.
7. એવા ઘણા પ્રયોગો છે જેમાં મળતાં પરિણામ અંગે એકસમાન તક હોય છે.
8. યાદચ્છિક પ્રયોગ એ એવો પ્રયોગ છે જેમાં કોઈ ઘટના બને તે પહેલાં તેનાં પરિણામ/શક્યતા વિશે અગાઉથી ચોક્કસ તારણ આપી શકાતું નથી.
9. જો કોઈ પ્રયોગમાં દરેક ઘટના બનવાની એકસમાન તક હોય તો તેવા પ્રયોગમાં મળતાં ઈચ્છિત પરિણામો મળવાની તકો એકસમાન હોય છે.
10. ઘટનાની સંભાવના =  $\frac{\text{જે-તે ઘટના બનવાની શક્યતા}}{\text{પ્રયોગમાં રહેલ કુલ શક્યતાની સંખ્યા}}$
11. કોઈ પ્રયોગમાં એક કે એકથી વધુ શક્યતા “ઘટના” દર્શાવે છે.
12. આપણાં વ્યવહારુ જીવન સાથે પણ તકો અને સંભાવનાઓ સંકળાયેલી છે.





# વર્ગ અને વર્ગમૂળ

પ્રકરણ

6

## 6.1 પ્રાસ્તાવિક

આપણે જાણીએ છીએ કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ = બાજુ  $\times$  બાજુ (જ્યાં 'બાજુ' એ ચોરસની લંબાઈનું માપ છે.) નીચેના કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો :

ચોરસની બાજુ (સેમીમાં)	ચોરસનું ક્ષેત્રફળ (સેમી <sup>2</sup> માં)
1	$1 \times 1 = 1 = 1^2$
2	$2 \times 2 = 4 = 2^2$
3	$3 \times 3 = 9 = 3^2$
5	$5 \times 5 = 25 = 5^2$
8	$8 \times 8 = 64 = 8^2$
$a$	$a \times a = a^2$

4, 9, 25, 64 અને તેના જેવી અન્ય સંખ્યાઓમાં ખાસ બાબત શું છે ?

અહીં 4ને  $2 \times 2$  વડે, 9 ને  $3 \times 3$  વડે રજૂ કરી શકાય છે. આમ, આવી સંખ્યાઓને કોઈ એક સંખ્યા લઈ ફરી એ જ સંખ્યા સાથે ગુણાકારના સ્વરૂપે લખી શકાય છે.

આમ, આવી 1, 4, 9, 16, 25, ... વગેરે સંખ્યાઓને વર્ગ સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે, કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા  $m$  એ તો જ વર્ગ સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જો  $m$ ને  $n^2$  વડે દર્શાવી શકાય. જ્યાં  $n$  પણ એક પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. શું 32 એ વર્ગ સંખ્યા છે ?

આપણે જાણીએ છીએ કે  $5^2 = 25$  અને  $6^2 = 36$ . જો 32 એ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો તે 5 અને 6ની વચ્ચે આવતી કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ હોય, પરંતુ 5 અને 6ની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. આમ, 32 એ વર્ગ સંખ્યા નથી.

નીચેની સંખ્યાઓ અને તેના વર્ગો વિશે વિચારો :

સંખ્યા	વર્ગ
1	$1 \times 1 = 1$
2	$2 \times 2 = 4$







3	$3 \times 3 = 9$
4	$4 \times 4 = 16$
5	$5 \times 5 = 25$
6	-----
7	-----
8	-----
9	-----
10	-----

બાકીનું તમે  
જાતે પૂરું કરી  
શકો ?

ઉપરના કોષ્ટક પરથી આપણે 1 થી 100 વચ્ચે આવતી વર્ગ સંખ્યાઓની યાદી બનાવી શકીએ. આ 1 થી 100 વચ્ચે આવતી પ્રાકૃતિક વર્ગ સંખ્યામાં કોઈ સંખ્યા બાકી રહી જાય છે ?

આપણને એવું જાણવા મળશે કે કમ 1 થી 100 વચ્ચે આ સિવાય કોઈ સંખ્યા બાકી રહેતી નથી કે જે વર્ગ સંખ્યા હોય.

તેથી 1, 4, 9, 16, ... વર્ગ સંખ્યાઓ છે. આવી સંખ્યાઓને પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ પણ કહે છે.



### પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલ સંખ્યાઓ વચ્ચે આવતી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ શોધો :

(i) 30 અને 40

(ii) 50 અને 60

### 6.2 વર્ગ સંખ્યાઓના ગુણધર્મો

નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સંખ્યા 1 થી 20ની વર્ગસંખ્યાઓ દર્શાવેલ છે.

સંખ્યા	વર્ગ	સંખ્યા	વર્ગ
1	1	11	121
2	4	12	144
3	9	13	169
4	16	14	196
5	25	15	225
6	36	16	256
7	49	17	289
8	64	18	324
9	81	19	361
10	100	20	400

ઉપરના કોષ્ટકમાં આપેલી વર્ગ સંખ્યાઓનો અભ્યાસ કરો. દરેક વર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક શું જોવા મળે છે ? એટલે કે દરેક વર્ગ સંખ્યાનો અંતિમ અંક શું મળે છે ? આ બધી જ વર્ગ સંખ્યાઓનો એકમનો અંક 0, 1, 4, 5, 6 અથવા 9 છે. એકપણ વર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક 2, 3, 7 અથવા 8 પૈકી કોઈ નથી.

શું આપણે એમ કહી શકીએ કે જો આપેલી સંખ્યાનો એકમનો અંક 0, 1, 4, 5, 6 અથવા 9 હોય તો તે સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ જ હોય ? આ બાબતે થોડુંક વિચારશો.

### પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલી સંખ્યાઓ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ છે ? તમને કેવી રીતે ખબર પડી તે પણ જણાવો :

1. (i) 1057

(ii) 23453

(iii) 7928

(iv) 222222

(v) 1069

(vi) 2061





એવી પાંચ સંખ્યાઓ જણાવો કે જેના એકમના અંક પરથી જ જાણી શકાય કે તે વર્ગ સંખ્યા નથી.

2. એવી પાંચ સંખ્યાઓ જણાવો કે જેના એકમના અંક પરથી અનુમાન ન કરી શકાય કે તે વર્ગ સંખ્યા હશે કે નહિ હોય.

- નીચે આપેલા કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો. તેમાં કેટલીક સંખ્યાઓ અને તેના વર્ગ આપેલાં છે. આવી સંખ્યાઓના એકમના અંકનું નિરીક્ષણ કરો :

કોષ્ટક : 1

સંખ્યા	વર્ગ	સંખ્યા	વર્ગ	સંખ્યા	વર્ગ
1	1	11	121	21	441
2	4	12	144	22	484
3	9	13	169	23	529
4	16	14	196	24	576
5	25	15	225	25	625
6	36	16	256	30	900
7	49	17	289	35	1225
8	64	18	324	40	1600
9	81	19	361	45	2025
10	100	20	400	50	2500

નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલી વર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 છે :

વર્ગ	સંખ્યા
1	1
81	9
121	11
361	19
441	21

### પ્રયત્ન કરો

123<sup>2</sup>, 77<sup>2</sup>, 82<sup>2</sup>, 161<sup>2</sup> અને 109<sup>2</sup> માં કઈ સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 છે ?



હવે પછીની એવી બે વર્ગ સંખ્યાઓ લખો જેનો એકમનો અંક 1 હોય અને તેને સંલગ્ન સંખ્યાઓ લખો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો કોઈ સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 અથવા 9 હોય, તો તેનો વર્ગ કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 હોય.

- નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલી વર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક 6 છે :

વર્ગ	સંખ્યા
16	4
36	6
196	14
256	16

### પ્રયત્ન કરો

નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાનો એકમનો અંક 6 હશે ?

- (i) 19<sup>2</sup>                      (ii) 24<sup>2</sup>                      (iii) 26<sup>2</sup>  
(iv) 36<sup>2</sup>                      (v) 34<sup>2</sup>

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 4 અથવા 6 હોય, તેની વર્ગસંખ્યાનો એકમનો અંક 6 હશે.

શું તમને કોષ્ટક 1ની મદદથી બીજા કોઈ નિયમની જાણકારી મળે છે ?





### પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલી સંખ્યાનો વર્ગ કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું મળશે ?

- (i) 1234                      (ii) 26387                      (iii) 52698                      (iv) 99880  
(v) 21222                      (vi) 9106

- નીચે આપેલી સંખ્યા અને તેના વર્ગો વિશે વિચારો :



જો કોઈ સંખ્યાના છેલ્લા ત્રણ અંકો શૂન્ય હોય તો તેવી સંખ્યાનો વર્ગ કરતાં મળતી સંખ્યામાં છેલ્લે કેટલાં શૂન્યો હશે ?

કોઈ સંખ્યાના અંતે રહેલા શૂન્યની સંખ્યા અને તે સંખ્યાનો વર્ગ કરવાથી મળતી સંખ્યામાં રહેલ શૂન્યોની સંખ્યા વિશે તમે શું નિરીક્ષણ કર્યું ?

શું આપણે કહી શકીએ કે કોઈ વર્ગ સંખ્યાનાં અંતિમ શૂન્યોની સંખ્યા હંમેશાં બેકી જ હોય ?

- સંખ્યા અને તેના વર્ગો દર્શાવતું કોષ્ટક 1 જુઓ.

તમે એકી સંખ્યા અને બેકી સંખ્યાના વર્ગો વિશે શું કહી શકો છો ?



### પ્રયત્ન કરો

1. નીચે આપેલી કઈ સંખ્યાઓનો વર્ગ કરવાથી તે એકી સંખ્યા કે બેકી સંખ્યા આવશે ? કેમ ?

- (i) 727                      (ii) 158                      (iii) 269                      (iv) 1980

2. નીચે આપેલી સંખ્યાઓનો વર્ગ કરવાથી મળતી સંખ્યાઓમાં કેટલાં શૂન્યો હશે ?

- (i) 60                      (ii) 400

### 6.3 કેટલીક રસપ્રદ પેટર્ન

1. ત્રિકોણીય સંખ્યાઓનો સરવાળો.

તમને ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ યાદ છે (એવી સંખ્યાઓ કે જેની બિંદુઓથી દર્શાવતી પેટર્નને ત્રિકોણ તરીકે ગોઠવી શકાય)




5CMMPI

*	*	*	*	*
	**	**	**	**
		***	***	***
			****	****
				*****
1	3	6	10	15


જો આપણે એક સાથે બે ક્રમિક ત્રિકોણીય સંખ્યા વિચારીએ, તો આપણને વર્ગ સંખ્યા મળે છે, જેમ કે-



$$1 + 3 = 4 \\ = 2^2$$



$$3 + 6 = 9 \\ = 3^2$$



$$6 + 10 = 16 \\ = 4^2$$

## 2. બે વર્ગ સંખ્યાઓની વચ્ચેની સંખ્યાઓ

હવે આપણે બે ક્રમિક વર્ગ સંખ્યાઓને જોડતી રસપ્રદ પેટર્ન જોઈએ.

બે વર્ગ સંખ્યાઓ 9 અને 16ની વચ્ચે છ સંખ્યા એવી મળે છે કે જે વર્ગ નથી.

$$1 (= 1^2)$$

$$2, 3, 4 (= 2^2)$$

બે વર્ગ સંખ્યાઓ 1 અને 4ની વચ્ચે બે સંખ્યાઓ એવી મળે છે કે જે વર્ગ નથી.

$$5, 6, 7, 8, 9 (= 3^2)$$

$$10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (= 4^2)$$

બે વર્ગ સંખ્યાઓ 16 અને 25ની વચ્ચે આઠ સંખ્યાઓ એવી મળે છે કે જે વર્ગ નથી.

$$17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (= 5^2)$$

બે વર્ગ સંખ્યાઓ 4 અને 9ની વચ્ચે ચાર સંખ્યાઓ એવી મળે છે કે જે વર્ગ નથી.

આમ,  $1^2 (= 1)$  અને  $2^2 (= 4)$  વચ્ચે બે  $(2 \times 1)$  વર્ગ સંખ્યા ન હોય તેવી સંખ્યાઓ 2, 3 મળે.

$2^2 (= 4)$  અને  $3^2 (= 9)$  વચ્ચે ચાર  $(2 \times 2)$  વર્ગ સંખ્યા ન હોય તેવી સંખ્યાઓ 5, 6, 7, 8 મળે.

$$\text{હવે } 3^2 = 9 \text{ અને } 4^2 = 16$$

$$\text{તેથી } 4^2 - 3^2 = 16 - 9 = 7$$

પરંતુ  $9 (= 3^2)$  અને  $16 (= 4^2)$  વચ્ચે વર્ગ સંખ્યા ન હોય તેવી સંખ્યાઓ છે 10, 11, 12, 13, 14, 15. આમ, મળેલી છ સંખ્યાઓ એ બે વર્ગોના તફાવતથી એક ઓછી છે.

$$\text{હવે, } 4^2 = 16 \text{ અને } 5^2 = 25$$

$$\text{તેથી } 5^2 - 4^2 = 9$$

પરંતુ  $16 (= 4^2)$  અને  $25 (= 5^2)$  વચ્ચે વર્ગ સંખ્યા (એટલે કે પૂર્ણવર્ગ) ન હોય તેવી સંખ્યાઓ આઠ હોય છે. જેમ કે, 17, 18, 19, ..., 24. આમ આવી મળતી સંખ્યાઓ એ બે વર્ગોના તફાવતથી એક ઓછી હોય છે.

$7^2$  અને  $6^2$  માટે વિચારો. તમે કહી શકો કે  $6^2$  અને  $7^2$  વચ્ચે આવી પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી કેટલી સંખ્યાઓ હશે ?

જો આપણે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા  $n$  અને  $(n + 1)$  માટે વિચારીએ તો,

$$(n + 1)^2 - n^2 = (n^2 + 2n + 1) - n^2 = 2n + 1$$

આપણે શોધી શકીએ કે  $n^2$  અને  $(n + 1)^2$  વચ્ચે પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી સંખ્યાઓ  $2n$  હોય. જે બે પૂર્ણવર્ગના તફાવતથી એક ઓછી છે.

આમ, આપણે વ્યાપક રૂપે કહી શકીએ કે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓ  $n$  અને  $(n + 1)$ ના વર્ગો વચ્ચે આવતી પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી સંખ્યાઓ  $2n$  હશે. તમે  $n = 5$ ,  $n = 6$  માટે ચકાસણી કરો.



### પ્રયત્ન કરો

- $9^2$  અને  $10^2$  વચ્ચે કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આવે ? તેમજ  $11^2$  અને  $12^2$  વચ્ચે કેટલી ?
- નીચે આપેલ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓની જોડીઓ વચ્ચે પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી કેટલી સંખ્યાઓ આવે ?  
(i)  $100^2$  અને  $101^2$  (ii)  $90^2$  અને  $91^2$  (iii)  $1000^2$  અને  $1001^2$

### 3. એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો

નીચેના સરવાળાઓ જુઓ :

$$\begin{aligned} 1 \text{ [એક એકી સંખ્યા છે]} &= 1 = 1^2 \\ 1 + 3 \text{ [પ્રથમ બે એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો]} &= 4 = 2^2 \\ 1 + 3 + 5 \text{ [પ્રથમ ત્રણ એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો]} &= 9 = 3^2 \\ 1 + 3 + 5 + 7 \text{ [ ... ]} &= 16 = 4^2 \\ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 \text{ [ ... ]} &= 25 = 5^2 \\ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 \text{ [ ... ]} &= 36 = 6^2 \end{aligned}$$

તેથી આપણે કહી શકીએ કે પ્રથમ  $n$  એકી સંખ્યાનો સરવાળો  $n^2$  મળે.

આ બાબતને જો આપણે બીજી રીતે જોઈએ તો, ‘જો કોઈ સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે, તો તેને 1 થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે રજૂ કરી શકાય.’

અહીં, 2, 3, 5, 6, ... વગેરે પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી સંખ્યાઓ છે. શું આપણે તેને 1 થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે રજૂ કરી શકીએ ? વિચારો.

તમે કહી શકશો કે આ રીતે રજૂ કરી શકાય નહિ.

હવે સંખ્યા 25 વિચારો. 25માંથી ક્રમિક 1, 3, 5, 7, 9 ... ની બાદબાકી કરીએ તો...

$$\begin{aligned} \text{(i) } 25 - 1 &= 24 & \text{(ii) } 24 - 3 &= 21 & \text{(iii) } 21 - 5 &= 16 \\ \text{(iv) } 16 - 7 &= 9 & \text{(v) } 9 - 9 &= 0 \end{aligned}$$

અર્થાત્,  $25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$  અને 25 પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા પણ છે.

હવે બીજી સંખ્યા 38 વિચારો. ઉપર મુજબ જ બાદબાકી કરતાં,

$$\begin{aligned} \text{(i) } 38 - 1 &= 37 & \text{(ii) } 37 - 3 &= 34 & \text{(iii) } 34 - 5 &= 29 \\ \text{(iv) } 29 - 7 &= 22 & \text{(v) } 22 - 9 &= 13 & \text{(vi) } 13 - 11 &= 2 \\ \text{(vii) } 2 - 13 &= -11 \end{aligned}$$

આ બતાવે છે કે આપણે 38 ને 1 થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે રજૂ કરી શકતા નથી તેમજ 38 એ પૂર્ણવર્ગ પણ નથી.

તેથી આપણે કહી શકીએ કે, ‘જો આપેલ પ્રાકૃતિક સંખ્યાને 1 થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા તરીકે રજૂ ન કરી શકાય, તો તે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી.’

આ પરિણામના ઉપયોગથી આપણે આપેલ સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ છે કે નહિ તે શોધી શકીએ છીએ.

### પ્રયત્ન કરો

નીચેની સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે કે નહિ તે કહો :

$$\text{(i) } 121 \quad \text{(ii) } 55 \quad \text{(iii) } 81 \quad \text{(iv) } 49 \quad \text{(v) } 69$$

### 4. ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો

નીચેની બાબત ધ્યાનથી જુઓ :

$$\begin{aligned} \text{પ્રથમ સંખ્યા} & \quad 3^2 = 9 = 4 + 5 & \text{બીજી સંખ્યા} \\ \frac{3^2-1}{2} & \quad 5^2 = 25 = 12 + 13 & \frac{3^2+1}{2} \\ & \quad 7^2 = 49 = 24 + 25 \end{aligned}$$

$$9^2 = 81 = 40 + 41$$

$$11^2 = 121 = 60 + 61$$

$$15^2 = 225 = 112 + 113$$

અર્થાત્, આપણે કોઈપણ એકી સંખ્યાઓના વર્ગને બે ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળા તરીકે રજૂ કરી શકીએ છીએ.



**પ્રયત્ન કરો**

- નીચેની સંખ્યાઓને બે ક્રમિક સંખ્યાના સરવાળા તરીકે રજૂ કરો :  
 (i)  $21^2$       (ii)  $13^2$       (iii)  $11^2$       (iv)  $19^2$
- શું એ પણ સાચું છે કે, બે ક્રમિક સંખ્યાઓનો સરવાળો એ કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ હશે ? તમારા જવાબના આધાર માટે ઉદાહરણ પણ આપો.

**5. બે ક્રમિક એકી અથવા બેકી સંખ્યાઓનો ગુણાકાર**

$$11 \times 13 = 143 = 12^2 - 1$$

પણ  $11 \times 13 = (12 - 1) \times (12 + 1)$

તેથી  $11 \times 13 = (12 - 1) \times (12 + 1) = 12^2 - 1$

તેવી જ રીતે  $13 \times 15 = (14 - 1) \times (14 + 1) = 14^2 - 1$

$$29 \times 31 = (30 - 1) (30 + 1) = 30^2 - 1$$

$$44 \times 46 = (45 - 1) (45 + 1) = 45^2 - 1$$

તેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે,  $(a + 1) \times (a - 1) = a^2 - 1$

**6. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓની અન્ય બીજી તરાહો**

$1^2 =$	1
$11^2 =$	1 2 1
$111^2 =$	1 2 3 2 1
$1111^2 =$	1 2 3 4 3 2 1
$11111^2 =$	1 2 3 4 5 4 3 2 1
$11111111^2 =$	1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1

બીજી રસપ્રદ તરાહ...

$$7^2 = 49$$

$$67^2 = 4489$$

$$667^2 = 444889$$

$$6667^2 = 44448889$$

$$66667^2 = 4444488889$$

$$666667^2 = 444444888889$$

આવું કેમ બને છે તે શોધી કાઢવા તમે જ્યારે સક્ષમ બનશો ત્યારે મજા પડશે. જ્યારે અમુક વર્ષો પછી તમને તેનો જવાબ મળશે ત્યારે તે તમારા માટે રસપ્રદ રહેશે અને આવા પ્રશ્નોથી વિચાર શક્તિ વિસ્તરશે.

**પ્રયત્ન કરો**

નીચેની સંખ્યા માટે ઉપર દર્શાવેલ તરાહ મુજબ વર્ગ કરો :  
 (i)  $111111^2$       (ii)  $1111111^2$

**પ્રયત્ન કરો**

શું તમે બાજુની તરાહની મદદથી આપેલી સંખ્યાઓનો વર્ગ શોધી શકો ?  
 (i)  $6666667^2$       (ii)  $66666667^2$





## સ્વાધ્યાય 6.1

- નીચે આપેલ સંખ્યાઓના વર્ગ કરવાથી એકમનો અંક શું મળશે ?
 

(i) 81	(ii) 272	(iii) 799	(iv) 3853
(v) 1234	(vi) 26387	(vii) 52698	(viii) 99880
(ix) 12796	(x) 55555		
- નીચેની સંખ્યાઓ માટે સ્પષ્ટ છે કે તે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ નથી. કારણ સહ જણાવો.
 

(i) 1057	(ii) 23453	(iii) 7928	(iv) 222222
(v) 64000	(vi) 89722	(vii) 222000	(viii) 505050
- નીચે આપેલી સંખ્યાઓમાંથી કઈ સંખ્યાઓનો વર્ગ કરતાં મળતી સંખ્યા એકી સંખ્યા હશે ?
 

(i) 431	(ii) 2826	(iii) 7779	(iv) 82004
---------	-----------	------------	------------
- નીચેની પેટર્નમાંથી ખૂટતી સંખ્યાઓ જણાવો :

$$11^2 = 121$$

$$101^2 = 10201$$

$$1001^2 = 1002001$$

$$100001^2 = 1.....2.....1$$

$$10000001^2 = .....$$

- નીચે આપેલી પેટર્નમાં ખૂટતી સંખ્યાઓ જણાવો :

$$11^2 = 121$$

$$101^2 = 10201$$

$$10101^2 = 102030201$$

$$1010101^2 = .....$$

$$.....^2 = 10203040504030201$$

- નીચેની રીત મુજબ ખૂટતી સંખ્યાઓ શોધો :

$$1^2 + 2^2 + 2^2 = 3^2$$

$$2^2 + 3^2 + 6^2 = 7^2$$

$$3^2 + 4^2 + 12^2 = 13^2$$

$$4^2 + 5^2 + .....^2 = 21^2$$

$$5^2 + .....^2 + 30^2 = 31^2$$

$$6^2 + 7^2 + ...^2 = .....^2$$

- સરવાળાની ક્રિયા વિના સરવાળો મેળવો.

$$(i) 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

$$(ii) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19$$

$$(iii) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23$$

- (iv) 49ને 7 એકી સંખ્યાઓના સરવાળા તરીકે દર્શાવો.

$$(v) 121ને 11 એકી સંખ્યાઓના સરવાળા તરીકે દર્શાવો.$$

- નીચે આપેલી સંખ્યાઓના વર્ગો વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ આવશે તે જણાવો.

$$(i) 12 \text{ અને } 13 \quad (ii) 25 \text{ અને } 26 \quad (iii) 99 \text{ અને } 100$$

### રીત શોધવા માટે :

ત્રીજી સંખ્યા એ પ્રથમ અને બીજી સંખ્યા સાથે સંલગ્ન છે. કેવી રીતે ?

ચોથી સંખ્યા એ ત્રીજી સંખ્યા સાથે સંલગ્ન છે. કેવી રીતે ?

## 6.4 સંખ્યાઓનો વર્ગ શોધવો

આપણા માટે 3, 4, 5, 6, 7, ... વગેરે નાની સંખ્યાઓના વર્ગો શોધવા સરળ છે, પરંતુ 23નો વર્ગ ઝડપથી શોધવો હોય તો ?

તેનો જવાબ આપવો સરળ નથી. વર્ગ શોધવા માટે આપણે  $23 \times 23$  કરવું પડે.

પરંતુ  $23 \times 23$  કર્યા વિના 23નો વર્ગ શોધવાનો એક બીજો રસ્તો પણ છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે,

$$23 = 20 + 3$$

$$\begin{aligned} \text{તેથી } 23^2 &= (20 + 3)^2 \\ &= 20(20 + 3) + 3(20 + 3) \\ &= 20^2 + 20 \times 3 + 3 \times 20 + 3^2 \\ &= 400 + 60 + 60 + 9 \\ &= 529 \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 1 :** ખરેખર ગુણાકારની ક્રિયા કર્યા વિના જ નીચેની સંખ્યાઓના વર્ગો શોધો :

$$(i) 39 \qquad (ii) 42$$

$$\begin{aligned} \text{ઉકેલ : } (i) 39 &= (30 + 9)^2 = 30(30 + 9) + 9(30 + 9) \\ &= 30^2 + 30 \times 9 + 9 \times 30 + 9^2 \\ &= 900 + 270 + 270 + 81 \\ &= 1521 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) 42^2 &= (40 + 2)^2 \\ &= 40(40 + 2) + 2(40 + 2) \\ &= 40^2 + 40 \times 2 + 2 \times 40 + 2^2 \\ &= 1600 + 80 + 80 + 4 \\ &= 1764 \end{aligned}$$

### 6.4.1 વર્ગ શોધવા માટેની અન્ય રીતો

નીચેની રીત પર વિચારો :

$$\begin{aligned} 25^2 &= 625 = (2 \times 3) \times \text{સો} + 25 \\ 35^2 &= 1225 = (3 \times 4) \times \text{સો} + 25 \\ 75^2 &= 5625 = (7 \times 8) \times \text{સો} + 25 \\ 125^2 &= 15625 = (12 \times 13) \times \text{સો} + 25 \end{aligned}$$

#### પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલી સંખ્યામાં એકમનો અંક 5 છે, તેમનો વર્ગ શોધો.

$$(i) 15 \qquad (ii) 95 \qquad (iii) 105 \qquad (iv) 205$$

જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 છે એટલે કે તે સંખ્યા  $a5$  હોય તો

$$\begin{aligned} (a5)^2 &= (10a + 5)^2 \\ &= 10a(10a + 5) + 5(10a + 5) \\ &= 100a^2 + 50a + 50a + 25 \\ &= 100a(a + 1) + 25 \\ &= a(a + 1) \times \text{સો} + 25 \end{aligned}$$

### 6.4.2 પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટીઓ

નીચેના માટે વિચારો :

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$$

સંખ્યાઓ 3, 4 અને 5નો સમૂહ એ “પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી” તરીકે ઓળખાય છે.

તેમજ 6, 8, 10 એ પણ પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી છે. કેમ કે,

$$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$$

ફરીથી નિરીક્ષણ કરો  $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$

એટલે કે સંખ્યાઓ 5, 12 અને 13 પણ આવી ત્રિપુટી રચે છે.



5D6IR6



શું તમે આવી અન્ય ત્રિપુટીઓ શોધી શકો ?

કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા  $m > 1$ , માટે જો  $(2m)^2 + (m^2 - 1)^2 = (m^2 + 1)^2$  તો  $2m$ ,  $m^2 - 1$  અને  $m^2 + 1$  એ પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી હોય છે. આ તેનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે.

ઉપરના પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી માટેના વ્યાપક સ્વરૂપની મદદથી પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટીઓ મેળવો.

**ઉદાહરણ 2 :** જેનો નાનામાં નાનો અંક 8 હોય તેવી પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી શોધો.

**ઉકેલ :** આપણે પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી તેના વ્યાપક સ્વરૂપ  $2m$ ,  $m^2 - 1$  અને  $m^2 + 1$  ની મદદથી શોધીશું.

સૌ પ્રથમ આપણે  $m^2 - 1 = 8$  લઈશું.

તેથી  $m^2 = 8 + 1 = 9$

તેથી  $m = 3$

એટલે કે  $2m = 6$  અને  $m^2 + 1 = 10$

અહીં પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી 6, 8 અને 10 મળે છે, પરંતુ 8 એ આ પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટીનો નાનામાં નાનો અંક નથી.

તેથી આપણે  $2m = 8$  લઈએ

$$\therefore m = 4$$

તેથી આપણને  $m^2 - 1 = 16 - 1 = 15$  અને

$$m^2 + 1 = 16 + 1 = 17 \text{ મળશે.}$$

આમ, 8, 15, 17 એ એવી પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી છે કે જેનો નાનામાં નાનો અંક 8 છે.

**ઉદાહરણ 3 :** જે પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટીમાં એક સંખ્યા 12 હોય તેવી પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી શોધો.

**ઉકેલ :** જો આપણે  $m^2 - 1 = 12$  લઈએ તો

$$m^2 = 12 + 1 = 13$$

તેથી  $m$ ની કિંમત પૂર્ણાંક નથી.

તેથી આપણે  $m^2 + 1 = 12$  લઈએ, ફરી  $m^2 = 11$  અહીં, આપણને  $m$ ની પૂર્ણાંક કિંમત મળતી નથી.

તેથી આપણે  $2m = 12$  લઈએ.

$$\therefore m = 6$$

તેથી  $m^2 - 1 = 36 - 1 = 35$ ,  $m^2 + 1 = 36 + 1 = 37$

આમ, પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી 12, 35 અને 37 મળે.

**નોંધ :** બધી જ પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી આ વ્યાપક સ્વરૂપથી નથી મળતી. ઉદાહરણ તરીકે 5, 12, 13 બીજી એક પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી છે, જેનો એક અંક 12 છે.

## સ્વાધ્યાય 6.2



1. નીચે આપેલી સંખ્યાઓના વર્ગ શોધો :

(i) 32 (ii) 35 (iii) 86

(iv) 93 (v) 71 (vi) 46

2. નીચે આપેલી સંખ્યા ધરાવતી પાયથાગોરીઅન ત્રિપુટી લખો :

(i) 6 (ii) 14 (iii) 16 (iv) 18

## 6.5 વર્ગમૂળ

નીચેની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરો :

(a) જો એક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ  $144 \text{ cm}^2$  હોય તો તે ચોરસની બાજુનું માપ કેટલું હોય ?

આપણે જાણીએ છીએ કે,

$$\text{ચોરસનું ક્ષેત્રફળ} = (\text{બાજુ})^2$$

જો આપણે ચોરસની બાજુની લંબાઈ 'a' ધારીએ તો,  $144 = a^2$

આમ, a ની કિંમત શોધવા માટે આપણે એવી સંખ્યા શોધવી પડે કે જેનો વર્ગ 144 મળે.

- (b) આકૃતિ 6.1માં 8 સેમી બાજુવાળા ચોરસના વિકર્ણની લંબાઈ શું હશે ?  
શું આપણે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી આનો ઉકેલ મેળવી શકીએ ?

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$\therefore 8^2 + 8^2 = AC^2$$

$$\text{અથવા } 64 + 64 = AC^2$$

$$\text{અથવા } 128 = AC^2$$

આપણને ACની કિંમત તો જ મળે જો આપણે શોધી કાઢીએ કે 128 એ કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે.

- (c) કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણ અને કોઈ એક બાજુની લંબાઈ અનુક્રમે 5 સેમી અને 3 સેમી છે. (આકૃતિ 6.2) શું તમે ત્રીજી બાજુની લંબાઈ શોધી શકશો ?

ધારો કે ત્રીજી બાજુની લંબાઈ x સેમી છે.

$$\text{પાયથાગોરસના પ્રમેયની મદદથી, } 5^2 = x^2 + 3^2$$

$$\therefore 25 = x^2 + 9$$

$$\therefore 25 - 9 = x^2$$

$$\therefore 16 = x^2$$

આપણને xની કિંમત માટે 16 કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે તેની જાણકારી જરૂરી છે.

આમ, ઉપરના બધા જ કિસ્સાઓમાં આપણે એક એવી સંખ્યા શોધવી પડે કે જેનો વર્ગ જાણીતી સંખ્યા મળે.

આમ, જાણીતી સંખ્યા કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે, તે શોધવાની પ્રક્રિયાને વર્ગમૂળ શોધવાની પ્રક્રિયા કહે છે.

### 6.5.1 વર્ગમૂળ શોધવું

જેવી રીતે સરવાળાની વિરુદ્ધ ક્રિયા બાદબાકી અને ગુણાકારની વિરુદ્ધ ક્રિયા ભાગાકાર છે, તેવી જ રીતે કોઈ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ શોધવું તે વર્ગ શોધવાની ક્રિયાની વિરુદ્ધ પ્રકારની ક્રિયા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે,

$$1^2 = 1 \text{ તેથી } 1 \text{નું વર્ગમૂળ } 1 \text{ છે.}$$

$$2^2 = 4 \text{ તેથી } 4 \text{નું વર્ગમૂળ } 2 \text{ છે.}$$

$$3^2 = 9 \text{ તેથી } 9 \text{નું વર્ગમૂળ } 3 \text{ છે.}$$

જો કે  $9^2 = 81$  અને  $(-9)^2 = 81$  તેથી આપણે કહી શકીએ કે 81નું વર્ગમૂળ -9 અને 9 છે.

### પ્રયત્ન કરો

(i) જો  $11^2 = 121$ , તો 121નું વર્ગમૂળ ?

(ii)  $14^2 = 196$ , તો 196નું વર્ગમૂળ ?

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો


$(-1)^2 = 1$ , શું -1 એ 1નું વર્ગમૂળ છે ?  $(-2)^2 = 4$ , શું -2 એ 4 નું વર્ગમૂળ છે ?

$(-9)^2 = 81$ , શું -9 એ 81નું વર્ગમૂળ છે ?


ઉપરની ચર્ચા પરથી આપણે કહી શકીએ કે, કોઈ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય છે. આ પ્રકરણમાં આપણે ફક્ત પ્રાકૃતિક સંખ્યાનું ધન વર્ગમૂળ જ લઈશું.

ધન વર્ગમૂળ ને આપણે  $\sqrt{\quad}$  સંકેતથી દર્શાવીશું

દાખલા તરીકે,  $\sqrt{4} = 2$  (-2 નહીં લઈએ)  $\sqrt{9} = 3$  (-3 નહીં લઈએ) વગેરે.



આકૃતિ 6.1



આકૃતિ 6.2



વિધાન	અનુમાન
$1^2 = 1$	$\sqrt{1} = 1$
$2^2 = 4$	$\sqrt{4} = 2$
$3^2 = 9$	$\sqrt{9} = 3$
$4^2 = 16$	$\sqrt{16} = 4$
$5^2 = 25$	$\sqrt{25} = 5$

વિધાન	અનુમાન
$6^2 = 36$	$\sqrt{36} = 6$
$7^2 = 49$	$\sqrt{49} = 7$
$8^2 = 64$	$\sqrt{64} = 8$
$9^2 = 81$	$\sqrt{81} = 9$
$10^2 = 100$	$\sqrt{100} = 10$



### 6.5.2 પુનરાવર્તિત બાદબાકીની મદદથી વર્ગમૂળ શોધવું

તમને યાદ છે ને કે પ્રથમ  $n$  એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો  $n^2$  મળે ? તેથી પ્રત્યેક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાને 1 થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા સ્વરૂપે રજૂ કરી શકાય.

$\sqrt{81}$  માટે વિચારીએ તો,

- |                      |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| (i) $81 - 1 = 80$    | (ii) $80 - 3 = 77$    | (iii) $77 - 5 = 72$ |
| (iv) $72 - 7 = 65$   | (v) $65 - 9 = 56$     | (vi) $56 - 11 = 45$ |
| (vii) $45 - 13 = 32$ | (viii) $32 - 15 = 17$ | (ix) $17 - 17 = 0$  |

#### પ્રયત્ન કરો

1 થી શરૂ કરી ક્રમિક અયુગ્મ સંખ્યાની પુનરાવર્તિત બાદબાકી કરીને જણાવો કે નીચેની સંખ્યાઓ પૂર્ણવર્ગ છે કે નહીં ? જો પૂર્ણવર્ગ હોય તો તેમનું વર્ગમૂળ શોધો.

- (i) 121
- (ii) 55
- (iii) 36
- (iv) 49
- (v) 90

અહીં આપણે 81માંથી 1 થી શરૂ કરી ક્રમિક એકી સંખ્યા બાદ કરતા ગયા અને 9મા પગલે આપણને બાદબાકી શૂન્ય મળે છે. તેથી  $\sqrt{81} = 9$

શું તમે 729નું વર્ગમૂળ આ પદ્ધતિથી શોધી શકો ? હા. પરંતુ તે પ્રક્રિયા ઘણી જ લાંબી અને વધારે સમય લાગે તેવી છે. ચાલો, આપણે સરળ રીતે વર્ગમૂળ શોધવાની રીત જાણીએ.

### 6.5.3 અવિભાજ્ય અવયવીકરણની મદદથી વર્ગમૂળ શોધવું

નીચે સંખ્યા અને તેના વર્ગોને અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર તરીકે રજૂ કરેલ છે.

સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવો	વર્ગના અવિભાજ્ય અવયવ
$6 = 2 \times 3$	$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$
$8 = 2 \times 2 \times 2$	$64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$
$12 = 2 \times 2 \times 3$	$144 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$
$15 = 3 \times 5$	$225 = 3 \times 3 \times 5 \times 5$

અહીં 6ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં 2 કેટલી વાર આવે છે ? એકવાર. 36 ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં 2 કેટલી વાર આવે છે ? બે વાર. તેવી જ રીતે નિરીક્ષણ કરો કે 6 અને 36 ના અવયવીકરણમાં 3 તેમજ 8 અવયવીકરણમાં 8 કેટલીવાર આવે છે ? 6 અને 144 ના અવયવીકરણમાં 3 તેમજ 8 અને 64ના અવયવીકરણમાં 2 કેટલીવાર આવે ?

આપણને જાણવા મળશે કે દરેક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેક અવિભાજ્ય અવયવ બે વાર આવે છે.

એટલે કે દરેક અવિભાજ્ય અવયવ બે-બેની જોડીમાં આવે છે.

ચાલો, આપણે તેનો ઉપયોગ 324 નું વર્ગમૂળ શોધવા માટે કરીએ.

આપણે જાણીએ છીએ કે,

$$324 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

2	324
2	162
3	81
3	27
3	9
3	3
	1



અવિભાજ્ય અવયવોની જોડી બનાવતાં,

$$324 = \underline{2 \times 2} \times \underline{3 \times 3} \times \underline{3 \times 3} = 2^2 \times 3^2 \times 3^2 = (2 \times 3 \times 3)^2$$

તેથી  $\sqrt{324} = 2 \times 3 \times 3 = 18$

તેવી જ રીતે આપણે 256નું વર્ગમૂળ શોધીએ. 256ના અવિભાજ્ય અવયવો.

$$256 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

અવિભાજ્ય અવયવોની જોડી બનાવતાં

$$256 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \\ = (2 \times 2 \times 2 \times 2)^2$$

∴  $\sqrt{256} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

શું 48 પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે ?

આપણે જાણીએ છીએ કે,  $48 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times 3$

અહીં 48ના અવિભાજ્ય અવયવો જોડીમાં નથી. તેથી 48 એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી.

ધારો કે આપણે 48 નો એવો નાનામાં નાનો ગુણક શોધવો છે કે જેથી 48 પૂર્ણવર્ગ બને. તો આપણે શું કરીશું ? 48ના અવયવોની જોડી બનાવતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અવયવ 3 જોડીમાં નથી. તેથી 48ને માત્ર 3 વડે ગુણવાથી જોડી બની જાય.

આમ,  $48 \times 3 = 144$  એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે.

શું આપણે કહી શકીએ કે કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે 48 ને ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ મળે ?

48ના અવિભાજ્ય અવયવમાં 3 એ જોડીમાં નથી, તેથી જો આપણે 48 ને 3 વડે ભાગીએ તો આપણને  $48 \div 3 = 16$  મળે. તેમજ  $16 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} = 16$  પણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે. આમ, 48ને 3 વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ છે.

**ઉદાહરણ 4 :** 6400નું વર્ગમૂળ શોધો.

**ઉકેલ :** આપણે 6400 ને નીચે પ્રમાણે લખી શકીએ :

$$6400 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{5 \times 5}$$

∴  $\sqrt{6400} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 80$

**ઉદાહરણ 5 :** શું 90 એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે ?

**ઉકેલ :** આપણે 90ને નીચે પ્રમાણે દર્શાવીએ  $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$

પરંતુ, અહીં અવિભાજ્ય સંખ્યા 2 અને 5 જોડીમાં નથી. તેથી 90 એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી.

જો કે બીજી રીતે જોઈએ તો 90 માં માત્ર એક જ શૂન્ય છે. તેથી તે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા ન હોય.

**ઉદાહરણ 6 :** શું 2352 એ પૂર્ણવર્ગ છે ? જો ના તો કઈ નાનામાં નાની સંખ્યાને 2352 સાથે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ મળે ? આ મળતી નવી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.

**ઉકેલ :** અહીં,  $2352 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times 3 \times \underline{7 \times 7}$

અહીં, અવિભાજ્ય અવયવ 3 એ જોડીમાં નથી. તેથી 2352 એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી. હવે જો 3 જોડીમાં હોય તો તે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને. તેથી આપણે 2352 ને 3 વડે ગુણીએ તો મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ બને.

∴  $2352 \times 3 = \underline{2 \times 2} \times \underline{2 \times 2} \times \underline{3 \times 3} \times \underline{7 \times 7}$

હવે દરેક અવિભાજ્ય સંખ્યા જોડીમાં છે. તેથી  $2352 \times 3 = 7056$  એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે. આમ, 2352ને નાનામાં નાની સંખ્યા 3 વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ છે અને તે મળતી સંખ્યા 7056 છે.

અને,  $\sqrt{7056} = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 84$

**ઉદાહરણ 7 :** 9408ને એવી કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ભાગવાથી મળતું ભાગફળ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે ? આ ભાગફળનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.

2	256
2	128
2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
2	2
	1

2	6400
2	3200
2	1600
2	800
2	400
2	200
2	100
2	50
5	25
5	5
	1

2	90
3	45
3	15
	5

2	2352
2	1176
2	588
2	294
3	147
7	49
7	7
	1

**ઉકેલ :** અહીં,  $9408 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 7$

જો 9408ને અવયવ 3 વડે ભાગીએ તો

$9408 \div 3 = 3136 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7$  જે પૂર્ણવર્ગ છે. (કેમ ?)

માટે, અપેક્ષિત નાનામાં નાની સંખ્યા 3 છે.

અને  $\sqrt{3136} = 2 \times 2 \times 2 \times 7 = 56$

2	6,9,15
3	3,9,15
3	1,3,5
5	1,1,5
	1,1,1

**ઉદાહરણ 8 :** સંખ્યાઓ 6, 9 અને 15 થી નિ:શેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો.

**ઉકેલ :** આ ઉદાહરણને આપણે બે સોપાનમાં ઉકેલીશું. સૌપ્રથમ આપણે નાનામાં નાનો સામાન્ય અવયવી શોધીશું અને ત્યારબાદ જરૂરી પૂર્ણવર્ગ શોધીશું. 6, 9, 15થી નિ:શેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની સંખ્યા તેમનો લ.સા.અ. છે. 6, 9 અને 15નો લ.સા.અ.  $2 \times 3 \times 3 \times 5 = 90$  છે.

90ના અવિભાજ્ય અવયવો  $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$

અહીં અવિભાજ્ય અવયવો 2 અને 5 જોડીમાં નથી. તેથી 90 એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી.

પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મેળવવા માટે 90નો દરેક અવયવ જોડીમાં હોવો જરૂરી છે. તેથી આપણે 2 અને 5 ની જોડી બનાવવી પડશે. તેથી આપણે 90ને  $2 \times 5$  એટલે કે 10 વડે ગુણીશું.

તેથી અપેક્ષિત પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા  $90 \times 10 = 900$  છે.

## સ્વાધ્યાય 6.3



- નીચે આપેલ સંખ્યાઓના વર્ગમૂળમાં એકમનો અંક કયો હશે ?  
(i) 9801                      (ii) 99856                      (iii) 998001                      (iv) 657666025
- કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી કર્યા વિના જ જણાવો કે નીચેના પૈકી કઈ સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ નથી ?  
(i) 153                      (ii) 257                      (iii) 408                      (iv) 441
- પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે 100 અને 169નું વર્ગમૂળ શોધો.
- નીચે આપેલી સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે શોધો.  
(i) 729                      (ii) 400                      (iii) 1764                      (iv) 4096  
(v) 7744                      (vi) 9604                      (vii) 5929                      (viii) 9216  
(ix) 529                      (x) 8100
- નીચે આપેલી દરેક સંખ્યા માટે નાનામાં નાની એવી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોય. ઉપરાંત મળતી આ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.  
(i) 252                      (ii) 180                      (iii) 1008                      (iv) 2028  
(v) 1458                      (vi) 768
- નીચે આપેલી દરેક સંખ્યા માટે નાનામાં નાની એવી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોય. ઉપરાંત મળેલી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.  
(i) 252                      (ii) 2925                      (iii) 396                      (iv) 2645  
(v) 2800                      (vi) 1620
- એક નિશાળના ધોરણ 8ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ મળીને ₹ 2401 પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ફંડમાં ફાળો આપે છે. વર્ગમાં જેટલી સંખ્યા છે તેટલા રૂપિયા દરેક વિદ્યાર્થી દાનમાં આપે છે, તો વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી હશે ?

8. એક બગીચામાં 2025 છોડ એવી રીતે રોપેલ છે કે પ્રત્યેક હારમાં રોપેલા છોડની સંખ્યા કુલ હારની સંખ્યા બરાબર થાય. તો પ્રત્યેક હારમાં રોપેલ છોડ અને કુલ હારની સંખ્યા શોધો.
9. 4, 9 અને 10 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો.
10. 8, 15 અને 20 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો.

#### 6.5.4 ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું

જ્યારે કોઈ સંખ્યા ઘણી મોટી હોય, ત્યારે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીત ખૂબ જ લાંબી અને મુશ્કેલ બને છે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે આપણે ભાગાકારની રીત અપનાવીશું.

આ માટે આપણે નીચે આપેલ સંખ્યાના વર્ગમૂળનાં કેટલા અંકો છે તે જોઈએ. નીચેનું કોષ્ટક જુઓ :

સંખ્યા	વર્ગ	વિશેષતા
10	100	તે ત્રણ અંકોની નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે.
31	961	તે ત્રણ અંકોની મોટામાં મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે.
32	1024	તે ચાર અંકોની નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે.
99	9801	તે ચાર અંકોની મોટામાં મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે.

તેથી, આપણે સંખ્યાના વર્ગમૂળના અંકોની સંખ્યા વિશે શું કહી શકીએ જો આપેલ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 3 અથવા વર્ગ 4 અંકોથી બનતી સંખ્યા હોય ? આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 3 અથવા 4 અંકોથી બનેલી હોય તો તેના વર્ગમૂળની સંખ્યા 2 અંકોથી બનેલી હોય.

શું તમે 5 અંકો અથવા 6 અંકોવાળી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના વર્ગમૂળની સંખ્યાના અંકો વિશે કહી શકો ?

નાનામાં નાની 3 અંકોવાળી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 100 છે અને તેનું વર્ગમૂળ 10 છે. જ્યારે મોટામાં મોટી 3 અંકોવાળી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 961 છે અને તેનું વર્ગમૂળ 31 છે. નાનામાં નાની 4 અંકોવાળી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 1024 છે અને તેનું વર્ગમૂળ 32 છે જ્યારે મોટામાં મોટી 4 અંકોવાળી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 9801 છે અને તેનું વર્ગમૂળ 99 છે.

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

શું આપણે એમ કહી શકીએ કે,  $n$  અંકોવાળી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના વર્ગમૂળની સંખ્યા જો  $n$  બેકી હોય, તો  $\frac{n}{2}$  અંક મળે અને જો એકી હોય તો  $\frac{(n+1)}{2}$  અંક મળે.



કોઈ સંખ્યાના વર્ગમૂળની સંખ્યાના કેટલા અંકો મળે તેનો ઉપયોગ નીચેની પદ્ધતિમાં કરી શકાય :

- 529નું વર્ગમૂળ શોધવા માટે નીચેનાં પગલાં વિચારીએ :

શું તમે 529નું વર્ગમૂળ શોધતાં મળતી સંખ્યાના અંકો વિશે અનુમાન કરી શકો ?

**સોપાન 1** આપેલી સંખ્યાના એકમના અંકથી શરૂ કરી સંખ્યાની જોડી બનાવવા માટે તેની ઉપરની બાજુ લીટી દોરો. જો આપેલી સંખ્યાના અંકોની સંખ્યા એકી હોય તો સંખ્યાની ડાબી બાજુના છેલ્લા એક અંક પર પણ લીટી દોરો. તેથી આપણી પાસે  $\overline{5\ 29}$  મળે.

**સોપાન 2** હવે આપેલી સંખ્યાની સૌથી ડાબી બાજુ આવેલી જોડી માટે સૌથી મોટી એવી સંખ્યા શોધો કે જેનો વર્ગ આપેલ જોડી જેટલો હોય કે તેથી નાનો હોય ( $2^2 < 5 < 3^2$ ). આ સંખ્યાને ભાજક તરીકે લો અને સૌથી ડાબી બાજુ આપેલી આ જોડીને ભાજ્ય (અહીં 5) તરીકે લઈ ભાગફળ મેળવો. ભાગાકાર કરો અને શેષ મેળવો ( આ કિસ્સામાં શેષ 1 છે.)

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \overline{) 5\ 29} \\ \underline{-4} \phantom{0} \\ 1 \phantom{0} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \overline{) 529} \\ \underline{-4} \\ 129 \end{array}$$

**સોપાન 3** ત્યાર પછી આવતી જોડીને મળેલ શેષની જમણી બાજુએ નીચે ઉતારો. તેથી નવો ભાજ્ય 129 મળે છે.

**સોપાન 4** ભાજકને બમણો કરો અને તેની જમણી બાજુ ખાલી જગ્યામાં મૂકો.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \overline{) 529} \\ \underline{-4} \\ 4- \overline{) 129} \end{array}$$

**સોપાન 5** હવે ખાલીજગ્યામાં એવો મોટામાં મોટો અંક પસંદ કરો કે, જે ભાગફળનો નવો અંક બને અને તેના નવા ભાજક સાથેનો ગુણાકાર ભાજ્ય કરતાં નાનો અથવા ભાજ્ય જેટલો થાય. આ કિસ્સામાં  $42 \times 2 = 84$  અને  $43 \times 3 = 129$ . તેથી આપણે નવી સંખ્યા 3 પસંદ કરીશું.

$$\begin{array}{r} 23 \\ 2 \overline{) 529} \\ \underline{-4} \\ 43 \overline{) 129} \\ \underline{129} \\ 0 \end{array}$$

**સોપાન 6** અહીં શેષ શૂન્ય મળે છે અને આપેલ સંખ્યામાં કોઈ અંકો પણ બાકી રહેતા નથી. તેથી,  $\sqrt{529} = 23$

● હવે સંખ્યા  $\sqrt{4096}$  ના વર્ગમૂળ માટે વિચારો.

$$\begin{array}{r} 6 \\ 6 \overline{) 4096} \\ \underline{-36} \\ 4 \end{array}$$

**સોપાન 1** એકમના અંકથી શરૂ કરી જોડીઓ બનાવવા માટે લીટીઓ દોરો, (અહીં  $\overline{4096}$ ).

**સોપાન 2** આપેલી સંખ્યામાં સૌથી ડાબી બાજુ આપેલ જોડી માટે એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેનો વર્ગ આપેલ જોડી જેટલો અથવા નાનો હોય (અહીં  $6^2 < 40 < 7^2$ ). આ નંબરને ભાજક તરીકે લો અને સૌથી ડાબી બાજુ આવેલ જોડીની સંખ્યાને ભાજ્ય તરીકે લો. ભાગાકાર કરો અને શેષ મેળવો. અહીં આ કિસ્સામાં શેષ 4 છે.

$$\begin{array}{r} 6 \\ 6 \overline{) 4096} \\ \underline{-36} \\ 496 \end{array}$$

**સોપાન 3** હવે બીજી જોડીને નીચે ઉતારો (અહીં બીજી જોડી 96 છે). જેને શેષની બાજુમાં જોડતાં ભાજ્ય સંખ્યા 496 બને.

$$\begin{array}{r} 6 \\ 6 \overline{) 4096} \\ \underline{-36} \\ 12- \overline{) 496} \end{array}$$

**સોપાન 4** ભાજકને બમણા કરો અને તેની જમણી બાજુ ખાલી જગ્યા મૂકો.

**સોપાન 5** હવે ખાલીજગ્યામાં એવો મોટામાં મોટો અંક પસંદ કરો, કે જે નવી ભાગફળનો નવો અંક બને અને તેનો નવા ભાજક સાથેનો ગુણાકાર ભાજ્ય કરતાં નાનો અથવા ભાજ્ય જેટલો થાય. આ કિસ્સામાં  $124 \times 4 = 496$  તેથી આપણને ભાગફળમાં નવી સંખ્યા 4 મળે છે અને શેષ મેળવો.

$$\begin{array}{r} 64 \\ 6 \overline{) 4096} \\ \underline{-36} \\ 124 \overline{) 496} \\ \underline{-496} \\ 0 \end{array}$$

**સોપાન 6** અહીં શેષ શૂન્ય મળે છે અને કોઈ જોડી બાકી રહેતી નથી.  $\therefore \sqrt{4096} = 64$

**સંખ્યાનું અનુમાન કરવું**

આપણે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓમાં બનાવેલ જોડીઓની મદદથી તેના વર્ગમૂળની સંખ્યાનો અંક શોધીશું.

$$\sqrt{529} = 23 \quad \text{અને} \quad \sqrt{4096} = 64$$

આ બંને સંખ્યાઓ 529 અને 4096માં બે-બે જોડીઓ છે તેમજ બંને સંખ્યાઓના વર્ગમૂળ તરીકે આવતી સંખ્યાના અંકો પણ બે છે. શું તમે 14400 સંખ્યાના વર્ગમૂળ તરીકે જે સંખ્યા આવશે તેના અંકોની સંખ્યા કહી શકો ?

સંખ્યા  $\overline{14400}$  માં જોડીઓ ત્રણ છે. જેથી તેના વર્ગમૂળ તરીકે જે સંખ્યા આવશે તેના અંકો પણ ત્રણ જ હશે.



### પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલી સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ શોધ્યા વિના જણાવો કે, મળતા વર્ગમૂળના અંકોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

- (i) 25600                      (ii) 100000000                      (iii) 36864

**ઉદાહરણ 9 :** વર્ગમૂળ શોધો : (i) 729    (ii) 1296

**ઉકેલ :**

$$(i) \begin{array}{r} 27 \\ 2 \overline{) 729} \\ \underline{-4} \phantom{00} \\ 47 \phantom{0} \phantom{0} \\ \underline{329} \phantom{0} \\ 329 \phantom{0} \\ \underline{0} \phantom{0} \phantom{0} \end{array} \quad \sqrt{729} = 27$$

$$(ii) \begin{array}{r} 36 \\ 3 \overline{) 1296} \\ \underline{-9} \phantom{00} \\ 66 \phantom{0} \phantom{0} \\ \underline{396} \phantom{0} \\ 396 \phantom{0} \\ \underline{0} \phantom{0} \phantom{0} \end{array} \quad \sqrt{1296} = 36$$

**ઉદાહરણ 10 :** એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 5607માંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોય. ઉપરાંત મળતી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.

**ઉકેલ :** ચાલો, 5607નું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધીએ. આપણને શેષ 131 મળે છે. જે દર્શાવે છે કે  $74^2$  એ 5607 થી 131 નાનો છે. અર્થાત્ જો આપણે 131ને 5607માંથી બાદ કરીએ તો મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોય.

આમ, નવી મળતી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા  $5607 - 131 = 5476$  છે અને  $\sqrt{5476} = 74$

**ઉદાહરણ 11 :** 4 અંકોવાળી મોટામાં મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો.

**ઉકેલ :** 4 અંકોવાળી મોટામાં મોટી સંખ્યા 9999 છે. સૌ પ્રથમ આપણે  $\sqrt{9999}$  ભાગાકારની રીતે શોધવા પ્રયત્ન કરીએ. અહીં શેષ 198 મળે છે. જે દર્શાવે છે કે  $99^2$  એ 9999 કરતાં 198 નાનો છે.

અર્થાત્ 9999માંથી શેષ 198 બાદ કરતાં આપણને પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે. આમ,  $9999 - 198 = 9801$  એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે.

ઉપરાંત  $\sqrt{9801} = 99$

તેથી 4 અંકોવાળી મોટામાં મોટી સંખ્યા 9801 છે અને તેનું વર્ગમૂળ 99 છે.

**ઉદાહરણ 12 :** એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 1300માં ઉમેરતાં મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોય. ઉપરાંત આ નવી મળતી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.

**ઉકેલ :** સૌ પ્રથમ આપણે 1300નું વર્ગમૂળ ભાગાકારની રીતે શોધવા પ્રયત્ન કરીએ. આમ, આ રીતે વર્ગમૂળ શોધતાં શેષ 4 મળે છે. આ બતાવે છે  $36^2 < 1300$

તેથી 1300 પછીની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા  $37^2 = 1369$  છે.

તેથી આપણે કહી શકીએ કે  $37^2 - 1300 = 1369 - 1300 = 69$ .

### 6.6 દશાંશ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ

વિચારો કે  $\sqrt{17.64}$  શું મળે ?

**સોપાન 1** દશાંશ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ શોધવા માટે આપણે પૂર્ણાંક ભાગમાં ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવા જેમ જોડીઓ બનાવવા લીટી કરીએ છીએ તેમ જ કરીશું. (અહીં, 17) અને દશાંશ ભાગમાં જોડીઓ બનાવવા માટે દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુથી જ લીટીઓ કરી જોડીઓ બનાવીશું. (અહીં 64) અને આગળ જોડીઓ બનાવવા લીટી દોરીશું.



$$\begin{array}{r} 74 \\ 7 \overline{) 5607} \\ \underline{-49} \phantom{00} \\ 144 \phantom{0} \phantom{0} \\ \underline{707} \phantom{0} \\ -576 \phantom{0} \\ \hline 131 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 99 \\ 9 \overline{) 9999} \\ \underline{-81} \phantom{00} \\ 189 \phantom{0} \phantom{0} \\ \underline{1899} \phantom{0} \\ -1701 \phantom{0} \\ \hline 198 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ 3 \overline{) 1300} \\ \underline{-9} \phantom{00} \\ 66 \phantom{0} \phantom{0} \\ \underline{400} \phantom{0} \\ -396 \phantom{0} \\ \hline 4 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 4 \\ 4 \overline{) 17.64} \\ \underline{-16} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 4 \overline{) 17.64} \\ \underline{-16} \\ 8- \\ \underline{164} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \\ 4 \overline{) 17.64} \\ \underline{-16} \\ 82 \\ \underline{164} \end{array}$$

**સોપાન 2** હવે આપણે ભાગાકારની રીતે જ આગળ વધીશું. ડાબી બાજુની સૌ પ્રથમ સંખ્યા 17 અને  $4^2 < 17 < 5^2$ . આથી 4 ને ભાજક તરીકે અને ડાબી બાજુની સૌ પ્રથમ જોડી 17 ને ભાજ્ય તરીકે લેવામાં આવે છે. ભાગાકાર કરો અને શેષ મેળવો.

**સોપાન 3** શેષ 1 વધે છે. હવે પછીથી આવતી જોડીની સંખ્યાને શેષ 1ની બાજુમાં લખો. અહીં શેષ 1 અને પછીની જોડીની સંખ્યા 64 છે. તેથી આપણને સંખ્યા 164 મળે.

**સોપાન 4** ભાજકને બમણું કરો. ઉપરાંત 64 એ દશાંશ વિભાગમાં આવેલ છે તેથી ભાગફળમાં દશાંશ ચિહ્ન મૂકો.

**સોપાન 5** આપણે જાણીએ છીએ કે,  $82 \times 2 = 164$  તેથી નવો અંક 2 છે. ભાગાકાર કરો અને શેષ મેળવો.

**સોપાન 6** અહીં શેષ શૂન્ય મળે છે અને હવે કોઈ જોડીઓ બાકી રહેતી નથી. તેથી  $\sqrt{17.64} = 4.2$

$$\begin{array}{r} 4.2 \\ 4 \overline{) 17.64} \\ \underline{-16} \\ 82 \\ \underline{-164} \\ 0 \end{array}$$

**ઉદાહરણ 13 :** 12.25નું વર્ગમૂળ શોધો.

**ઉકેલ :**

$$\begin{array}{r} 3.5 \\ 3 \overline{) 12.25} \\ \underline{-9} \\ 65 \\ \underline{-325} \\ 0 \end{array} \quad \therefore \sqrt{12.25} = 3.5$$

**આગળ કઈ રીતે વધીશું ?**

સંખ્યા 176.341 માટે વિચારો. પૂર્ણાંક ભાગ અને દશાંશ ભાગમાં જોડીઓ બનાવવા લીટીઓ મૂકો. શું પૂર્ણાંક ભાગ અને દશાંશ ભાગમાં જોડીઓ બનાવવા લીટીઓ મૂકવાની રીત જુદી-જુદી છે ? વિચારો. અહીં તમે જોયું હશે કે પૂર્ણાંક ભાગ 176માં જોડીઓ બનાવવા માટે એકમના સ્થાનથી શરૂ કરી જોડીઓ માટે લીટીઓ દોરવામાં આવે છે અને ત્યાર બાદ ડાબી તરફ આગળ વધવામાં આવે છે. પ્રથમ લીટી 76 પર અને બીજી લીટી 1 પર કરવામાં આવે છે, પરંતુ .341 માટે એટલે કે દશાંશ ભાગમાં આપણે લીટીઓ દોરવાની શરૂઆત દશાંશ ચિહ્ન પછી તરત જ જમણી તરફથી કરીશું અને આગળ વધીશું. તેથી પ્રથમ લીટી 34 પર અને બીજી જોડી માટે આપણે 1 પછી 0 મૂકી અને લીટી દોરીશું. તેથી  $\overline{.3410}$  સંખ્યા મળે.

**ઉદાહરણ 14 :** એક ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ 2304 મીટર<sup>2</sup> છે. તો આ ચોરસ પ્લોટની બાજુનું માપ શોધો.

**ઉકેલ :** ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ = 2304 મીટર<sup>2</sup>

તેથી ચોરસ પ્લોટની બાજુ =  $\sqrt{2304}$  મીટર

પરંતુ  $\sqrt{2304} = 48$

આમ, 2304 મીટર<sup>2</sup> ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં ચોરસ પ્લોટની બાજુનું માપ 48 મીટર હોય.

**ઉદાહરણ 15 :** એક નિશાળમાં કુલ 2401 વિદ્યાર્થીઓ છે. આ નિશાળના વ્યાયામ શિક્ષક તમામ વિદ્યાર્થીઓને એવી રીતે હાર અને સ્તંભમાં ઊભા રાખવા માંગે છે કે, હાર અને સ્તંભોની સંખ્યા સમાન હોય. તો હારની સંખ્યા શોધો.

$$\begin{array}{r} 48 \\ 4 \overline{) 2304} \\ \underline{-16} \\ 88 \\ \underline{704} \\ 704 \\ \underline{0} \end{array}$$

**ઉકેલ :** ધારો કે હારની સંખ્યા  $x$  છે. તેથી સ્તંભની સંખ્યા પણ  $x$  મળે. તેથી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા  $= x \times x = x^2$  તેથી  $x^2 = 2401$   
હવે 2401નું વર્ગમૂળ શોધતાં 49 મળે છે.

આમ,  $x = 49$

તેથી હારની સંખ્યા 49 મળે.

	49
4	$\overline{2401}$
	-16
89	801
	801
	0

### 6.7 વર્ગમૂળનું અનુમાન કરવું

નીચેની પરિસ્થિતિઓનો વિચાર કરો :

- દેવેશી પાસે 125 સેમી<sup>2</sup> ક્ષેત્રફળ ધરાવતો એક કાપડનો ચોરસ ટુકડો છે. તેણી તેમાંથી 15 સેમી બાજુવાળા હાથ રૂમાલ બનાવવા માંગે છે. જો તે શક્ય ન હોય તો તે એ જાણવા માંગે છે કે વધુમાં વધુ કેટલી લંબાઈવાળો હાથરૂમાલ આ ટુકડામાંથી બનાવી શકાય ?
- મીના અને શોભા રમત રમે છે. એક સંખ્યા બોલે છે અને બીજી તેમનું વર્ગમૂળ કહે છે. મીનાએ સંખ્યા 25 કહી તો શોભાએ ઝડપથી તેનું વર્ગમૂળ 5 એમ જવાબ આપ્યો. પછી શોભાએ 81 કહ્યા તો મીનાએ ઝડપથી 9 એમ જવાબ આપ્યો. આ પ્રમાણે રમત આગળ ચાલતી હતી. એકવાર મીનાએ 250 સંખ્યા કહી અને શોભા તેનો જવાબ આપી શકી નહિ. તો મીનાએ શોભાને કહ્યું કે તે એવી સંખ્યા બતાવે કે જેનો વર્ગ 250ની સૌથી નજીક હોય.

આવા કિસ્સાઓમાં આપણે વર્ગમૂળ સંખ્યાઓનાં અનુમાન કરવાના હોય છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે,  $100 < 250 < 400$  અને  $\sqrt{100} = 10$ ,  $\sqrt{400} = 20$

$$\text{તેથી } 10 < \sqrt{250} < 20$$

છતાં હજુ આપણે 250 સંખ્યાની સૌથી વધુ નજીક હોય તેવી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી.

પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે,  $15^2 = 225$  અને  $16^2 = 256$

આમ,  $15 < \sqrt{250} < 16$  અને 256 એ 225 કરતાં 250ની વધુ નજીક છે.

તેથી  $\sqrt{250}$  એ લગભગ 16 છે.

### પ્રયત્ન કરો

નીચેની સંખ્યાઓના વર્ગમૂળની સૌથી નજીકની પૂર્ણ સંખ્યા તરીકે શું મળે તેની ગણતરી કરો :

- (i)  $\sqrt{80}$                       (ii)  $\sqrt{1000}$                       (iii)  $\sqrt{350}$                       (iv)  $\sqrt{500}$



## સ્વાધ્યાય 6.4

1. નીચે આપેલી સંખ્યાઓનું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો :

- (i) 2304                      (ii) 4489                      (iii) 3481                      (iv) 529  
(v) 3249                      (vi) 1369                      (vii) 5776                      (viii) 7921  
(ix) 576                      (x) 1024                      (xi) 3136                      (xii) 900

2. નીચે આપેલી સંખ્યાના વર્ગમૂળ તરીકે આવતી સંખ્યામાં કેટલા અંકો હશે તે જણાવો (કોઈ ગણતરી કર્યા વગર જણાવો.)

- (i) 64                      (ii) 144                      (iii) 4489                      (iv) 27225  
(v) 390625



3. નીચે આપેલ દશાંશ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ શોધો :  
 (i) 2.56                      (ii) 7.29                      (iii) 51.84                      (iv) 42.25  
 (v) 31.36
4. નીચે આપેલી સંખ્યાઓ માટે એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેની આપેલ સંખ્યામાંથી બાદબાકી કરતાં મળતી નવી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોય. ઉપરાંત આ નવી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.  
 (i) 402                      (ii) 1989                      (iii) 3250  
 (iv) 825                      (v) 4000
5. નીચે આપેલી સંખ્યાઓ માટે એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેનો સરવાળો આપેલ સંખ્યા સાથે કરવાથી મળતી નવી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોય. ઉપરાંત આ નવી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો :  
 (i) 525                      (ii) 1750                      (iii) 252                      (iv) 1825  
 (v) 6412
6. 441 મીટર<sup>2</sup> ક્ષેત્રફળ વાળા ચોરસની બાજુનું માપ શોધો.
7. કાટકોણ ત્રિકોણ ABC માં,  $\angle B = 90^\circ$  છે.  
 (i) જો  $AB = 6$  સેમી,  $BC = 8$  સેમી, તો AC શોધો.  
 (ii) જો  $AC = 13$  સેમી,  $BC = 5$  સેમી, તો AB શોધો.
8. એક માળી પાસે 1000 છોડ છે. તે આ છોડને એવી રીતે રોપવા માગે છે કે બગીચામાં હાર અને સ્તંભોની સંખ્યા સમાન મળે, તો માળીને તેના માટે હજુ ઓછામાં ઓછા કેટલા છોડ વધુ જોઈએ ?
9. એક નિશાળમાં 500 વિદ્યાર્થીઓ છે. પી.ટી.ની ક્વાયત કરવા માટે તમામ વિદ્યાર્થીઓને એવી રીતે ઊભા રાખ્યા છે કે જેથી હાર અને સ્તંભોની સંખ્યા સમાન રહે. તો નિશાળના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ ગોઠવણી કરવાથી બહાર રહેશે ?

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. જો કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા  $m$ ને  $n^2$  વડે દર્શાવી શકાય અને  $n$  પણ એક પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, તો સંખ્યા  $m$  એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે.
2. બધી જ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓના એકમનો અંક 0, 1, 4, 5, 6 અથવા 9 હોય.
3. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યામાં છેલ્લે આવેલાં શૂન્યો હંમેશાં બેકી સંખ્યામાં જ હોય.
4. વર્ગ અને વર્ગમૂળ પ્રક્રિયા એકબીજાની વ્યસ્ત છે.
5. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના વર્ગમૂળ બે હોય છે.  
 ધન વર્ગમૂળને “ $\sqrt{\quad}$ ” વડે દર્શાવાય છે.  
 જેમ કે  $3^2 = 9$  એટલે  $\sqrt{9} = 3$ .



# ઘન અને ઘનમૂળ

પ્રકરણ

7

## 7.1 પ્રાસ્તાવિક

ભારતના મહાન અને મેઘાવી ગણિતશાસ્ત્રી એસ. રામાનુજન વિશે એક રસપ્રદ વાર્તા પ્રચલિત છે. એકવાર એક બીજા પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રી પ્રોફેસર જી. એચ. હાર્ડી, એસ. રામાનુજનને મળવા આવેલ હતા. તે જે વાહનમાં (ટેક્સી) આવેલ તે વાહન પર 1729 અંક લખેલ હતો. બંને ગણિતશાસ્ત્રી જ્યારે ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે વાત વાતમાં પ્રોફેસર હાર્ડીએ 1729 અંકને ‘ડલ અંક’ (A Dull Number) તરીકે રજૂ કર્યો. એસ. રામાનુજને પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે 1729 એક ખરેખર રસપ્રદ અંક છે. તેમણે નીચે મુજબ ગણતરી કરી જણાવ્યું કે 1729 એક એવો સૌથી નાનામાં નાનો અંક છે કે, જેને જુદી જુદી બે સંખ્યાના ઘનના સરવાળા તરીકે બે રીતે રજૂ કરી શકાય. તેમણે નીચે મુજબ રજૂઆત કરી બતાવી.

$$1729 = 1728 + 1 = 12^3 + 1^3$$

$$1729 = 1000 + 729 = 10^3 + 9^3$$

ત્યારથી 1729 એ હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા તરીકે હાલ પણ પ્રચલિત છે. જો કે અંક 1729 ની આ ખાસિયત તો રામાનુજનના સમય પહેલાં 300 થી પણ વધારે વર્ષોથી જાણીતી હતી.

તમને કદાચ પ્રશ્ન થશે કે એસ. રામાનુજનને આ ખબર કેમ પડી ? તેનો જવાબ એ છે કે એસ. રામાનુજનને અંકો બહુ જ ગમતા હતા. તેઓએ પોતાના જીવનમાં અંકો સાથે ઘણા બધા પ્રયોગો કર્યા. તેમણે એવા ઘણા અંકો શોધી કાઢ્યા કે તેને કોઈ બે જુદી જુદી સંખ્યાના વર્ગના સરવાળા સ્વરૂપે રજૂ કરી શકાય અને સાથે સાથે તેને બે જુદી જુદી સંખ્યાના ઘનના સરવાળા સ્વરૂપે રજૂ કરી શકાય.



અહીં ઘન માટે ઘણી રસપ્રદ પેટર્ન છે. ચાલો આપણે ઘન અને ઘનમૂળ તેમજ તેની સાથે જ જોડાયેલ બીજી રસપ્રદ જાણકારી મેળવીએ.

## 7.2 ઘન

આપણે જાણીએ છીએ કે ‘ઘન’ શબ્દનો ઉપયોગ ભૂમિતિમાં થાય છે. ઘન એ એવી નક્કર આકૃતિ છે કે, જેની તમામ બાજુઓનાં માપ સમાન હોય છે. 1 સેમી બાજુવાળા કેટલા ઘનની મદદથી 2 સેમી બાજુવાળો એક ઘન બને ? 1 સેમી બાજુવાળા કેટલા ઘનની મદદથી 3 સેમી બાજુવાળો એક ઘન બને ? 1, 8, 27, ... સંખ્યાઓ માટે વિચારો.

આવી સંખ્યાઓને ‘પૂર્ણઘન કે ઘન સંખ્યા’ (Perfect Cubes or Cube Numbers) કહે છે. તમે કહી શકો કે તેનું નામ ઘન સંખ્યા કેમ છે ? કેમ કે તે એક જ પ્રકારની સંખ્યાને પોતાની જ સાથે ત્રણ વાર ગુણવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

**હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા**  
1729 એ નાનામાં નાની હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા છે. આવી ઘણી બધી સંખ્યાઓ હોય છે. જેમ કે 4104 (2, 16; 9, 15) 13832 (18, 20; 2, 24), કૌંસમાં આપેલ સંખ્યાનો ઉપયોગ કરી ચકાસો.



જે આકૃતિને ત્રણ-પરિમાણ હોય તેવી આકૃતિને ઘન આકૃતિ કહે છે.

આપણે નોંધીએ કે  $1 = 1 \times 1 \times 1 = 1^3$ ;  $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$ ;  $27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$ . અહીં,  $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$  તેથી આપણે કહી શકીએ કે 125 એ એક ઘન સંખ્યા છે.

શું 9 એ ઘન સંખ્યા છે ? ના, કેમ કે  $9 = 3 \times 3$  અને એવી કોઈ બીજી પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી કે જેને પોતાની જ સાથે ત્રણ વાર ગુણવાથી સંખ્યા 9 આવે. આ ઉપરાંત આપણે જાણીએ છીએ કે  $2 \times 2 \times 2 = 8$  અને  $3 \times 3 \times 3 = 27$ . તેથી કહી શકાય કે 9 એ ઘન સંખ્યા નથી. નીચેના કોષ્ટક-1માં 1 થી 10 સંખ્યાના ઘન આપેલ છે.

કોષ્ટક-1

સંખ્યા	ઘન
1	$1^3 = 1$
2	$2^3 = 8$
3	$3^3 = 27$
4	$4^3 = 64$
5	$5^3 = \dots\dots\dots$
6	$6^3 = \dots\dots\dots$
7	$7^3 = \dots\dots\dots$
8	$8^3 = \dots\dots\dots$
9	$9^3 = \dots\dots\dots$
10	$10^3 = \dots\dots\dots$

729, 1000, 1728  
પણ પૂર્ણઘન છે.

પૂર્ણ કરો.

1 થી 1000 સુધીની સંખ્યાઓમાં ફક્ત દસ સંખ્યાઓ જ એવી છે કે જે પૂર્ણઘન સંખ્યા છે. (તમે જાતે ચકાસણી કરો). 1 થી 100 સુધીની સંખ્યાઓમાં કેટલી સંખ્યાઓ એવી છે કે જે પૂર્ણઘન સંખ્યા છે ? બેકી સંખ્યાઓના ઘનનું નિરીક્ષણ કરો. શું તે બેકી સંખ્યા જ છે ? એકી સંખ્યાઓના ઘન વિશે તમે શું કહી શકો છો ?

નીચે કોષ્ટક-2માં 11 થી 20 સંખ્યાઓના ઘન આપેલ છે.

કોષ્ટક-2

સંખ્યાઓ	ઘન
11	1331
12	1728
13	2197
14	2744
15	3375
16	4096
17	4913
18	5832
19	6859
20	8000

અમે બેકી, તેથી  
અમારા ઘન પણ  
બેકી

અમે એકી, તેથી  
અમારા ઘન પણ  
એકી





2	216
2	108
2	54
3	27
3	9
3	3
1	1

ખાસ નોંધો કે દરેક અવિભાજ્ય અવયવ ઘનના અવયવીકરણ વખતે ત્રણ વાર આવે છે.

કોઈ પણ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણ વખતે જો દરેક અવયવ ત્રણ વાર આવે તો શું તે સંખ્યા પૂર્ણઘન હોય ? વિચારો શું 216 પૂર્ણઘન છે ?

અહીં,  $216 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$

દરેક અવયવ ત્રણ વાર આવે છે  $216 = 2^3 \times 3^3 = (2 \times 3)^3 = 6^3$  તે પૂર્ણઘન છે.

શું તમને યાદ છે કે,  
 $a^m \times b^m = (a \times b)^m$

અવયવોના ત્રણનાં જોડકાં બનાવી શકાય.

શું 729 પૂર્ણઘન છે ? અહીં  $729 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$

હા, 729 એ પૂર્ણઘન છે.

ચાલો 500 માટે ચકાસણી કરીએ.

500ના અવિભાજ્ય અવયવો  $2 \times 2 \times \underline{5 \times 5 \times 5}$  છે.

તેથી 500 પૂર્ણઘન નથી.

**ઉદાહરણ 1 :** શું 243 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે ?

**ઉકેલ :** આપણે જાણીએ છીએ કે  $243 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times 3 \times 3$

તેથી 243 પૂર્ણઘન નથી. કેમ કે અવયવ 3 ત્રણ વાર આવે છે, પરંતુ બીજી વાર અવયવ 3 માત્ર બે જ વાર છે.

અવયવ 5 ત્રણ વાર આવે છે. પણ અવયવ 2 બે જ વાર આવે.



### પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલી સંખ્યામાંથી કઈ સંખ્યા પૂર્ણઘન છે ?

- |         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
| 1. 400  | 2. 3375 | 3. 8000 | 4. 15625 |
| 5. 9000 | 6. 6859 | 7. 2025 | 8. 10648 |

### 7.2.2 નાનામાં નાનો ગુણક કે જેથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા મળે

રાજે પ્લાસ્ટિકનો એક લંબઘન બનાવ્યો જેની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ અનુક્રમે 15 સેમી, 30 સેમી, 15 સેમી છે.

અનુએ રાજને પ્રશ્ન કર્યો કે આવા કેટલા લંબઘન સાથે મળે તો મળતો ઘન પૂર્ણઘન હોય ? શું રાજ તે તું કહી શકે ?

રાજે કહ્યું કે આપેલ લંબઘનનું ઘનફળ  $15 \times 30 \times 15 = 3 \times 5 \times 2 \times 3 \times 5 \times 3 \times 5 = 2 \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{5 \times 5 \times 5}$

અહીંયા મળેલ અવિભાજ્ય અવયવોમાં 2 માત્ર એક જ વાર આવે છે. તેથી આપણે તે ત્રણ વાર આવે તે માટે  $2 \times 2$  વડે ગુણવા જોઈએ. તેથી આવા 4 લંબઘન એકસાથે રાખવાથી મળતો ઘન એ પૂર્ણઘન હશે.

**ઉદાહરણ 2 :** શું 392 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે ? જો ના, તો એવી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા શોધો કે જેને 392 સાથે ગુણવાથી મળતી નવી સંખ્યા પૂર્ણઘન હોય.

**ઉકેલ :**  $392 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times 7 \times 7$

અહીં અવિભાજ્ય અવયવ 7 એ ત્રણ વાર આવતો નથી. તેથી 392 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા નથી. તેને પૂર્ણઘન બનાવવા માટે હજુ એક વાર 7 જોઈએ. તેથી આ કિસ્સામાં

$392 \times 7 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{7 \times 7 \times 7} = 2744$  મળે, જે પૂર્ણઘન સંખ્યા છે.

તેથી 7 એ એવી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે કે જેને 392 સાથે ગુણવાથી મળતી નવી સંખ્યા 2744 પૂર્ણઘન સંખ્યા મળે.

**ઉદાહરણ 3 :** શું 53240 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે ? જો ના, તો એવી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા શોધો કે, જેનાથી 53240ને ભાગવાથી મળતું ભાગફળ પૂર્ણઘન હોય.

**ઉકેલ :** અહીં  $53240 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{11 \times 11 \times 11} \times 5$

આ અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં અવયવ 5 ત્રણ વાર આવતો નથી. તેથી કહી શકાય કે 53240 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા નથી. અવયવ 5 એ માત્ર એક જ વાર આવે છે. તેથી જો આપણે આપેલ સંખ્યાને 5 વડે ભાગીએ તો મળતું ભાગફળ પૂર્ણઘન સંખ્યા હોય.

તેથી  $53240 \div 5 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{11 \times 11 \times 11}$

તેથી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 5 એવી સંખ્યા છે કે જેના વડે 53240ને ભાગવાથી મળતી સંખ્યા 10648 એ પૂર્ણઘન હોય.

**ઉદાહરણ 4 :** શું 1188 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે ? જો ના, તો એવી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા શોધો, કે જેનાથી 1188ને ભાગવાથી મળતું ભાગફળ પૂર્ણઘન હોય.

**ઉકેલ :** અહીં  $1188 = 2 \times 2 \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times 11$

આ અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં અવયવ 2 અને અવયવ 11 ત્રણ વાર આવતા નથી. તેથી સંખ્યા 1188 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા નથી. અહીં 1188ના અવયવીકરણમાં અવયવ 2 માત્ર બે જ વાર અને અવયવ 11 માત્ર એક જ વાર આવે છે. તેથી જો 1188ને  $2 \times 2 \times 11 = 44$  વડે ભાગતાં મળતા ભાગફળના અવિભાજ્ય અવયવ 2 અને 11 નહીં હોય.

આમ, નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા કે જેના વડે 1188 ને ભાગતાં પૂર્ણઘન મળે તે 44 છે અને પરિણામે મળતી પૂર્ણઘન સંખ્યા  $1188 \div 44 = 27 (=3^3)$  છે.

**ઉદાહરણ 5 :** શું 68600 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે ? જો ના, તો એવી નાનામાં નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા શોધો કે, જેનાથી 68600 ને ગુણવાથી મળતી નવી સંખ્યા પૂર્ણઘન હોય.

**ઉકેલ :** અહીં  $68600 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7$ .

અહીં અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં અવયવ 5 એ ત્રણ વાર આવતો નથી. તેથી 68600 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા નથી. તેને પૂર્ણઘન બનાવવા માટે આપણે તેને 5 વડે ગુણીશું.

$68600 \times 5 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7$   
 $= 343000$  જે પૂર્ણઘન સંખ્યા છે.

અહીં નોંધીએ કે 343 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે. ઉદાહરણ 5 પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે 343000 પણ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે.

**વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો**

નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા પૂર્ણઘન સંખ્યા છે ?

(i) 2700 (ii) 16000 (iii) 64000 (iv) 900 (v) 125000 (vi) 36000 (vii) 21600  
 (viii) 10000 (ix) 27000000 (x) 1000

તમે આ પૂર્ણઘન સંખ્યાઓમાં કઈ પેટર્નનું નિરીક્ષણ કર્યું ?





## સ્વાધ્યાય 7.1

- નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા પૂર્ણઘન નથી ?  
(i) 216      (ii) 128      (iii) 1000      (iv) 100      (v) 46656
- એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેથી તેને નીચે આપેલ સંખ્યા સાથે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન હોય.  
(i) 243      (ii) 256      (iii) 72      (iv) 675      (v) 100
- એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેના વડે નીચે આપેલ સંખ્યાને ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન હોય.  
(i) 81      (ii) 128      (iii) 135      (iv) 192      (v) 704
- પરિક્ષિતે 5 સેમી, 2 સેમી, 5 સેમી માપ લઈ એક પ્લાસ્ટિકનો લંબઘન બનાવ્યો છે. તો આવા કેટલા લંબઘન સાથે રાખવાથી મળતો ઘન એ પૂર્ણઘન હોય ?

### 7.3 ઘનમૂળ

જો એક ઘનનું ઘનફળ 125 સેમી<sup>3</sup> હોય તો, આપણે તેની બાજુની લંબાઈ વિશે શું કહી શકીએ ? આ ઘનની બાજુની લંબાઈ જાણવા માટે આપણે એવી સંખ્યાની જરૂર પડે કે જે સંખ્યાનો ઘન 125 હોય.

જેવી રીતે વર્ગમૂળ શોધવું એ વર્ગ કરવાની પ્રક્રિયાની વ્યસ્ત પ્રક્રિયા છે, તેવી જ રીતે ઘનમૂળ શોધવાની ક્રિયા પણ ઘન કરવાની ક્રિયાની વ્યસ્ત પ્રક્રિયા છે.

આપણે જાણીએ છીએ  $2^3 = 8$ . તેથી 8નું ઘનમૂળ 2 છે.

સંકેતમાં તેને  $\sqrt[3]{8} = 2$ થી દર્શાવાય. ‘ $\sqrt[3]{}$ ’ ઘનમૂળનો સંકેત દર્શાવે છે.

નીચેના કોષ્ટક માટે વિચારો.

વિધાન	અનુમાન	વિધાન	અનુમાન
$1^3 = 1$	$\sqrt[3]{1} = 1$	$6^3 = 216$	$\sqrt[3]{216} = 6$
$2^3 = 8$	$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$	$7^3 = 343$	$\sqrt[3]{343} = 7$
$3^3 = 27$	$\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$	$8^3 = 512$	$\sqrt[3]{512} = 8$
$4^3 = 64$	$\sqrt[3]{64} = 4$	$9^3 = 729$	$\sqrt[3]{729} = 9$
$5^3 = 125$	$\sqrt[3]{125} = 5$	$10^3 = 1000$	$\sqrt[3]{1000} = 10$

#### 7.3.1 અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે ઘનમૂળ

સંખ્યા 3375 માટે વિચારો, આપણે તેનું ઘનમૂળ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે શોધીશું.

$$\text{અહીં } 3375 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{5 \times 5 \times 5} = 3^3 \times 5^3 = (3 \times 5)^3$$

$$\text{તેથી } 3375 \text{ નું ઘનમૂળ} = \sqrt[3]{3375} = 3 \times 5 = 15$$

તેવી જ રીતે  $\sqrt[3]{74088}$ નું ઘનમૂળ મેળવવા માટે

$$74088 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{7 \times 7 \times 7} = 2^3 \times 3^3 \times 7^3 = (2 \times 3 \times 7)^3$$

$$\text{આમ, } \sqrt[3]{74088} = 2 \times 3 \times 7 = 42$$



**ઉદાહરણ 6 :** 8000 નું ઘનમૂળ શોધો.

**ઉકેલ :** અહીં 8000 ના અવિભાજ્ય અવયવો  $\underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{5 \times 5 \times 5}$  છે.

તેથી  $\sqrt[3]{8000} = 2 \times 2 \times 5 = 20$

**ઉદાહરણ 7 :** 13824 નું ઘનમૂળ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે શોધો.

**ઉકેલ :** અહીં,

$$13824 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3} = 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 3^3$$

તેથી,  $\sqrt[3]{13824} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા  $m$  માટે,  $m^2 < m^3$  ? આ વિધાન ખરું છે કે ખોટું તે કહો.



### 7.3.2 ઘન સંખ્યાનું ઘનમૂળ

જો તમને ખબર હોય કે આપેલ સંખ્યા પૂર્ણઘન છે, તો નીચે આપેલ પદ્ધતિથી આપણે ઘનમૂળ શોધી શકીએ.

**સોપાન 1** કોઈ એક પૂર્ણઘન સંખ્યા 857375 માટે, જમણી બાજુથી ત્રણ-ત્રણ સંખ્યા લઈને નીચે મુજબ જૂથ બનાવીશું.

$$\begin{array}{ccc} \underline{857} & & \underline{375} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{બીજું જૂથ} & & \text{પ્રથમ જૂથ} \end{array}$$

હવે આપણે આપેલ ઘન સંખ્યાનું ઘનમૂળ નીચે આપેલ ક્રમિક પગલાં મુજબ મેળવીશું.

આપણને 375 અને 857 એવાં બે જૂથ મળ્યા કે દરેક જૂથમાં ત્રણ-ત્રણ સંખ્યા હોય.

**સોપાન 2** પ્રથમ જૂથ એટલે કે 375નો એકમના અંક આપેલ સંખ્યાના ઘનમૂળનો એકમનો અંક મળશે. પ્રથમ જૂથમાં આવેલ સંખ્યા 375 માં એકમનો અંક 5 છે. તેથી આપણે કહી શકીએ કે જો સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 હોય તો તેવી સંખ્યાના ઘનમૂળ તરીકે જે સંખ્યા મળે તેનો એકમનો અંક પણ 5 હોય. તેથી અહીં આપણને ઘનમૂળની સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 મળે છે.

**સોપાન 3** હવે બીજું જૂથ લઈએ જે 857 છે. ઉપરાંત આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે  $9^3 = 729$  અને  $10^3 = 1000$ . તેમજ  $729 < 857 < 1000$ . તેથી દશકના અંક તરીકે નાનામાં નાની સંખ્યા 729 નો એકમનો અંક લઈશું. તેથી આપણને  $\sqrt[3]{857375} = 95$  મળશે.

**ઉદાહરણ 8 :** અનુમાન કરીને 17576નું ઘનમૂળ શોધો.

**ઉકેલ :** અહીં સંખ્યા 17576 આપેલ છે.

**સોપાન 1** સૌ પ્રથમ આપણે સંખ્યા 17576ના જમણી બાજુથી શરૂ કરી ત્રણ-ત્રણનાં જૂથ બનાવીશું. અહીં, 576 અને 17 એમ બે જૂથ બને છે. 576 માં ત્રણ અને 17માં બે સંખ્યા રહે છે.



**સોપાન 2** હવે સંખ્યા 576 લો. તેમાં એકમનો અંક 6 છે. તેથી ઘનમૂળમાં પણ એકમનો અંક 6 મળશે.

**સોપાન 3** હવે બીજું જુથ 17 છે. 2 નો ઘન 8 છે અને 3 નો ઘન 27 છે. તેમજ 17 એ 8 અને 27 ની વચ્ચે આવેલી સંખ્યા છે. તેમજ 2 અને 3માં નાની સંખ્યા 2 છે. સંખ્યા 2માં એકમનો અંક 2 પોતે જ છે. તેથી 17576ના ઘનમૂળમાં દશકના અંક તરીકે 2ને લેતાં,  
 $\sqrt[3]{17576} = 26$  (ચકાસો)

## સ્વાધ્યાય 7.2

- નીચે આપેલી દરેક સંખ્યાનું ઘનમૂળ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે શોધો.
 

(i) 64	(ii) 512	(iii) 10648	(iv) 27000
(v) 15625	(vi) 13824	(vii) 110592	(viii) 46656
(ix) 175616	(x) 91125		
- નીચેનું વિધાન ખરું છે કે ખોટું તે કહો :
  - કોઈપણ એકી સંખ્યાનો ઘન બેકી સંખ્યા હોય.
  - પૂર્ણ ઘન સંખ્યાના અંતિમ બે અંકો શૂન્ય ન હોય.
  - જો કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ કરતાં એકમનો અંક 5 આવે તો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાના છેલ્લા બે અંક 25 આવે.
  - એવી કોઈ પૂર્ણઘન સંખ્યા ના મળે કે જેનો એકમનો અંક 8 હોય.
  - બે અંકોવાળી સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યા ત્રણ અંકોની પણ હોય.
  - બે અંકોવાળી સંખ્યાનો ઘન કરતાં સાત કે તેથી વધુ અંકોની સંખ્યા પણ મળે.
  - એક અંકની સંખ્યાનો ઘન કરવાથી એક અંકની સંખ્યા પણ મળે.
- જો તમને એમ કહેવામાં આવે કે 1331 એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે. શું તમે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની પ્રક્રિયા વિના જ તેનું ઘનમૂળ શોધી શકો ? તેવી જ રીતે 4913, 12167, 32768ના ઘનમૂળનું અનુમાન કરો.

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

- સંખ્યાઓ જેવી કે 1729, 4104, 13832 એ હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા તરીકે જાણીતી છે. આવી સંખ્યાને બે સંખ્યાઓના ઘનના સરવાળા તરીકે બે અલગ રીતે રજૂ કરી શકાય.
- કોઈ સંખ્યાને તેની જ સાથે ત્રણ વાર ગુણવાથી મળતી સંખ્યાને તે સંખ્યાનો ઘન કહે છે જેમ કે 1, 8, 27, ... વગેરે.
- જો કોઈ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેક અવયવ ત્રણવાર આવે તો તેવી સંખ્યા પૂર્ણઘન સંખ્યા હોય છે.
- સંકેત '  $\sqrt[3]{\quad}$  ' ને ઘનમૂળ કહે છે. જેમ કે  $\sqrt[3]{27} = 3$ .



## રાશિઓની તુલના

પ્રકરણ

8

### 8.1 ગુણોત્તર અને ટકાવારીનું પુનરાવર્તન

આપણને ખબર છે કે ગુણોત્તર એટલે બે રાશિઓની સરખામણી.

એક ટોપલીમાં બે પ્રકારનાં ફળો છે. તેમાં 20 સફરજન અને 5 નારંગી છે. તો નારંગીની સંખ્યા અને સફરજનની સંખ્યાનો ગુણોત્તર = 5 : 20.

અપૂર્ણાંકનો ઉપયોગ કરી આ સરખામણી આ રીતે થઈ શકે  $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

નારંગીની સંખ્યા એ સફરજનની સંખ્યા કરતાં  $\frac{1}{4}$  જેટલી છે.

ગુણોત્તરના રૂપમાં તે 1 : 4 લખાય અને “1 જેમ 4” એમ વંચાય છે.

અથવા

સફરજનની સંખ્યા અને નારંગીની સંખ્યાનો ગુણોત્તર  $\frac{20}{5} = \frac{4}{1}$  એટલે કે સફરજનની સંખ્યા એ નારંગીની સંખ્યા કરતાં 4 ગણી છે.

આ સરખામણી ટકાવારી દ્વારા પણ થઈ શકે છે.

અહીં 25 ફળો પૈકી 5 નારંગી છે, તેથી નારંગીની ટકાવારી

$$\frac{5}{25} \times \frac{4}{4} = \frac{20}{100} = 20\%$$


[છેદમાં 100 લાવવા]

અથવા

ત્રિરાશીની રીતે :

અહીં 25 ફળો પૈકી નારંગીની સંખ્યા 5 છે, તેથી 100 ફળોમાંથી નારંગીની સંખ્યા

$$\frac{5}{25} \times 100 = 20$$

આમ,  ટોપલીમાં માત્ર સફરજન અને નારંગી જ હોય

તો સફરજનની ટકાવારી + નારંગીની ટકાવારી = 100

અથવા સફરજનની ટકાવારી + 20 = 100

અથવા સફરજનની ટકાવારી = 100 - 20 = 80

એટલે કે ટોપલીમાં 20% નારંગી અને 80% સફરજન છે.

**ઉદાહરણ 1 :** શાળામાં ધોરણ VII માટે પ્રવાસ નક્કી કરવામાં આવે છે. જેમાં કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાંથી 60% છોકરીઓ છે અને તેમની સંખ્યા 18 છે.

પ્રવાસનું સ્થળ શાળાથી 55 કિમી દૂર છે અને પરિવહન સંસ્થા ₹ 12 પ્રતિ કિમી વસૂલ કરે છે. અલ્યાહારની કુલ કિંમત ₹ 4280 છે.

શું તમે કહી શકશો કે,

1. વર્ગમાં છોકરીઓની સંખ્યા અને છોકરાઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર કેટલો ?
2. જો બે શિક્ષકો વર્ગ સાથે જતાં હોય તો વ્યક્તિ દીઠ ખર્ચ કેટલો ?
3. જો પ્રવાસનું પ્રથમ વિરામ સ્થળ 22 કિમી દૂર હોય તો તે પ્રવાસના કુલ 55 કિમીના કેટલા ટકા થાય ? પ્રવાસમાં બાકી રહેલ અંતરની ટકાવારી શું થાય ?

**ઉકેલ :**

1. છોકરીઓ અને છોકરાઓનો ગુણોત્તર શોધવા માટે આશિમા અને જહોન નીચે મુજબ જવાબ આપે છે. તેમણે છોકરાઓની સંખ્યા અને વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા શોધવાની છે.

**આશિમાની રીત**  
ધારો કે, વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા  $x$  છે.  
 $x$  ના 60% છોકરીઓ છે.  
 $\therefore x$  ના 60% = 18  
 $\frac{60}{100} \times x = 18$   
અથવા  $x = \frac{18 \times 100}{60} = 30$   
વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા = 30

અથવા

**જહોને ત્રિરાશિની રીત વાપરી**  
100 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 60 છોકરીઓ છે.  
 $\frac{100}{60}$  વિદ્યાર્થીઓમાંથી 1 છોકરી છે,  
તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓમાંથી 18 છોકરીઓ હશે ?  
વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા =  $\frac{100}{60} \times 18$   
= 30

તેથી છોકરાઓની સંખ્યા =  $30 - 18 = 12$

હવે, છોકરીઓની સંખ્યા અને છોકરાઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર  $18 : 12$  અથવા  $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$  હશે.

જેને 3 : 2 લખાય અને “3 જેમ 2” વંચાય છે.

2. વ્યક્તિ દીઠ કિંમત શોધવા :

પરિવહનનો ખર્ચ = કુલ અંતર બંને તરફનું  $\times$  ભાવ

$$= ₹ (55 \times 2) \times ₹ 12$$

$$= ₹ 110 \times 12$$

$$= ₹ 1320$$

કુલ ખર્ચ = અલ્પાહારનો ખર્ચ + પરિવહનનો ખર્ચ

$$= ₹ 4280 + ₹ 1320$$

$$= ₹ 5600$$

કુલ વ્યક્તિઓ = 18 છોકરીઓ + 12 છોકરાઓ + 2 શિક્ષકો

$$= 32 \text{ વ્યક્તિઓ}$$

પછી, આશિમા અને જહોને ત્રિરાશિની રીત વાપરીને માથા દીઠ કિંમત શોધી.

32 વ્યક્તિ માટે વપરાયેલી રકમ = ₹ 5600

તો એક વ્યક્તિ માટે વપરાયેલી રકમ =  $\frac{5600}{32} = ₹ 175$

3. પ્રથમ વિરામ સ્થળનું અંતર = 22 કિમી.



અંતરની ટકાવારી શોધવા માટે

**આશિમાની રીત**

$$\frac{22}{55} = \frac{22}{55} \times \frac{100}{100} = \frac{40}{100} = 40\%$$

અથવા

$$\left[ \begin{array}{l} \text{તેણે ગુણોત્તરનો} \\ \text{ગુણાકાર } \frac{100}{100} = 1 \\ \text{વડે કર્યો અને} \\ \text{ટકાવારીમાં રૂપાંતર કર્યું.} \end{array} \right]$$

**જહોને ત્રિરાશિની રીત વાપરી**

55 કિમીમાંથી 22 કિમી. અંતર કાપ્યું.

1 કિમીમાંથી  $\frac{22}{55}$  કિમી. અંતર કાપ્યું

100 કિમીમાંથી  $\frac{22}{55} \times 100$  કિમી અંતર કાપ્યું

કુલ અંતરનું 40% અંતર કાપ્યું.

બંને જવાબ સરખા છે. આમ, તેઓ જે સ્થળે પહોંચ્યા છે તે સ્થળનું શાળાથી અંતર (કુલ અંતરના) 40% છે.  
 ∴ બાકીના અંતરની ટકાવારી  
 = 100% - 40% = 60%

### પ્રયત્ન કરો


એક પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ એક દિવસમાં કેટલા કલાક તેઓના બાળકોને ગૃહકાર્યમાં મદદ કરે છે ?

90 વાલીઓ એવા હતા કે જેઓ પોતાના બાળકને  $\frac{1}{2}$  થી  $1\frac{1}{2}$  કલાક મદદ કરે છે. બાજુની આકૃતિમાં વાલીઓ પોતાના બાળકને મદદ કરવા જે સમય ફાળવે છે, તેના પરથી તેઓનું (વાલીની સંખ્યાનું) વિભાજન કરેલ છે.

20% વાલીઓ  $1\frac{1}{2}$  કલાકથી વધારે સમય મદદ કરે છે, 30% વાલીઓ  $\frac{1}{2}$  થી  $1\frac{1}{2}$  કલાક મદદ કરે છે અને 50% વાલીઓ મદદ નથી કરતા.

આ પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

- (i) કુલ કેટલા વાલીઓને પૂછવામાં આવ્યું હતું ?
- (ii) કેટલા વાલીઓ મદદ જ નહોતા કરતા ?
- (iii) કેટલા વાલીઓ  $1\frac{1}{2}$  કલાકથી વધારે સમય મદદ કરતા હતા ?



### સ્વાધ્યાય 8.1

1. નીચે આપેલ સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર શોધો.
  - (a) સાયકલની ઝડપ 15 કિમી/કલાક અને સ્કૂટરની ઝડપ 30 કિમી/કલાક
  - (b) 5 મીટર અને 10 કિમી
  - (c) 50 પૈસા અને ₹ 5 રૂપિયા
2. નીચે આપેલ ગુણોત્તરોનું ટકાવારીમાં રૂપાંતર કરો.
  - (a) 3 : 4
  - (b) 2 : 3
3. 25 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 72% વિદ્યાર્થીઓ ગણિતમાં રસ લે છે, તો કેટલા વિદ્યાર્થી ગણિતમાં રસ લેતા નથી ?
4. એક ફૂટબોલ ટીમ તેમણે રમેલી મેચમાંથી 10 મેચ જીતી હતી. જો તેમની જીતેલી મેચની ટકાવારી 40% હોય તો તેઓ કુલ કેટલી મેચ રમ્યા હશે ?
5. જો ચમેલી પાસે તેની રકમના 75% વાપર્યા પછી ₹ 600 બાકી રહ્યાં હોય, તો તેની પાસે શરૂઆતમાં કુલ કેટલી રકમ હશે ?



6. એક શહેરમાં કુલ વ્યક્તિમાંથી 60% વ્યક્તિઓને ક્રિકેટ , 30% વ્યક્તિઓને ફૂટબોલ અને બાકીની વ્યક્તિઓને બીજી રમતો ગમે છે. જો શહેરમાં કુલ 50 લાખ વ્યક્તિઓ હોય તો પ્રત્યેક રમતમાં કુલ વ્યક્તિઓની સંખ્યા કેટલી હશે ?

### 8.2 ટકાવારીમાં વધારો કે ઘટાડો શોધવો

આપણને આપણા રોજિંદા જીવનમાં આવી જાણકારી મળતી રહે છે.

- (i) છાપેલ કિંમતમાં 25% છૂટ (ii) પેટ્રોલની કિંમતમાં 10% વધારો  
ચાલો, આપણે આવાં થોડાં વધુ ઉદાહરણ જોઈએ.

**ઉદાહરણ 2 :** ગયા વર્ષે એક સ્કૂટરની કિંમત ₹ 34,000 હતી. આ વર્ષે તેની કિંમતમાં 20% વધારો થયો, તો હાલ તેની કિંમત શું હશે ?

**ઉકેલ :**

અમિતા કહે છે કે તે પહેલા કિંમતમાં વધારો શોધશે જે ₹ 34,000ના 20% છે અને પછી નવી કિંમત શોધશે.

$$\begin{aligned} \text{₹ 34,000નાં 20\%} &= \frac{20}{100} \times \text{₹ 34,000} \\ &= \text{₹ 6800} \\ \text{નવી કિંમત} &= \text{જૂની કિંમત} + \text{કિંમતમાં વધારો} \\ &= \text{₹ 34,000} + \text{₹ 6800} \\ &= \text{₹ 40,800} \end{aligned}$$

અથવા

સુનીતાએ ત્રિરાશિની રીત વાપરી.  
20% વધારો એટલે ₹ 100ના ₹ 120 તેથી ₹ 34,000માં કેટલો વધારો ?

$$\begin{aligned} \text{કિંમતમાં વધારો} &= \text{₹ } \frac{120}{100} \times 34,000 \\ &= \text{₹ 40,800} \end{aligned}$$

આ રીતે કિંમતમાં ટકાવારીનો ઘટાડો શોધવા પહેલાં કુલ ઘટાડો શોધી અને પછી તેને તેની મૂળ કિંમતમાંથી બાદ કરો.

ધારો કે વેચાણ વધારવા માટે સ્કૂટરની મૂળ કિંમતમાં 5% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો. તો ચાલો સ્કૂટરની નવી કિંમત શોધીએ.

$$\begin{aligned} \text{સ્કૂટરની મૂળ કિંમત} &= \text{₹ 34,000} \\ &= \text{₹ 34,000ના 5\%} \\ &= 34,000 \times \frac{5}{100} = \text{₹ 1700} \\ \text{નવી કિંમત} &= \text{મૂળ કિંમત} - \text{ઘટાડો} \\ &= \text{₹ 34000} - \text{₹ 1700} = \text{₹ 32300} \end{aligned}$$

આમ, સ્કૂટરની નવી કિંમત ₹ 32,300 થાય.

### 8.3 વળતર શોધવું

વળતર એ વસ્તુની છાપેલ કિંમતમાં આપેલ ઘટાડો છે.

આમ તો વળતર ગ્રાહકોને વસ્તુઓ ખરીદવા માટે આકર્ષવા અથવા વસ્તુઓનું વેચાણ વધારવા માટે હોય છે.

આપણે, છાપેલી કિંમતમાંથી વેચાણ કિંમત બાદ કરીને વળતર શોધી શકીએ છીએ.

તેથી

$$\text{વળતર} = \text{છાપેલી કિંમત} - \text{વેચાણ કિંમત}$$





**ઉદાહરણ 3 :** એક વસ્તુની છાપેલી કિંમત ₹ 840 છે અને તેની વેચાણ કિંમત ₹ 714 છે, તો વળતર અને વળતરની ટકાવારી શું થાય ?

**ઉકેલ :** વળતર = છાપેલ કિંમત - વેચાણ કિંમત  
 = ₹ 840 - ₹ 714  
 = ₹ 126

વળતર છાપેલ કિંમત પર હોવાથી આપણે છાપેલ કિંમતને આધાર તરીકે લઈશું.

₹ 840ની છાપેલી કિંમત પર વળતર ₹ 126 છે.  
 ₹ 100ની છાપેલી કિંમત પર વળતર કેટલું હશે ?

વળતરની ટકાવારી =  $\frac{126}{840} \times 100$   
 = 15%

જ્યારે વળતરની ટકાવારી આપી હોય ત્યારે પણ તમે વળતર શોધી શકો છો.

**ઉદાહરણ 4 :** ફોકની યાદી મુજબની કિંમત ₹ 220 છે. વેચાણ પર 20% વળતર નક્કી કરેલ છે. તો ફોક પર વળતર અને તેની વેચાણ કિંમત શોધો.

**ઉકેલ :** યાદી મુજબની કિંમત અને છાપેલ કિંમત એક જ કહેવાય.  
 20% વળતર એટલે ₹ 100 (છા. કિં.) પર ₹ 20નું વળતર

ત્રિરાશિની રીતથી ₹ 1 પર વળતર ₹  $\frac{20}{100}$  છે.

તો ₹ 220 પર વળતર =  $\frac{20}{100} \times 220 = ₹ 44$   
 વેચાણ કિંમત = ₹ 220 - ₹ 44  
 = ₹ 176


રેહાનાએ વેચાણ કિંમત આ રીતે શોધી.

20% વળતર એટલે ₹ 100ની વેચાણ કિંમત પર ₹ 20નું વળતર. તેથી વેચાણ કિંમત ₹ 80 થશે.

ત્રિરાશિની રીતથી ₹ 100ની છાપેલી કિંમત હોય ત્યારે વેચાણ કિંમત ₹ 80 થશે.

જ્યારે છાપેલી કિંમત ₹ 1 હોય ત્યારે વેચાણ કિંમત ₹  $\frac{80}{100}$  થશે.

તો જ્યારે છાપેલી કિંમત ₹ 220 હોય ત્યારે વેચાણ કિંમત = ₹  $\frac{80}{100} \times ₹ 220 = ₹ 176$



વળતર શોધ્યા વગર પણ હું વેચાણ કિંમત શોધી શકું.



### પ્રયત્ન કરો

- એક દુકાનદાર 20% વળતર આપે છે, તો નીચે આપેલી વસ્તુઓની વેચાણ કિંમત શું થશે ?
  - એક ડ્રેસ જેની છાપેલી કિંમત ₹ 120 છે.
  - એક જોડી બૂટ જેની છાપેલી કિંમત ₹ 750 છે.
  - એક થેલો જેની છાપેલી કિંમત ₹ 250 છે.
- એક ટેબલ જેની છાપેલી કિંમત ₹ 15000 છે તે ₹ 14,400માં મળે છે. તેના પર મળેલ વળતર અને વળતરની ટકાવારી શોધો.
- એક કબાટ 5% વળતર આપી ₹ 5,225માં વેચેલ છે તો તેની છાપેલ કિંમત શોધો.

### 8.3.1 ટકાવારીમાં અંદાજો

એક દુકાનનું તમારું બિલ ₹ 577.80 છે અને દુકાનદાર તમને 15% નું વળતર આપે છે. તમે ચૂકવવાના થતાં રૂપિયાનો અંદાજ કેવી રીતે મેળવશો ?

(i) ₹ 577.80ની રકમની નજીકના દશક સુધીની અંદાજિત કિંમત = ₹ 580

(ii) આ રકમના 10% શોધો.

$$\text{અર્થાત્, } ₹ \frac{10}{100} \times 580 = ₹ 58$$

(iii) આ રકમની અડધી રકમ એટલે  $\frac{1}{2} \times ₹ 58 = ₹ 29$

(iv) (ii) અને (iii)ની રકમનો સરવાળો કરો. એટલે ₹ 87 મળશે.

આ રીતે તમને તમારા બિલમાં ₹ 87 અથવા ₹ 85 ની છૂટ મળી શકે અને બિલ પેટે ચૂકવવાની કિંમત આશરે ₹ 495 થશે.

(1) ઉપરોક્ત બિલ પર 20% લેખે વળતર શોધવાનો પ્રયત્ન કરો.

(2) ₹ 375ના 15% શોધવાનો પ્રયત્ન કરો.

### 8.4 વેચાણ અને ખરીદી સંબંધિત કિંમત (નફો અને ખોટ)



આ વખતે શાળાના મેળામાં હું ઈનામી વસ્તુનો સ્ટોલ રાખવાની છું. હું એક ઈનામી વસ્તુ માટે ₹ 10 વસૂલ કરીશ, જે હું ₹ 5માં ખરીદીશ.



તો તને 100% નફો મળશે.



ના, હું ₹ 3નો ખર્ચ ઈનામી વસ્તુના પેકિંગ માટે કરીશ. તેથી વસ્તુ દીઠ ખર્ચ ₹ 8 થશે. જેથી મને ₹ 2નો નફો થશે. જે  $\frac{2}{8} \times 100 = 25\%$  છે.

ઘણીવાર કોઈ વસ્તુ ખરીદવામાં આવે ત્યારે તેને ખરીદવાનો અથવા વેચાણ પહેલા અમુક વધારાનો ખર્ચ લાગે છે. જે તેની મૂળ કિંમતમાં ઉમેરવો પડે છે.

આ ખર્ચને આપણે પડતર ખર્ચ (વધારાનો ખર્ચ) કહીએ છીએ અને પડતર ખર્ચ સહિતની ખરીદ કિંમતને પડતર કિંમત કહે છે. આવા ખર્ચમાં સામાન્ય રીતે પરિવહન ખર્ચ, મરામત ખર્ચ, મજૂરી ખર્ચ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.



#### 8.4.1 મૂળ કિંમત અથવા વેચાણ કિંમત શોધવી, નફો % અથવા ખોટ % શોધવા

**ઉદાહરણ 5 :** સોહને એક જૂનું ફીઝ ₹ 2500માં ખરીદ્યું. તેમાં તેણે ₹ 500નો ખર્ચ કર્યો અને ₹ 3300માં વેચ્યું. તો તેને થયેલ નફા અથવા ખોટની ટકાવારી શોધો.

$$\begin{aligned} \text{ઉકેલ : મૂળ કિંમત (CP)} &= ₹ 2500 + ₹ 500 \text{ (વધારાનો ખર્ચ મૂળ કિંમતમાં ઉમેરતાં)} \\ &= ₹ 3000 \end{aligned}$$

$$\text{વેચાણ કિંમત} = ₹ 3300$$

અહીં, વેચાણ કિંમત > મૂળ કિંમત, તેથી નફો = ₹ 3300 – ₹ 3000 = ₹ 300

₹ 3000 પર તેને ₹ 300 નફો થયો. તો ₹ 100 પર કેટલો નફો થશે ?

$$\text{નફો\%} = \frac{300}{3000} \times 100\% = \frac{30}{3} \% = 10\%$$

$$\text{નફો \%} = \frac{\text{નફો}}{\text{મૂ.કિ.}} \times 100$$

## પ્રયત્ન કરો

- જો 5% નફો થતો હોય તો નીચેની વિગતો માટે વેચાણ કિંમત શોધો.
  - ₹ 700ની એક સાયકલ, ₹ 50ના વધારાના ખર્ચ સાથે
  - ₹ 1150માં ખરીદેલ ઘાસ કાપવાનું મશિન ₹ 50ના પરિવહન ખર્ચ સાથે.
  - ₹ 560માં ખરીદેલ પંખો, ₹ 40ના સમારકામના વધારાના ખર્ચ સાથે.



**ઉદાહરણ 6 :** એક દુકાનદારે ₹ 10 લેખે 200 વીજળીના ગોળા (Bulb) ખરીદ્યા. આમાંથી 5 વીજળીના ગોળા ઉડી ગયા અને ફેંકી દેવા પડ્યા. બાકીના ગોળાઓ ₹ 12 પ્રતિ ગોળા લેખે વેચાયા. નફો કે ખોટની ટકાવારી શોધો.

**ઉકેલ :** 200 વીજળીના ગોળાની મૂળ કિંમત = ₹ 200 × 10 = ₹ 2000  
 5 વીજળીના ગોળા ઉડી ગયા તેથી વધેલા ગોળાઓની સંખ્યા = 200 - 5 = 195  
 તેમને ₹ 12 પ્રતિ ગોળા લેખે વેચવામાં આવ્યા.  
 તેથી 195 વીજળીના ગોળાઓની વેચાણ કિંમત (વે. કિ.)  
 = ₹ 195 × ₹ 12 = ₹ 2340  
 તેણે ચોક્કસ નફો કર્યો છે. (વે. કિ. > મૂ. કિ.)  
 નફો = ₹ 2340 - ₹ 2000 = ₹ 340  
 ₹ 2000 પર ₹ 340નો નફો થયો તો ₹ 100 પર કેટલો નફો થશે ?

$$\text{નફો \%} = \frac{340}{2000} \times 100 = 17\%$$

**ઉદાહરણ 7 :** મીનુએ બે પંખા ₹ 1200 લેખે ખરીદ્યા. તેણે એક પંખો 5% ની ખોટ સાથે અને બીજો 10%ના નફા સાથે વેચ્યો. બન્નેની વેચાણ કિંમત શોધો. કુલ નફો અથવા ખોટ પણ શોધો.

**ઉકેલ :** એક પંખાની મૂળ કિંમત = ₹ 1200

એક પંખો 5% ખોટ સાથે વેચે છે.

એટલે કે જો મૂ. કિં. = ₹ 100 તો વે. કિં. = ₹ 95

$$\therefore \text{જ્યારે મૂ. કિં. ₹ 1200 હોય, ત્યારે વે. કિં.} = \frac{95}{100} \times 1200 = ₹ 1140$$

બીજો પંખો 10% નફા સાથે વેચે છે એટલે કે જો મૂ. કિં. = ₹ 100

$$\text{તો વે. કિં.} = ₹ 110$$

$$\therefore \text{જ્યારે મૂ. કિં.} = ₹ 1200 \text{ હોય, ત્યારે વે. કિં.} = \frac{110}{100} \times 1200 = ₹ 1320$$

શું સમગ્ર રીતે નફો થયો કે ખોટ ?



આપણે મૂ. કિં. અને વે. કિં.ને સંયુક્ત રીતે શોધીને કહી શકીએ કે સમગ્ર રીતે નફો થયો કે ખોટ.

$$\text{કુલ મૂ. કિં.} = ₹ 1200 + ₹ 1200 = ₹ 2400$$

$$\text{કુલ વે. કિં.} = ₹ 1140 + ₹ 1320 = ₹ 2460$$

અહીં કુલ વે. કિં. > કુલ મૂ. કિં.

તેથી નફો = ₹ 2460 - ₹ 2400 = ₹ 60 ∴ ₹ 60નો નફો થયો.



## પ્રયત્ન કરો

- એક દુકાનદારે દરેકના ₹ 10,000 લેખે બે ટી.વી. (TV) ખરીદ્યા. તે પૈકી એક 10%ના નફા સાથે અને બીજું 10%ની ખોટ સાથે વેચે છે. તેને સમગ્ર રીતે નફો થયો કે ખોટ તે શોધો.





## 8.5 GST (Goods and Service Tax) આધારિત પ્રશ્નો

શિક્ષકે વર્ગમાં બીલ બતાવી જેમાં નીચે મુજબનાં શિર્ષકો લખેલાં હતાં.

બીલ નંબર		તારીખ		
વિગત				
અનુક્રમ નંબર	વસ્તુ	જથ્થો	દર	મૂલ્ય
		બીલની રકમ + GST (5%)		
	કુલ			



વેચાણ કર (ST - Sales Tax) એ કોઈ પણ વસ્તુના વેચાણ ઉપર સરકાર દ્વારા વસુલવામાં આવતો કર છે. આ કર ગ્રાહક પાસેથી દુકાનદાર વસુલી અને સરકારમાં જમા કરાવે છે તે હમંશા વસ્તુની વે.કિં. ઉપર જ ગણાય છે. જ્યારે મૂલ્ય વર્ધિત કર (VAT - Value Added Tax) એ વસ્તુની કિંમતમાં જ સમાવિષ્ટ હોય છે. તે અલગથી વસુલવામાં આવતો નથી.



1 જુલાઈ, 2017 થી ભારત સરકારે ST, VAT, ... વિગેરે જેવા વિવિધ કરને બદલે એક જ પ્રકારનો કર લાગુ પાડેલ છે. જે વસ્તુ અને સેવા કર (GST - Goods And Service Tax) ના નામથી ઓળખાય છે. આ કર વસ્તુની કિંમત અથવા સેવા અથવા બંને ઉપર વસુલવામાં આવે છે.

**ઉદાહરણ 8 :** એક દુકાનમાં પૈડાંવાળા બૂટની એક જોડની કિંમત ₹ 450 હતી. તેના પર 5% GST લેવામાં આવ્યો. તો બિલની રકમ શોધો.

**ઉકેલ :** ₹ 100 પર ₹ 5નો GST લેવામાં આવ્યો હતો,  
તો ₹ 450 પર કેટલો GST ભરવો પડે =  $\frac{5}{100} \times 450$   
= ₹ 22.50

બિલ કિંમત = વસ્તુની કિંમત + GST = 450 + 22.50 = ₹ 472.50

**ઉદાહરણ 9 :** વહીદા ₹ 2240માં 12% GST સાથે એરકૂલરની ખરીદી કરે છે. તો ટેક્ષ લાગ્યા પહેલાની કિંમત શોધો.

**ઉકેલ :** કિંમતમાં GST ઉમેરાય છે.

12% GST એટલે જો GST લગાવ્યા પહેલાની કિંમત ₹ 100 હોય તો GST લગાવ્યા સાથેની કિંમત ₹ 112 થાય.

હવે GST સાથેની કિંમત ₹ 112 ત્યારે મૂળકિંમત ₹ 100 હોય.

તો જ્યારે GST સાથેની કિંમત ₹ 2240 હોય તો મૂળકિંમત = ₹  $\frac{100}{112} \times 2240$  = ₹ 2000


**ઉદાહરણ 10 :** સલીમ એક વસ્તુ ₹ 784માં ખરીદે છે. જેમાં 12% GST સામેલ છે. તો GST ઉમેર્યા પહેલા આ વસ્તુની કિંમત શું હશે ?

**ઉકેલ :** ધારો કે વસ્તુની મૂ.કિ. ₹ 100 છે. GST = 12% છે.

∴ GST સહિત વસ્તુની કિંમત = ₹ (100 + 12) = ₹ 112

આમ, વે.કિ. ₹ 112 હોય તો મૂ.કિ. = ₹ 100

∴ વે.કિ. ₹ 784 હોય તો મૂ.કિ. = ₹  $(\frac{100}{112} \times 784)$  = ₹ 700 થાય.



## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

1. કોઈ સંખ્યાની બમણી સંખ્યા એ 100%નો વધારો છે. જો આપણે તે સંખ્યાનો અડધો ભાગ લઈએ તો ટકાવારીમાં કેટલો ઘટાડો થશે ?
2. ₹ 2000 એ ₹ 2400 કરતાં કેટલા ટકા ઓછા છે ? ₹ 2400 એ ₹ 2000 કરતાં ટકાવારીમાં કેટલા વધુ છે ? શું બંને ફેરફાર સમાન છે ?



## સ્વાધ્યાય 8.2

1. એક વ્યક્તિને તેના પગારમાં 10%નો વધારો મળ્યો. જો તેનો નવો પગાર ₹ 1,54,000 થયો હોય તો તેનો મૂળ પગાર શોધો.
2. રવિવારે 845 લોકોએ પ્રાણીસંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી. સોમવારે માત્ર 169 લોકો ગયા. તો સોમવારે પ્રાણીસંગ્રહાલયની મુલાકાત લેનાર લોકોની સંખ્યામાં કેટલા ટકા ઘટાડો થયો ?
3. એક દુકાનદાર ₹ 2400 માં 80 વસ્તુઓ ખરીદે છે અને તેને 16% નફા સાથે વેચે છે. તો એક વસ્તુની વેચાણ કિંમત શોધો.
4. એક વસ્તુની કિંમત ₹ 15,500 હતી. તેના પર ₹ 450નું સમારકામ કરવામાં આવ્યું. જો તેને 15% ના નફા સાથે વેચવામાં આવે તો તે વસ્તુની વેચાણ કિંમત શોધો.
5. એક VCR અને TV ₹ 8000નું એક એમ ખરીદવામાં આવ્યા. દુકાનદારને VCR પર 4% ની ખોટ ગઈ અને TV પર 8% નો નફો થયો. તો આ વ્યવહારમાં થયેલ નફો કે ખોટ ટકાવારીમાં શોધો.
6. વેચાણ દરમ્યાન, એક દુકાનમાં બધી વસ્તુઓમાં છાપેલ કિંમત પર 10% વળતર મળતું હતું. તો એક ગ્રાહકને એક જોડી જીન્સ ₹ 1450 અને બે શર્ટ દરેકના ₹ 850ની છાપેલ કિંમત પર કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે ?



7. દૂધવાળાએ પોતાની બે ભેંસ ₹ 20,000 લેખે વેચી. એક ભેંસ પર તેને 5% નફો અને બીજી ભેંસ પર તેને 10% ખોટ થઈ. તો સમગ્ર રીતે નફો કે ખોટ શોધો. (સૂચન : બન્નેની મૂળ કિંમત શોધો.)
8. એક T. V.ની કિંમત ₹ 13,000 છે. તેના પર 12% GST લગાડવામાં આવેલ છે. જો વિનોદને T.V. ખરીદવું હોય તો તેણે કેટલી રકમ ચૂકવવી પડે ?
9. અરુણે એક જોડી સ્કેર્ટીંગ માટેના બૂટ 20%ના વળતર પર ખરીદ્યા. જો તેણે ₹ 1600 આપ્યા હોય તો તેની છાપેલ કિંમત શોધો.
10. મેં ₹ 5400 માં “હેર-ડ્રાપર” ખરીદ્યું. જેમાં 18% GST લાગ્યો હતો. GST પહેલાંની કિંમત શોધો.
11. એક વસ્તુ 18% GST સાથે ₹ 1239 માં ખરીદવામાં આવે છે. વસ્તુની છાપેલી કિંમત શોધો.

## 8.6 ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ

તમે આવાં વાક્યો સાંભળ્યાં જ હશે. જેમકે “સ્થાયી થાપણ” (fixed deposit) માટે બેંકમાં 9% લેખે પ્રતિ વર્ષ વ્યાજ.” અથવા “બચત ખાતામાં પ્રતિ વર્ષ 5% વ્યાજ.”





વ્યાજ એટલે વધારાની રકમ જે આપણને બેંક અને ડાકઘર જેવી સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવે છે (જ્યારે આપણે તેમાં પૈસા જમા કરીએ છીએ). લોકો જ્યારે પૈસા ઉધાર લે છે ત્યારે તેમણે વ્યાજ આપવું પડે છે. સાદું વ્યાજ ગણતાં આપણને આવડે છે.

**ઉદાહરણ 10** : ₹ 10,000 ની રકમ, 15% પ્રતિ વર્ષ વ્યાજ લેખે 2 વર્ષ માટે ઉછીની લેવામાં આવી છે. આ રકમ પર સાદું વ્યાજ અને વ્યાજમુદ્દલ શોધો.

**ઉકેલ** : ₹ 100 પર એક વર્ષનું વ્યાજ ₹ 15 થશે.

$$\text{તો ₹ 10,000 પર વ્યાજ} = \frac{15}{100} \times ₹ 10,000 = ₹ 1500$$

$$2 \text{ વર્ષનું વ્યાજ} = ₹ 1500 \times 2 = ₹ 3000$$

બે વર્ષના અંતે આપવાની રકમ (વ્યાજમુદ્દલ) = મુદ્દલ + વ્યાજ

$$= ₹ 10,000 + ₹ 3000 = ₹ 13,000$$

### પ્રયત્ન કરો

₹ 15,000નું 5% પ્રતિ વર્ષ વ્યાજ લેખે 2 વર્ષનું વ્યાજ અને વ્યાજ મુદ્દલ શોધો.



મારા પપ્પાએ ડાકઘરમાં થોડા રૂપિયા 3 વર્ષ માટે મૂક્યા છે. દર વર્ષે આગલા વર્ષ કરતાં રૂપિયા વધે છે.



અમારી પાસે બેંકમાં થોડા રૂપિયા છે. એમાં દર વર્ષે થોડું વ્યાજ ઉમેરાય છે. જે પાસબુકમાં જોઈ શકાય છે. આ વ્યાજ સરખું નથી, તે દર વર્ષે વધે છે.



સામાન્ય રીતે, જે વ્યાજ ચૂકવવામાં કે આપવામાં આવે છે તે ક્યારેય સાદું નથી હોતું. આ વ્યાજની ગણતરી આગલા વર્ષના વ્યાજમુદ્દલ પર કરવામાં આવે છે. આ વ્યાજને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કહેવાય છે.

ચાલો, એક ઉદાહરણ લઈએ અને વર્ષ દીઠ વ્યાજ શોધીએ. દર વર્ષે આપણી રકમ અથવા મુદ્દલ બદલાશે.

### ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી

હીનાએ ₹ 20,000ની રકમ વાર્ષિક 8% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે લીધી. ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને જે રકમ 2 વર્ષના અંતે આપવી પડશે એ કુલ રકમ શોધો.

અસલમે તેના શિક્ષકને પૂછ્યું કે, “આનો અર્થ એમ કે તેણે વર્ષ-પ્રતિ વર્ષ (દર વર્ષનું) વ્યાજ શોધવું.” શિક્ષકે જવાબ આપ્યો “હા” અને અસલમને આ પ્રમાણે કરવા કહ્યું.

1. સાદું વ્યાજ એક વર્ષ માટે શોધો.

પ્રથમ વર્ષના મુદ્દલને આપણે  $P_1$  કહીએ. અહીં  $P_1 = ₹ 20,000$

$$\text{સાદું વ્યાજ (SI)} = \text{સાદું વ્યાજ } 8\% \text{ લેખે પ્રથમ વર્ષ માટે} = \frac{20000 \times 8}{100} = ₹ 1600$$

2. હવે, તેને આપેલ કે મેળવેલ વ્યાજમુદ્દલ શોધો. આ આપણા માટે પછીના વર્ષની મુદ્દલ બનશે.

$$\text{પ્રથમ વર્ષના અંતે રકમ} = P_1 + SI_1 = ₹ 20,000 + ₹ 1600$$

$$= ₹ 21,600 \text{ (બીજા વર્ષનું મુદ્દલ)}$$

3. ફરી આ રકમ પર બીજા વર્ષનું વ્યાજ શોધો.

$$SI_2 = \text{સાદું વ્યાજ } 8\% \text{ લેખે બીજા વર્ષ માટે} = ₹ \frac{21600}{100} \times 8$$

$$= ₹ 1728$$

4. બીજા વર્ષના અંતે મેળવેલ કે ચૂકવેલ વ્યાજમુદ્દલ શોધો.

$$\text{બીજા વર્ષના અંતે વ્યાજમુદ્દલ} = P_2 + SI_2$$

$$= ₹ 21600 + ₹ 1728$$

$$= ₹ 23328$$

$$\text{કુલ વ્યાજ} = ₹ 1600 + ₹ 1728$$

$$= ₹ 3328$$

રીટાએ પૂછ્યું આ રકમ સાદા વ્યાજ માટે જુદી હશે ? તો શિક્ષકે કહ્યું, “બે વર્ષના અંતે વ્યાજ શોધો અને તમે પોતે જ ચકાસી લો.”

$$\text{સાદું વ્યાજ બે વર્ષ માટે} = \frac{20000 \times 8 \times 2}{100} = ₹ 3200$$

રીટાએ કહ્યું કે જ્યારે હીનાએ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે રકમ લીધી તો ₹ 128 વધારે આપવા પડ્યા.

ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજ વચ્ચેનો તફાવત જુઓ. આપણે ₹ 100 થી શરૂ કરીએ.

		સાદા વ્યાજ હેઠળ	ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ હેઠળ
પ્રથમ વર્ષ	મુદ્દલ	₹ 100.00	₹ 100.00
	10% વ્યાજ	₹ 10.00	₹ 10.00
	વર્ષાંતે કિંમત	₹ 110.00	₹ 110.00
બીજું વર્ષ	મુદ્દલ	₹ 100.00	₹ 110.00
	10% વ્યાજ	₹ 10.00	₹ 11.00
	વર્ષાંતે કિંમત	₹ (110 + 10) = ₹ 120	₹ 121.00
ત્રીજું વર્ષ	મુદ્દલ	₹ 110.00	₹ 121.00
	10% વ્યાજ	₹ 10.00	₹ 12.10
	વર્ષાંતે કિંમત	₹ (120 + 10) = ₹ 130	₹ 133.10

એટલે કે, તમે વ્યાજનું પણ વ્યાજ ચૂકવો છો.

અહીં, નોંધ લઈએ કે 3 વર્ષમાં,

$$\text{સાદા વ્યાજમાં મળતું વ્યાજ} = ₹ 130 - ₹ 100 = ₹ 30$$

$$\text{ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજમાં મળતું વ્યાજ} = ₹ 133.10 - ₹ 100 = ₹ 33.10$$

અહીં નોંધ લઈએ કે, સાદા વ્યાજમાં મુદ્દલની રકમ સરખી રહે છે, જ્યારે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજમાં તે વર્ષ દીઠ બદલાય છે.

### 8.7 ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના સૂત્રની તારવણી

સુબેદાએ શિક્ષકને પૂછ્યું, “શું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધવાનો કોઈ સરળ રસ્તો છે ?” શિક્ષકે કહ્યું, ‘ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધવાનો સરળ રસ્તો છે. ચાલો તેને શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

ધારો કે  $P_1$  એ રકમ છે, જેનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ  $R\%$  પ્રતિ વર્ષ લેખે ગણવાનું છે.

તેથી  $P_1 = ₹ 5000$ ,  $R = 5\%$  પ્રતિ વર્ષ હવે ઉપરનાં સોપાનો પ્રમાણે

$$1. \quad SI_1 = ₹ \frac{5000 \times 5 \times 1}{100}$$

$$\text{અથવા} \quad SI_1 = ₹ \frac{P_1 \times R \times 1}{100}$$

$$A_1 = ₹ 5000 + \frac{5000 \times 5 \times 1}{100}$$

$$\text{અથવા} \quad A_1 = P_1 + SI_1$$

$$= ₹ 5000 \left(1 + \frac{5}{100}\right) = P_2$$

$$= P_1 + \frac{P_1 R}{100}$$

$$= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right) = P_2$$

$$2. \quad SI_2 = ₹ 5000 \left(1 + \frac{5}{100}\right) \times \frac{5 \times 1}{100}$$

$$\text{અથવા} \quad SI_2 = \frac{P_2 \times R \times 1}{100}$$

$$= ₹ \frac{5000 \times 5}{100} \left(1 + \frac{5}{100}\right)$$

$$= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right) \times \frac{R}{100}$$

$$= \frac{P_1 R}{100} \left(1 + \frac{R}{100}\right)$$

$$A_2 = ₹ 5000 \left(1 + \frac{5}{100}\right)$$

$$\text{અથવા} \quad A_2 = P_2 + SI_2$$

$$+ \frac{5000 \times 5}{100} \left(1 + \frac{5}{100}\right)$$

$$= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right) + \frac{P_1 R}{100} \left(1 + \frac{R}{100}\right)$$

$$= ₹ 5000 \left(1 + \frac{5}{100}\right) \left(1 + \frac{5}{100}\right)$$

$$= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right) \cdot \left[1 + \frac{R}{100}\right]$$

$$= ₹ 5000 \left(\frac{1+5}{100}\right)^2 = P_3$$

$$= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^2 = P_3$$

આ રીતે આગળ વધતાં, ‘ $n$ ’ વર્ષના અંતે મળતી રકમ,

$$A_n = P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

અથવા આપણે એમ પણ કહી શકીએ.

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

તેથી જુબેદાએ કહ્યું, પણ આનો ઉપયોગ કરીને આપણે માત્ર  $n$  વર્ષના અંતે ચૂકવેલ રકમનું સૂત્ર મેળવી શકીએ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનું (CI) સૂત્ર મેળવી શકતા નથી.

અરુણાએ કહ્યું, આપણે જાણીએ છીએ કે  $CI = A - P$  તેથી આપણે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સહેલાઈથી શોધી શકીએ.

**ઉદાહરણ 11 :** ₹ 12600 પર 10% પ્રતિ વર્ષના દરે 2 વર્ષ માટે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

**ઉકેલ :** આપણી પાસે  $A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$  છે. જ્યાં  $P = ₹ 12600$ ,  $R = 10$ ,  $n = 2$

$$A = 12600 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 = ₹ 12600 \left(\frac{11}{10}\right)^2$$

$$= 12600 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} = ₹ 15246$$

$$CI = A - P = ₹ 15246 - ₹ 12600 = ₹ 2646$$

**પ્રયત્ન કરો**

1. ₹ 8000 પર 5% પ્રતિ વર્ષ વ્યાજ દરે 2 વર્ષ માટે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

**8.8 વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ દર અથવા અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ દર**

તમે જાણવા ઉત્સુક હશો કે શું કામ ‘વ્યાજ દર’ પછી “વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ” એમ દર્શાવવામાં આવે છે. શું આનો કોઈ અર્થ છે ?



હા છે, કારણ કે આપણી પાસે વ્યાજ દર અર્ધવાર્ષિક અથવા ત્રિમાસિક પણ હોઈ શકે. ચાલો જોઈએ શું થાય ? જો ₹ 100ને એક વર્ષ અથવા 6 મહિના માટે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે મૂકવામાં આવે તો,

**સમયગાળો અને વ્યાજદર (જ્યારે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ વાર્ષિક ન હોય)** જે સમયગાળા પછી તેટલા સમયના વ્યાજને મુદ્દલમાં ઉમેરવામાં આવે તો તે સમયગાળાને રૂપાંતરિત સમયગાળો કહે છે. જ્યારે અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ હોય ત્યારે રૂપાંતરિત સમયગાળા બે હોય છે. (દર 6 મહિને) આવી પરિસ્થિતિમાં અર્ધવાર્ષિક દર વાર્ષિક દર કરતાં અડધો થઈ જાય છે. ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ હોય ત્યારે આ રૂપાંતરિત ગાળો 4 વખત આવે છે અને ત્રિમાસિક વ્યાજ દર વાર્ષિક દર કરતાં  $\frac{1}{4}$  થઈ જાય છે.

$P = ₹ 100$ , 10% લેખે વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે	$P = ₹ 100$ , 10% લેખે અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે
સમયગાળો 1 વર્ષનો છે.	સમયગાળો છ મહિના અથવા $\frac{1}{2}$ વર્ષનો
$I = ₹ \frac{100 \times 10 \times 1}{100} = ₹ 10$	$I = ₹ \frac{100 \times 10 \times \frac{1}{2}}{100} = ₹ 5$
$A = ₹ 100 + ₹ 10 = ₹ 110$	$A = ₹ 100 + ₹ 5 = ₹ 105$ હવે આગલા 6 મહિના માટે $P = ₹ 105$
	તેથી $I = \frac{105 \times 10 \times \frac{1}{2}}{100} = ₹ 5.25$ અને $A = ₹ 105 + ₹ 5.25 = ₹ 110.25$

દર અડધો થઈ ગયો



તમે જોયું કે, જો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનો સમય અર્ધવાર્ષિક હોય તો વ્યાજ બે વખત ગણવું પડે, તેથી સમયગાળો બમણો અને દર અડધો થઈ જાય છે.

### પ્રયત્ન કરો

સમયગાળો અને દર શોધો.

1. એક રકમ  $1\frac{1}{2}$  વર્ષ માટે 8%ના દરે અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ લેવામાં આવે છે.
2. એક રકમ 2 વર્ષ માટે 4%ના દરે અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ લેવામાં આવે છે.

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

એક રકમ એક વર્ષ માટે 16% પ્રતિ વર્ષના દરે લેવામાં આવેલ છે. ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ દરનો સમય ત્રિમાસિક હોય તો એક વર્ષમાં કેટલીવાર વ્યાજની ગણતરી કરવામાં આવશે ?

**ઉદાહરણ 12 :** જો ₹ 12000ની લોન  $1\frac{1}{2}$  વર્ષ માટે 10% અર્ધવાર્ષિક વ્યાજ લેવામાં આવી હોય, તો કુલ કેટલી રકમ પરત ચૂકવવી પડે ?

**ઉકેલ :**

પહેલા 6 મહિના માટેનું મુદ્દલ = ₹ 12,000	પહેલા ૯ મહિના માટેનું મુદ્દલ = ₹ 12,000
<p><math>1\frac{1}{2}</math> વર્ષમાં ત્રણ અડધા વર્ષ હોય છે.</p> <p>∴ વ્યાજની ગણતરી ત્રણ વખત થશે.</p> <p>વ્યાજ દર = 10%ના અડધા</p> <p>= 5% અડધા વર્ષે</p> $A = P \left[ 1 + \frac{R}{100} \right]^n$ $= ₹ 12,000 \left[ 1 + \frac{5}{100} \right]^3$ $= ₹ 12,000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$ $= ₹ 13,891.50$	<p>સમય = 6 મહિના = <math>\frac{6}{12} = \frac{1}{2}</math> વર્ષ</p> <p>દર = 10%</p> $I = ₹ \frac{12000 \times 10 \times \frac{1}{2}}{100} = ₹ 600$ <p><math>A = P + I = ₹ 12,000 + ₹ 600</math></p> <p>= ₹ 12600 આ આગલા ૯ મહિના માટેનું મુદ્દલ છે.</p> $I = ₹ \frac{12600 \times 10 \times \frac{1}{2}}{100} = ₹ 630$ <p>ત્રીજા સમયગાળાનું મુદ્દલ = ₹ 12600 + ₹ 630</p> <p>= ₹ 13,230</p> $I = ₹ \frac{13230 \times 10 \times \frac{1}{2}}{100} = ₹ 661.50$ <p><math>A = P + I = ₹ 13230 + ₹ 661.50</math></p> <p>= ₹ 13891.50</p>



## પ્રયત્ન કરો

ચૂકવવાની રકમ શોધો.

1. ₹ 2400નું 2 વર્ષના અંતે 5% ના વાર્ષિક દરે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ
2. ₹ 1800નું 1 વર્ષના અંતે 8% ના ત્રિમાસિક દરે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ



**ઉદાહરણ 13 :** શિક્ષકે મયુરીને પ્રશ્ન કર્યો કે, જો ₹ 10,000નું 1 વર્ષ અને 3 મહિના માટે  $8\frac{1}{2}\%$  લેખે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે રોકાણ કર્યું હોય, તો તેનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

**ઉકેલ :** મયુરીએ સૌપ્રથમ સમયગાળાને વર્ષમાં રૂપાંતરિત કર્યો.

$$1 \text{ વર્ષ } 3 \text{ મહિના} = 1\frac{3}{12} \text{ વર્ષ} = 1\frac{1}{4} \text{ વર્ષ}$$

મયુરીએ બધી કિંમતો સૂત્રમાં મૂકી.

$$A = ₹ 10,000 \left(1 + \frac{17}{200}\right)^{1\frac{1}{4}}$$

હવે તે મૂંઝાઈ. તેણે તેના શિક્ષકને પૂછ્યું કે ઘાતાંકમાં અપૂર્ણાંક હોય તો શું કરવું ?

શિક્ષકે તેને સૂચન આપ્યું કે પૂરા સમય માટે મુદ્દલ શોધો. અહીં 1 વર્ષ અને પછી આ મુદ્દલનો ઉપયોગ કરી બીજા  $\frac{1}{4}$  વર્ષ માટે સાદું વ્યાજ શોધો.

$$\begin{aligned} A &= ₹ 10,000 \left(1 + \frac{17}{200}\right) \\ &= ₹ 10,000 \times \frac{217}{200} = ₹ 10,850 \end{aligned}$$



હવે આ રકમને  $\frac{1}{4}$  વર્ષ માટે મુદ્દલ તરીકે લઈ શકીએ. હવે આપણે ₹ 10,850નું સાદું વ્યાજ  $\frac{1}{4}$  વર્ષ માટે શોધીએ.

$$\begin{aligned} SI &= ₹ \frac{10,850 \times \frac{1}{4} \times 17}{100 \times 2} \\ &= ₹ \frac{10,850 \times 1 \times 17}{800} = ₹ 230.56 \end{aligned}$$

$$\text{પ્રથમ વર્ષનું વ્યાજ} = ₹ 10,850 - ₹ 10,000 = ₹ 850$$

$$\text{અને પછીના } \frac{1}{4} \text{ વર્ષ માટેનું વ્યાજ} = ₹ 230.56$$

$$\text{કુલ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ} = ₹ 850 + ₹ 230.56 = ₹ 1080.56$$

### 8.9 ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના સૂત્રની ઉપયોગિતા

ઘણી પરિસ્થિતિઓ એવી છે જેમાં આપણે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ(CI)માં વ્યાજમુદ્દલની ગણતરી કરવા માટેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અહીં થોડાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે.

- જનસંખ્યામાં વધારો (અથવા ઘટાડો)
- જો વિકાસનો દર ખબર હોય તો બેક્ટેરિયાનો વિકાસ જાણવા માટે.
- કોઈ પણ વસ્તુનું મૂલ્ય જાણવા, જો મધ્યવર્તી વર્ષોમાં તેની કિંમતમાં વધારો અથવા ઘટાડો થતો હોય.

**ઉદાહરણ 14 :** એક શહેરની જનસંખ્યા વર્ષ 1997 માં 20,000 હતી. તે વર્ષ દીઠ 5%ના દરે વધતી હતી. તો વર્ષ 2000ના અંતે શહેરની જનસંખ્યા શોધો.

**ઉકેલ :** અહીં જનસંખ્યામાં પ્રતિ વર્ષ 5%નો વધારો થાય છે. તેથી દર નવા વર્ષે નવી જનસંખ્યા મળે છે. તેથી આપણે કહી શકીએ કે વધારો ચક્રવૃદ્ધિ છે.

વર્ષ 1998 ની શરૂઆતમાં જનસંખ્યા = 20,000 (આને આપણે પ્રથમ વર્ષનું મુદ્દલ ગણીશું)

$$5\% \text{ નો વધારો} = \frac{5}{100} \times 20,000 = 1000$$

$$\text{વર્ષ 1999 માં જનસંખ્યા} = 20000 + 1000 = 21000$$

$$5\% \text{ નો વધારો} = \frac{5}{100} \times 21000 = 1050$$

$$\text{વર્ષ 2000ની જનસંખ્યા} = 21000 + 1050$$

$$= 22050$$

$$5\% \text{ નો વધારો} = \frac{5}{100} \times 22050$$

$$= 1102.5$$

$$\text{વર્ષ 2000ના અંતે જનસંખ્યા} = 22050 + 1102.5 = 23152.5$$

અથવા, સૂત્રની રીતે


$$\text{વર્ષ 2000ના અંતે જનસંખ્યા} = 20000 \left[ 1 + \frac{5}{100} \right]^3$$

$$= 2000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$$

$$= 23152.5$$

$$\text{તેથી અંદાજિત જનસંખ્યા} = 23153$$

અરુણાએ પૂછ્યું કે ઘટાડો થયો હોય તો શું કરવું ? શિક્ષકે નીચે મુજબનું ઉદાહરણ આપ્યું.



આને બીજા વર્ષ માટે મુદ્દલ લઈશું.

આને ત્રીજા વર્ષ માટે મુદ્દલ લઈશું.

**ઉદાહરણ 15 :** એક ટી.વી. ₹ 21,000 માં ખરીદવામાં આવ્યું હતું. એક વર્ષ પછી ટી.વી.ની કિંમતમાં 5% નો ઘટાડો થયો. એક વર્ષ પછીની ટી.વી.ની કિંમત શોધો.

**ઉકેલ :**

$$\begin{aligned} \text{મુદ્દલ} &= ₹ 21,000 \\ \text{ઘટાડો} &= \text{વાર્ષિક ₹ 21,000ના 5\%ના દરે} \\ &= \frac{21000 \times 5 \times 1}{100} = ₹ 1050 \end{aligned}$$

$$\text{એક વર્ષના અંતે ટી.વી.ની કિંમત} = ₹ 21,000 - ₹ 1050 = ₹ 19,950$$

એકંદરે, આ ઉકેલ નીચે મુજબ સીધી રીતે મેળવી શકીએ.

$$\text{એક વર્ષના અંતે ટી.વી.ની કિંમત} = ₹ 21,000 \times \left(1 - \frac{5}{100}\right)$$

$$= ₹ 21,000 \times \frac{19}{20} = ₹ 19,950$$



### પ્રયત્ન કરો

- ₹ 10,500 ની ચંત્રસામગ્રીમાં 5% નો ઘટાડો થયો. તો એક વર્ષ પછી તેની કિંમત શોધો.
- એક શહેરની હાલની જનસંખ્યા 12 લાખ છે, તેમાં પ્રતિ વર્ષ 4% નો વધારો થાય છે. તો બે વર્ષ પછી શહેરની જનસંખ્યા શોધો.



### સ્વાધ્યાય 8.3

1. વ્યાજમુદ્દલ (Amount) અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી કરો.

(a) ₹ 10,800, 3 વર્ષ માટે,  $12\frac{1}{2}\%$  વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે.

(b) ₹ 18,000,  $2\frac{1}{2}$  વર્ષ માટે, 10% વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે.

(c) ₹ 62,500,  $1\frac{1}{2}$  વર્ષ માટે, 8% અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે.

(d) ₹ 8000, 1 વર્ષ માટે, 9% અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે.


(તમે સાદા વ્યાજના સૂત્ર પ્રમાણે વર્ષ દીઠ ગણતરી કરી શકો છો.)

(e) ₹ 10,000, 1 વર્ષ માટે, 8% અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે.

2. કમલાએ સ્કૂટર ખરીદવા બેંકમાંથી ₹ 26,400 પ્રતિ વર્ષ 15%ના દરે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે લીધા. 2 વર્ષ અને 4 મહિના પછી ઉધાર ચૂકતે કરવા માટે તેણે કેટલી રકમ ચૂકવવી પડશે ?

(સૂચન : 2 વર્ષ માટે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની રીતે વ્યાજમુદ્દલ શોધો. આને ત્રીજા વર્ષનું મુદ્દલ ગણી  $\frac{4}{12}$  વર્ષ માટે સાદું વ્યાજ શોધો.)

3. ફેબીનાએ ₹ 12500 ત્રણ વર્ષ માટે 12%ના દરે સાદા વ્યાજે ઉધાર લીધા અને રાધાએ એ જ રકમ એ જ સમય માટે 10%ના દરે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે ઉધાર લીધી. કોણ વધારે વ્યાજ ચૂકવશે ? કેટલું ?
4. મેં જમશેદ પાસેથી ₹ 12,000 સાદા વ્યાજે 6%ના દરે 2 વર્ષ માટે ઉધાર લીધા. જો મેં આ જ રકમ 6%ના દરે પ્રતિ વર્ષના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે લીધી હોત તો કેટલી વધારાની કિંમત ચૂકવવી પડી હોત ?
5. વાસુદેવન ₹ 60,000 ને 12%ના દરે પ્રતિ વર્ષ અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે રોકે છે, તો તેને
  - (i) 6 મહિના પછી
  - (ii) એક વર્ષ પછી કેટલી રકમ મળશે ?
6. આરીફે બેંકમાંથી ₹ 80,000ની લોન લીધી. જો વ્યાજનો દર 10% પ્રતિ વર્ષ હોય, તો  $1\frac{1}{2}$  વર્ષ પછી ચૂકવવાની થતી રકમનો તફાવત નીચે મુજબ શોધો.
  - (i) વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ
  - (ii) અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ.
7. મારિયાએ ₹ 8000 વ્યવસાયમાં રોક્યા. તેને 5% પ્રતિ વર્ષના દરે કેટલું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ મળશે તે શોધો.
  - (i) બીજા વર્ષના અંતે તેના નામે કેટલી રકમ જમા થશે ?
  - (ii) ત્રીજા વર્ષનું વ્યાજ શોધો.
8. જો ₹ 10,000 ને  $1\frac{1}{2}$  વર્ષ માટે 10% ના દરે પ્રતિ વર્ષ અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે મૂકવામાં આવે. તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને વ્યાજમુદ્દલ શોધો. શું આ વ્યાજ તેના વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કરતાં વધુ હશે ?
9. જો રામ ₹ 4096, 12% પ્રતિ વર્ષના દરે વ્યાજે આપશે તો તેને 18 મહિનાના અંતે કુલ કેટલી રકમ મળશે ? (અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ છે.)
10. એક સ્થળની જનસંખ્યા વર્ષ 2003 માં 5% પ્રતિ વર્ષના દરે વધીને 54,000 થાય છે.
  - (i) 2001ની જનસંખ્યા શોધો.
  - (ii) 2005માં જનસંખ્યા શું હશે ?
11. એક પ્રયોગશાળામાં એક પ્રયોગમાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા પ્રતિ કલાકે 2.5%ના દરે વધતી હતી, જો પહેલાં બેક્ટેરિયાની સંખ્યા 5,06,000 હોય તો બે કલાક પછી બેક્ટેરિયાની સંખ્યા કેટલી હશે ?
12. એક સ્કૂટર ₹ 42,000 માં ખરીદવામાં આવ્યું. તેની કિંમતમાં 8%ના દરે પ્રતિ વર્ષનો ઘટાડો આવ્યો. તો એક વર્ષના અંતે તેની કિંમત શોધો.



## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. વળતર એટલે છાપેલી કિંમતમાં આપેલી છૂટ.  
વળતર = છાપેલી કિંમત - વેચાણ કિંમત
2. જ્યારે ટકાવારી આપી હોય ત્યારે વળતર શોધી શકાય.  
વળતર = છાપેલી કિંમત પર વળતરની ટકાવારી
3. વસ્તુ ખરીદ્યા બાદ જે વધારાનો ખર્ચ થયો હોય તેને મૂળ કિંમત સાથે જોડવામાં આવે છે તેને પડતર કિંમત કહે છે.  
પડતર કિંમત = ખરીદે કિંમત + વધારાનો ખર્ચ
4. જે તે વસ્તુના વેચાણ પર સરકાર દ્વારા વસુલવામાં આવતો કર એટલે વેચાણ કર. (ST)  
વેચાણ કર (ST) = બીલની રકમ પરનો કર (%માં)
5. GST અર્થાત્, વસ્તુ અને સેવા કર. આ કર વસ્તુની કિંમત કે સેવા કે બંને ઉપર વસુલ કરવામાં આવે છે.
6. ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ એવું વ્યાજ છે જેને ગણવા માટે આગળના વર્ષના વ્યાજમુદ્દલને મુદ્દલ તરીકે લેવામાં આવે છે. અર્થાત્  $(A = P + I)$ .
7. (i) વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પ્રમાણે,  

$$\text{વ્યાજમુદ્દલ} = P \cdot \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n ; \begin{cases} P = \text{મુદ્દલ, } R = \text{વ્યાજનો દર,} \\ n = \text{વર્ષની સંખ્યા} \end{cases}$$
(ii) અર્ધવાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પ્રમાણે,  

$$\text{વ્યાજમુદ્દલ} = P \cdot \left(1 + \frac{R}{200}\right)^{2n} \begin{cases} P = \text{મુદ્દલ, } \frac{R}{2} = \text{અર્ધવાર્ષિક દર} \\ 2n = \text{અડધા વર્ષોની સંખ્યા} \end{cases}$$









## બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ

### 9.1 પદાવલિઓ એટલે શું ?

વિદ્યાર્થીમિત્રો, આપણે અગાઉનાં ધોરણમાં બૈજિક પદાવલિઓ (Algebraic Expressions)નો પરિચય મેળવ્યો છે.

**ઉદાહરણ :**

$$x + 3, 2y - 5, 3x^2, 4xy + 7 \text{ વગેરે....}$$


તમે આવી ઘણી પદાવલિઓ બનાવી શકો. તમે જાણો છો કે દરેક પદાવલિ ચલ અને અચલને સાંકળવાથી મળે છે.  $2x + 3$ માં ચલ  $x$  અને અચલ 2 અને 3 છે જ્યારે  $4xy + 7$ માં ચલ  $x, y$  અને અચલ 4, 7 છે.

વળી, આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે, પદાવલિમાં રહેલા ચલની કિંમત કોઈ પણ હોઈ શકે, જેને અનુરૂપ પદાવલિની કિંમત પણ બદલાતી રહે. ઉદાહરણ તરીકે, પદાવલિ  $2y - 5$  માટે સમજાવે તો, જો  $y = 2$  તો  $2y - 5 = 2(2) - 5 = (-1)$ ,  $y = 0$  તો  $2y - 5 = 2(0) - 5 = (-5)$  વગેરે.

આમ, ચલ  $y$ ની કિંમત બદલાય તો તેને અનુરૂપ પદાવલિ  $2y - 5$ ની કિંમત પણ બદલાય. તો હવે,  $y$ ની અન્ય કિંમતો લઈને પદાવલિ  $2y - 5$ ની વિવિધ કિંમત મેળવવા પ્રયત્ન કરો.

**સંખ્યારેખા દ્વારા રજૂઆત**

સંખ્યારેખા પર ચલ  $x$ ની વિવિધ કિંમતો માટે પદાવલિની કિંમત શું હોઈ શકે તે સમજવા આપણે પદાવલિ  $x + 5$ નું ઉદાહરણ લઈએ.



ઉપરોક્ત આકૃતિ પરથી ખ્યાલ આવે છે કે, ચલ  $x$ નું સ્થાન X ઉપર છે તો તેને અનુરૂપ પદાવલિ  $x + 5$ નું સ્થાન P ઉપર જશે. અર્થાત્, X બિંદુથી 5 એકમ જમણી તરફ. આ જ રીતે પદાવલિ  $x - 4$  માટે વિચારીએ તો X થી 4 એકમ ડાબી તરફ મળે. જો પદાવલિ  $4x + 5$  માટે લઈએ તો, સૌપ્રથમ  $4x$ નું સ્થાન સુનિશ્ચિત કરવું પડે અને ત્યાર બાદ  $4x + 5$ નું સ્થાન નિશ્ચિત કરી શકાય.



ઉપરોક્ત આકૃતિમાં જોઈ શકાય છે કે, જો ચલનું સ્થાન બિંદુ X પર નિશ્ચિત કરીએ તો  $4x$ નું સ્થાન બિંદુ C પર અને પદાવલિ  $4x + 5$ નું સ્થાન બિંદુ D પર સુનિશ્ચિત થશે. ઉપરોક્ત બંને આકૃતિમાં ચલની ધન કિંમત લીધેલ છે. અર્થાત્  $x > 0$  છે. આપણે  $x < 0$  અર્થાત્ ઋણ કિંમત માટે પણ વિચારી શકીએ.





### પ્રયત્ન કરો

1. એક ચલ ધરાવતી વિવિધ પદાવલિનાં પાંચ ઉદાહરણ આપો.
2. બે ચલ ધરાવતી વિવિધ પદાવલિનાં પાંચ ઉદાહરણ આપો.
3. સંખ્યારેખા ઉપર  $x$ ,  $x - 4$ ,  $2x + 1$ ,  $3x - 2$  દર્શાવો.

### 9.2 પદ, અવયવ અને સહગુણક (Terms, Factors and Coefficients)

પદાવલિ  $4x + 5$  માં  $4x$  અને  $5$  એમ બે પદો છે. એટલે કે પદોને '+' કે '-' વડે જોડવાથી પદાવલિ મળે છે. આ પદ પોતે પણ બે કે તેથી વધુ અવયવોનો ગુણાકાર હોઈ શકે. અહીં, પદ  $4x$  એ  $4$  અને  $x$ નો ગુણાકાર છે. આમ,  $4$  અને  $x$  એ  $4x$ નાં અવયવ બને. તથા  $5$  એ સાંખ્યિક પદ છે.

પદાવલિ  $7xy - 5x$  માં  $7xy$  અને  $-5x$  એમ બે પદ છે. પદ  $7xy$  એ  $7$ ,  $x$  અને  $y$  એમ ત્રણ અવયવોનો ગુણાકાર છે જેમાં સાંખ્યિક અવયવને જે-તે પદનો સાંખ્યિક સહગુણક અથવા સહગુણક કહેવામાં આવે છે. પદ  $7xy$  માં  $7$  ને સહગુણક અને પદ  $-5x$  માં  $-5$  ને સહગુણક કહે છે.

### પ્રયત્ન કરો

પદાવલિ  $x^2y^2 - 10x^2y + 5xy^2 - 20$ ના દરેક પદના સહગુણક ઓળખો.

### 9.3 એકપદી, દ્વિપદી અને બહુપદી

જે પદાવલિમાં માત્ર એક જ પદ હોય તેવી પદાવલિને એકપદી (monomial) કહેવામાં આવે છે. આ જ રીતે બે પદ ધરાવતી પદાવલિને દ્વિપદી (binomial) કહે છે અને ત્રણ પદ ધરાવતી પદાવલિને ત્રિપદી (trinomial) કહે છે.

વ્યાપક સ્વરૂપે જોઈએ તો,

એક કે તેથી વધુ પદો કે જેના સહગુણકો શૂન્ય ન હોય (અને ચલના ઘાતાંક અનૂણ હોય) તેને બહુપદી કહેવાય. આમ, બહુપદીમાં પદોની સંખ્યા એક કે તેથી વધુ ગમે તેટલી હોઈ શકે.

ઉદાહરણ તરીકે,

એક પદી :  $4x^2$ ,  $3xy$ ,  $-7z$ ,  $5xy^2$ ,  $10y$ ,  $-9$ ,  $82mnp$  વગેરે...

દ્વિપદી :  $a + b$ ,  $4l + 5m$ ,  $a + 4$ ,  $5 - 3xy$ ,  $z^2 - 4y^2$  વગેરે...

ત્રિપદી :  $a + b + c$ ,  $2x + 3y - 5$ ,  $x^2y - xy^2 + y^2$  વગેરે...

બહુપદી :  $a + b + c + d$ ,  $3xy$ ,  $7xyz - 10$ ,  $2x + 3y + 7z + 10$  વગેરે....

### પ્રયત્ન કરો

1. નીચેની બહુપદીઓ પૈકી કઈ બહુપદી એકપદી, દ્વિપદી કે ત્રિપદી છે તે ઓળખો.  
 $-z + 5$ ,  $x + y + z$ ,  $y + z + 100$ ,  $ab - ac$ ,  $17$
2. ઉદાહરણ આપો :  
(a) માત્ર એક જ ચલ 'x' હોય તેવી 3 દ્વિપદી.  
(b) ચલ 'x' અને 'y' હોય તેવી 3 દ્વિપદી.  
(c) ચલ 'x' અને 'y' હોય તેવી 3 એકપદી.  
(d) 4 કે તેથી વધુ પદો ધરાવતી 2 બહુપદી.

### 9.4 સજાતીય અને વિજાતીય પદો

નીચેની પદાવલિઓનું અવલોકન કરો.

$7x$ ,  $14x$ ,  $-13x$ ,  $5x^2$ ,  $7y$ ,  $7xy$ ,  $-9y^2$ ,  $-9x^2$ ,  $-5yx$

ઉપરોક્ત પદાવલિઓ પૈકી સજાતીય પદો લઈએ તો,

- (i)  $7x$ ,  $14x$ ,  $-13x$  સજાતીય પદો છે.
- (ii)  $5x^2$  અને  $(-9x^2)$  પણ સજાતીય (Like Terms) પદો છે.
- (iii)  $7xy$  અને  $(-5yx)$  પણ સજાતીય પદો છે.



વિચારો....

- શા માટે  $7x$  અને  $7y$  સજાતીય પદો નથી ?  
 શા માટે  $7x$  અને  $7xy$  સજાતીય પદો નથી ?  
 શા માટે  $7x$  અને  $5x^2$  સજાતીય પદો નથી ?

### પ્રયત્ન કરો

નીચેનાં પદો પરથી બે સજાતીય પદો લખો :

- (i)  $7xy$  (ii)  $4mn^2$  (iii)  $2l$



## 9.5 બૈજિક પદાવલિઓના સરવાળા-બાદબાકી

આપણે અગાઉના ધોરણમાં બૈજિક પદાવલિઓના સરવાળા અને બાદબાકી શીખી ગયા છીએ.

ઉદાહરણ તરીકે,  $7x^2 - 4x + 5$  અને  $9x - 10$ નો સરવાળો કરવા,

$$\begin{array}{r} 7x^2 - 4x + 5 \\ + \quad 9x - 10 \\ \hline 7x^2 + 5x - 5 \end{array}$$

ઉપરોક્ત ગણતરીમાં આપણે કેવી રીતે સરવાળો કર્યો તેનું અવલોકન કરો. આપણે દરેક પદાવલિને હાર (Row) સ્વરૂપે અલગ લખીએ છીએ. આવું કરતી વખતે સજાતીય પદોને એકની નીચે એક એમ ગોઠવી સરવાળો કરીએ છીએ. આ માટે,  $5 + (-10) = +5 - 10 = -5$  તે જ રીતે,  $-4x + 9x = (-4 + 9)x = +5x$ . ચાલો, થોડા વધુ દૃષ્ટાંત જોઈએ.

**ઉદાહરણ 1 :**  $7xy + 5yz - 3zx$ ,  $4yz + 9zx - 4y$  અને  $-3xz + 5x - 2xy$ નો સરવાળો કરો.

**ઉકેલ :** સૌપ્રથમ આપણે ઉપરોક્ત ત્રણે પદાવલિઓના દરેક પદને એવી રીતે અલગ હારમાં ગોઠવીશું કે જેથી દરેક સજાતીય પદો એકબીજાની ઉપર-નીચે રહે.

$$\begin{array}{r} 7xy + 5yz - 3zx \\ + \quad 4yz + 9zx - 4y \\ + \quad -2xy - 3zx + 5x \\ \hline 5xy + 9yz + 3zx + 5x - 4y \end{array}$$

આમ, પદાવલિઓનો સરવાળો  $5xy + 9yz + 3zx + 5x - 4y$  મળે. અહીં આપણે નોંધ લઈએ કે, બીજી પદાવલિમાં  $-4y$  અને ત્રીજી પદાવલિમાં  $5x$  અલગ દર્શાવ્યા છે (શા માટે ?) કારણ કે આ બંને પદોના સજાતીય પદો બાકીની પદાવલિઓમાં નથી.

**ઉદાહરણ 2 :**  $7x^2 - 4xy + 8y^2 + 5x - 3y$ માંથી  $5x^2 - 4y^2 + 6y - 3$  બાદ કરો.

**ઉકેલ :**

$$\begin{array}{r} 7x^2 - 4xy + 8y^2 + 5x - 3y \\ 5x^2 - 4y^2 + 6y - 3 \\ (-) \quad (+) \quad (-) \quad (+) \\ \hline 2x^2 - 4xy + 12y^2 + 5x - 9y + 3 \end{array}$$

અહીં આપણે નોંધીએ કે કોઈપણ સંખ્યાની બાદબાકી કરવી એટલે તે સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યા ઉમેરવી. અહીં  $(-3)$  બાદ કરવા એટલે  $+3$  ઉમેરવા.  $6y$  બાદ કરવા એટલે  $(-6y)$  ઉમેરવા. આ જ રીતે  $(-4y^2)$  બાદ કરવા એટલે  $4y^2$  ઉમેરવા બરાબર થાય. ત્રીજી હરોળમાં દર્શાવેલ નિશાનીઓ  $(+, -)$  થી બીજી હરોળમાં રહેલા પદો સાથે કઈ ગાણિતિક ક્રિયા કરવી તે સ્પષ્ટ થાય છે.



## સ્વાધ્યાય 9.1

- નીચેની દરેક પદાવલિમાં રહેલ પદો અને સહગુણકો ઓળખો :
  - $5xyz^2 - 3zy$
  - $1 + x + x^2$
  - $4x^2y^2 - 4x^2y^2z^2 + z^2$
  - $3 - pq + qr - rp$
  - $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} - xy$
  - $0.3a - 0.6ab + 0.5b$
- નીચેની બહુપદીઓનું એકપદી, દ્વિપદી કે ત્રિપદીમાં વર્ગીકરણ કરો. કઈ બહુપદી ઉપરોક્ત ત્રણમાંથી એક પણ પ્રકારમાં બંધ બેસતી નથી ?
 


$x + y$ ,  $1000$ ,  $x + x^2 + x^3 + x^4$ ,  $7 + y + 5x$ ,  $2y - 3y^2$ ,  $2y - 3y^2 + 4y^3$ ,  $5x - 4y + 3xy$ ,  $4z - 15z^2$ ,  $ab + bc + cd + da$ ,  $pqr$ ,  $p^2q + pq^2$ ,  $2p + 2q$
- નીચેની બહુપદીઓના સરવાળા કરો :
  - $ab - bc$ ,  $bc - ca$ ,  $ca - ab$
  - $a - b + ab$ ,  $b - c + bc$ ,  $c - a + ac$
  - $2p^2q^2 - 3pq + 4$ ,  $5 + 7pq - 3p^2q^2$
  - $l^2 + m^2$ ,  $m^2 + n^2$ ,  $n^2 + l^2$ ,  $2lm + 2mn + 2nl$
- $12a - 9ab + 5b - 3$ માંથી  $4a - 7ab + 3b + 12$  બાદ કરો.
  - $5xy - 2yz - 2zx + 10xyz$ માંથી  $3xy + 5yz - 7zx$  બાદ કરો.
  - $18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq^2 + 5p^2q$ માંથી  $4p^2q - 3pq + 5pq^2 - 8p + 7q - 10$  બાદ કરો.

## 9.6 બેજિક પદાવલિઓના ગુણાકાર : પ્રસ્તાવના

- નીચે આપેલી બિંદુઓની ભાત જુઓ.

બિંદુઓની ભાત	કુલ બિંદુઓની સંખ્યા
	$4 \times 9$
	$5 \times 7$






કુલ બિંદુઓની સંખ્યા શોધવા માટે આપણે હારની સંખ્યા ( $m$ ) સાથે સ્તંભની સંખ્યા ( $n$ )નો ગુણાકાર કરવો પડે.

અહીં હારની સંખ્યામાં 2નો વધારો થાય છે. અર્થાત્ ( $m + 2$ ) અને સ્તંભની સંખ્યા 3 જેટલી વધે છે. અર્થાત્ ( $n + 3$ ) થશે.

- (ii) શું તમે અન્ય કોઈ એવી પરિસ્થિતિ વિચારી શકો જેમાં બે બૈજિક પદોનો ગુણાકાર કરવો પડે ?

**અમીના :** ‘આપણે લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ માટે વિચારી શકીએ.’ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ =  $l \times b$ , જ્યાં  $l$  એ લંબાઈ અને  $b$  એ પહોળાઈ છે. જો લંબાઈમાં 5 એકમનો વધારો કરીએ અર્થાત્ ( $l + 5$ ) લઈએ અને પહોળાઈમાં 3 એકમનો ઘટાડો કરીએ અર્થાત્ ( $b - 3$ ) લઈએ તો નવા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ  $(l + 5) \times (b - 3)$  (એકમ)<sup>2</sup> થશે.



લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે બૈજિક પદોનો ગુણાકાર કરવો પડે જેવા કે  $l \times b$  અથવા  $(l + 5) \times (b - 3)$

- (iii) શું તમે ઘનફળ વિશે વિચારી શકો ? (લંબઘનનું ઘનફળ એ તેની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈનો ગુણાકાર છે.)

- (iv) સરિતા એક ઉદાહરણ આપી સમજાવે છે કે, જ્યારે આપણે વસ્તુ ખરીદીએ છીએ ત્યારે કુલ ચૂકવવાની રકમ શોધવા ગુણાકાર કરવો પડે છે.

ઉદાહરણ : એક ડઝન કેળાની કિંમત = ₹  $p$

અને શાળા પ્રવાસ માટે જરૂરી કેળાં =  $z$  ડઝન

તો કુલ ચૂકવવાની રકમ = ₹  $p \times z$


ધારો કે કેળાંની કિંમતમાં ડઝન દીઠ ₹ 2નો ઘટાડો થાય છે અને જરૂરી કેળાંના જથ્થામાં

4 ડઝનનો ઘટાડો થાય છે.

તો, 1 ડઝન કેળાંની કિંમત = ₹ ( $p - 2$ )

અને કેળાંનો જરૂરી જથ્થો = ( $z - 4$ ) ડઝન થશે.

∴ કુલ ચૂકવવાની રકમ = ₹ ( $p - 2$ )  $\times$  ( $z - 4$ )





## પ્રયત્ન કરો

વિદ્યાર્થીમિત્રો, શું તમે આવી કોઈ અન્ય પરિસ્થિતિઓ વિશે વિચારી બે ઉદાહરણ આપી શકો જેમાં આપણે બૈજિક પદાવલિઓનો ગુણાકાર કરવો પડે ?

[સૂચન : ● સમય અને ઝડપ માટે વિચારો.

● સાદું વ્યાજ શોધવા માટે મુદ્દલ અને વ્યાજના દર વગેરે માટે વિચારો.]

ઉપરનાં તમામ ઉદાહરણો માટે બે કે તેથી વધુ બૈજિક પદોનો ગુણાકાર કરવો પડે. જો કોઈ વિગત બૈજિક પદાવલિ સ્વરૂપે આપેલ હોય તો આપણે તે શોધવા ગુણાકાર કરવો પડે. મતલબ કે આપણે ગુણાકાર શા માટે કરવો ? કેમ કરવો ? તે જાણીએ છીએ. ચાલો આપણે આ પદ્ધતિસર કરીએ. શરૂઆતમાં આપણે બે એકપદીના ગુણાકાર કેવી રીતે કરવા તે જોઈશું.

## 9.7 એકપદીનો એકપદી સાથે ગુણાકાર

### 9.7.1 બે એકપદીનો ગુણાકાર

$$4 \times x = x + x + x + x = 4x$$

$$\text{તે જ રીતે, } 4 \times (3x) = 3x + 3x + 3x + 3x = 12x$$

હવે, નીચેના ગુણાકાર જુઓ :

$$(i) \quad x \times 3y = x \times 3 \times y = 3 \times x \times y = 3xy$$

$$(ii) \quad 5x \times 3y = 5 \times x \times 3 \times y = 3 \times 5 \times x \times y = 15xy$$

$$(iii) \quad 5x \times (-3y) = 5 \times x \times (-3) \times y \\ = (-3) \times (5) \times x \times y \\ = (-15xy)$$

થોડાં વધારે ઉપયોગી ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે :

$$(iv) \quad 5x \times 4x^2 = (5 \times 4) (x \times x^2) \\ = 20 \times x^3 = 20x^3$$

$$(v) \quad 5x \times (-4xyz) = (5 \times -4) \times (x \times xyz) \\ = -20 \times (x \times x \times yz) \\ = -20x^2yz$$

અહીં, આપણે એ અવલોકન કરવું જોઈએ કે બે પદાવલિના ગુણાકારમાં જે બૈજિક ભાગ છે તેમાં અલગ-અલગ ચલના ઘાતાંક કેવી રીતે મેળવાય છે.

આવું કરવા માટે ઘાત અને ઘાતાંકના નિયમોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

### 9.7.2 ત્રણ કે તેથી વધુ એકપદીના ગુણાકાર

નીચેનાં ઉદાહરણો જુઓ :

$$(i) \quad 2x \times 5y \times 7z = (2x \times 5y) \times 7z \\ = 10xy \times 7z \\ = 70xyz$$

$$(ii) \quad 4xy \times 5x^2y^2 \times 6x^3y^3 = (4xy \times 5x^2y^2) \times 6x^3y^3 \\ = 20x^3y^3 \times 6x^3y^3 = 120x^3y^3 \times x^3y^3 \\ = 120 (x^3 \times x^3)(y^3 \times y^3) = 120x^6 \times y^6 = 120x^6y^6$$

અહીં એ સ્પષ્ટ છે કે, ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં ઉકેલ મેળવવા આપેલ એકપદીઓ પૈકી પ્રથમ અને દ્વિતીય એકપદીનો ગુણાકાર કરીએ છીએ અને ત્યાર બાદ જે જવાબ મળે તેને ત્રીજી એકપદી સાથે ગુણીએ છીએ. આ જ પદ્ધતિથી ગમે તેટલી એકપદીઓનો ગુણાકાર પણ મેળવી શકાય.

અહીં, નોંધીએ કે બધા જ ગુણાકારના જવાબ :  $3xy$ ,  $15xy$  અને  $(-15xy)$  પણ એકપદી જ છે.

અહીં,  $5 \times 4 = 20$  અર્થાત્, પદાવલિના ગુણાકારનો સહગુણક = પ્રથમ એકપદીનો સહગુણક  $\times$  બીજી એકપદીનો સહગુણક અને,  $x \times x^2 = x^3$  અર્થાત્, પદાવલિના ગુણાકારનો બૈજિક અવયવ = પ્રથમ એકપદીનો બૈજિક અવયવ  $\times$  બીજી એકપદીનો બૈજિક અવયવ

### પ્રયત્ન કરો

- $4x \times 5y \times 7z$  શોધો.
- $(4x \times 5y)$  શોધી તેને  $7z$ થી ગુણો.  
અથવા  $(5y \times 7z)$  શોધી તેને  $4x$  વડે ગુણો.  
શું ઉપરોક્ત બંને પરિણામ સરખાં છે ?  
તેના પરથી તમે શું તારણ આપશો ?

આપણે નીચેની રીતે પણ ગુણાકાર શોધી શકીએ :

$$4xy \times 5x^2y^2 \times 6x^3y^3$$

$$= (4 \times 5 \times 6) \times (x \times x^2 \times x^3) \times (y \times y^2 \times y^3) = 120x^6y^6$$

**ઉદાહરણ 3 :** નીચેના કોષ્ટકમાં લંબચોરસ માટે આપેલી લંબાઈ અને પહોળાઈનાં માપ પરથી લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

ઉકેલ :

લંબાઈ	પહોળાઈ	ક્ષેત્રફળ
$3x$	$5y$	$3x \times 5y = 15xy$
$9y$	$4y^2$	.....
$4ab$	$5bc$	.....
$2l^2m$	$3lm^2$	.....



**ઉદાહરણ 4 :** નીચેના કોષ્ટકમાં લંબઘન માટે આપેલી લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈના માપ પરથી લંબઘનનું ઘનફળ શોધો.

	લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	ઘનફળ
(i)	$2ax$	$3by$	$5cz$	.....
(ii)	$m^2n$	$n^2p$	$p^2m$	.....
(iii)	$2q$	$4q^2$	$8q^3$	.....

ઉકેલ : ઘનફળ = લંબાઈ  $\times$  પહોળાઈ  $\times$  ઊંચાઈ  
તેથી,

$$(1) \text{ ઘનફળ} = (2ax) \times (3by) \times (5cz)$$

$$= (2 \times 3 \times 5) (ax)(by)(cz)$$

$$= 30 abcxyz$$

$$(2) \text{ ઘનફળ} = (m^2n)(n^2p)(p^2m)$$

$$= (m^2 \times m) \times (n \times n^2) \times (p \times p^2)$$

$$= m^3n^3p^3$$

$$(3) \text{ ઘનફળ} = 2q \times 4q^2 \times 8q^3$$

$$= 2 \times 4 \times 8 \times q \times q^2 \times q^3$$

$$= 64q^6$$

## સ્વાધ્યાય 9.2

1. નીચે આપેલી એકપદીઓની જોડનો ગુણાકાર શોધો.

- (i)  $4, 7p$       (ii)  $-4p, 7p$       (iii)  $-4p, 7pq$       (iv)  $4p^3, -3p$   
(v)  $4p, 0$

2. લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈનાં માપ માટે નીચે આપેલી એકપદીની જોડનો ઉપયોગ કરીને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- $(p, q); (10m, 5n); (20x^2, 5y^2); (4x, 3x^2); (3mn, 4np)$

3. ગુણાકાર કરી કોષ્ટક પૂર્ણ કરો.

પ્રથમ એકપદી→ બીજી એકપદી↓	2x	-5y	3x <sup>2</sup>	-4xy	7x <sup>2</sup> y	-9x <sup>2</sup> y <sup>2</sup>
2x	4x <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....	.....
-5y	.....	.....	-15x <sup>2</sup> y	.....	.....	.....
3x <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-4xy	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7x <sup>2</sup> y	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-9x <sup>2</sup> y <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....	.....	.....

4. લંબઘનની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈના માપ અનુક્રમે નીચે મુજબ છે, તેના પરથી ઘનફળ શોધો.

(i) 5a, 3a<sup>2</sup>, 7a<sup>4</sup> (ii) 2p, 4q, 8r (iii) xy, 2x<sup>2</sup>y, 2xy<sup>2</sup> (iv) a, 2b, 3c

5. ગુણાકાર શોધો.

(i) xy, yz, zx (ii) a, -a<sup>2</sup>, a<sup>3</sup> (iii) 2, 4y, 8y<sup>2</sup>, 16y<sup>3</sup>

(iv) a, 2b, 3c, 6abc (v) m, -mn, mnp

## 9.8 એકપદીનો બહુપદી સાથે ગુણાકાર

### 9.8.1 એકપદીનો દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર

મિત્રો, અહીં આપણે એકપદી 3xને દ્વિપદી 5y + 2 સાથે ગુણીએ. અર્થાત્, 3x × (5y + 2) = ? અહીં, યાદ રાખીએ કે 3x અને (5y + 2) એ સંખ્યા દર્શાવે છે. આથી વિભાજનના નિયમનો ઉપયોગ કરતાં, 3x × (5y + 2) = (3x × 5y) + (3x × 2) = 15xy + 6x



સામાન્ય રીતે આપણે ગણતરી દરમિયાન વિભાજનના નિયમનો

ઉપયોગ કરીએ જ છીએ. ઉદાહરણ

$$\begin{aligned}
 7 \times 106 &= 7 \times (100 + 6) \\
 &= (7 \times 100) + (7 \times 6) \text{ (વિભાજનનાં નિયમનો ઉપયોગ કરતાં)} \\
 &= 700 + 42 \\
 &= 742 \\
 7 \times 38 &= 7 \times (40 - 2) \\
 &= (7 \times 40) - (7 \times 2) \text{ (વિભાજનનાં નિયમનો ઉપયોગ કરતાં)} \\
 &= 280 - 14 = 266
 \end{aligned}$$

આ જ રીતે,  $-3x \times (-5y + 2) = (-3x) \times (-5y) + (-3x) \times (2) = 15xy - 6x$

અને,  $5xy \times (y^2 + 3) = (5xy \times y^2) + (5xy \times 3) = 5xy^3 + 15xy$

મિત્રો, દ્વિપદી × એકપદી માટે શું કહી શકાય ? ઉદાહરણ તરીકે,  $(5y + 2) \times 3x = ?$

અહીં, ક્રમના નિયમનો ઉપયોગ કરી શકાય :  $7 \times 3 = 3 \times 7$  અથવા વ્યાપક સ્વરૂપે :

$a \times b = b \times a$  આ જ રીતે,  $(5y + 2) \times 3x = 3x \times (5y + 2) = 15xy + 6x$



### પ્રયત્ન કરો

ગુણાકાર શોધો : (i) 2x(3x + 5xy) (ii) a<sup>2</sup>(2ab - 5c)

### 9.8.2 એકપદીનો ત્રિપદી સાથે ગુણાકાર

$3p \times (4p^2 + 5p + 7)$  વિચારો. અગાઉના કિસ્સા મુજબ, આપણે વિભાજનના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ.

$$\begin{aligned} 3p \times (4p^2 + 5p + 7) &= (3p \times 4p^2) + (3p \times 5p) + (3p \times 7) \\ &= 12p^3 + 15p^2 + 21p \end{aligned}$$

ત્રિપદી (Trinomial)ના દરેક પદને એકપદી (Monomial) વડે ગુણો અને પછી સરવાળો કરો.

અહીં અવલોકન કરો કે વિભાજનના નિયમનો ઉપયોગ કરીને આપણે તબક્કાવાર પદોનો ગુણાકાર મેળવી શકીએ છીએ.

પ્રયત્ન કરો

ગુણાકાર શોધો :  
 $(4p^2 + 5p + 7) \times 3p$

**ઉદાહરણ 5 :** આપેલ પદાવલિનું સરળ સ્વરૂપ આપો અને નિર્દેશ અનુસાર કિંમત મેળવો.

(i)  $x(x - 3) + 2$ ,  $x = 1$  માટે      (ii)  $3y(2y - 7) - 3(y - 4) - 63$ ,  $y = (-2)$  માટે

**ઉકેલ :**

$$\begin{aligned} \text{(i) } x(x - 3) + 2 &= x^2 - 3x + 2 \\ x = 1 \text{ માટે,} \quad &x^2 - 3x + 2 = (1)^2 - 3(1) + 2 \\ &= 1 - 3 + 2 \\ &= 3 - 3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } 3y(2y - 7) - 3(y - 4) - 63 &= 6y^2 - 21y - 3y + 12 - 63 \\ &= 6y^2 - 24y - 51 \\ y = (-2) \text{ માટે,} \quad &= 6y^2 - 24y - 51 \\ &= 6(-2)^2 - 24(-2) - 51 \\ &= 6 \times 4 + 24 \times 2 - 51 \\ &= 24 + 48 - 51 = 72 - 51 = 21 \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 6 :** સરવાળો કરો :

(i)  $5m(3 - m)$  અને  $6m^2 - 13m$       (ii)  $4y(3y^2 + 5y - 7)$  અને  $2(y^3 - 4y^2 + 5)$

**ઉકેલ :**

$$\text{(i) પ્રથમ પદાવલિ} = 5m(3 - m) = (5m \times 3) - (5m \times m) = 15m - 5m^2$$

$$\text{હવે, બીજી પદાવલિ ઉમેરતાં, } 15m - 5m^2 + 6m^2 - 13m = m^2 + 2m$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) પ્રથમ પદાવલિ} &= 4y(3y^2 + 5y - 7) \\ &= (4y \times 3y^2) + (4y \times 5y) + (4y \times (-7)) \\ &= 12y^3 + 20y^2 - 28y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{બીજી પદાવલિ} &= 2(y^3 - 4y^2 + 5) \\ &= 2y^3 + 2(-4y^2) + 2 \times 5 \\ &= 2y^3 - 8y^2 + 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{હવે, બંને પદાવલિનો સરવાળો કરતાં, } &12y^3 + 20y^2 - 28y \\ &+ 2y^3 - 8y^2 \quad + 10 \\ \hline &14y^3 + 12y^2 - 28y + 10 \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 7 :**  $2pq(p + q)$ માંથી  $3pq(p - q)$  બાદ કરો.

**ઉકેલ :** અહીં,  $3pq(p - q) = 3p^2q - 3pq^2$  અને  $2pq(p + q) = 2p^2q + 2pq^2$

$$\begin{aligned} &\text{બાદબાકી કરતાં, } 2p^2q + 2pq^2 \\ &3p^2q - 3pq^2 \\ &- \quad + \\ \hline &-p^2q + 5pq^2 \end{aligned}$$



## સ્વાધ્યાય 9.3



- નીચેની પદાવલિઓની દરેક જોડ માટે ગુણાકાર મેળવો.
  - $4p, q + r$
  - $ab, a - b$
  - $a + b, 7a^2b^2$
  - $a^2 - 9, 4a$
  - $pq + qr + rp, 0$
- કોષ્ટક પૂર્ણ કરો.

ક્રમ	પ્રથમ પદાવલિ	બીજી પદાવલિ	ગુણાકાર
(i)	$a$	$b + c + d$	...
(ii)	$x + y - 5$	$5xy$	...
(iii)	$p$	$6p^2 - 7p + 5$	...
(iv)	$4p^2q^2$	$p^2 - q^2$	...
(v)	$a + b + c$	$abc$	...

- ગુણાકાર શોધો.

- $(a^2) \times (2a^{22}) \times (4a^{26})$
- $\left(\frac{2}{3}xy\right) \times \left(\frac{-9}{10}x^2y^2\right)$

- $\left(-\frac{10}{3}pq^3\right) \times \left(\frac{6}{5}p^3q\right)$
- $x \times x^2 \times x^3 \times x^4$

- $3x(4x - 5) + 3$ નું સાદું રૂપ આપો અને (i)  $x = 3$  (ii)  $x = \frac{1}{2}$  માટે તેની કિંમત શોધો.
  - $a(a^2 + a + 1) + 5$ નું સાદું રૂપ આપો અને (i)  $a = 0$  (ii)  $a = 1$  (iii)  $a = (-1)$  માટે તેની કિંમત શોધો.

- સરવાળો કરો :  $p(p - q), q(q - r)$  અને  $r(r - p)$
  - સરવાળો કરો :  $2x(z - x - y)$  અને  $2y(z - y - x)$
  - બાદબાકી કરો :  $4l(10n - 3m + 2l)$ માંથી  $3l(l - 4m + 5n)$
  - બાદબાકી કરો :  $4c(-a + b + c)$ માંથી  $3a(a + b + c) - 2b(a - b + c)$

## 9.9 બહુપદીનો બહુપદી સાથે ગુણાકાર

## 9.9.1 દ્વિપદીનો દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર

અહીં આપણે, દ્વિપદી  $(2a + 3b)$ નો બીજી કોઈ દ્વિપદી  $(3a + 4b)$  સાથે ગુણાકાર કરીએ. અગાઉના કિસ્સામાં જેમ ગણતરી કરી છે તે જ રીતે અહીં તબક્કાવાર ગણતરી કરીશું. ગુણાકાર માટે વિભાજનના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો,

$$(3a + 4b) \times (2a + 3b) = 3a \times (2a + 3b) + 4b(2a + 3b)$$

જુઓ કે, પ્રથમ દ્વિપદીના દરેક પદનો બીજી દ્વિપદીના દરેક પદ સાથે ગુણાકાર થાય છે.

$$\begin{aligned} &= (3a \times 2a) + (3a \times 3b) + (4b \times 2a) + (4b \times 3b) \\ &= 6a^2 + 9ab + 8ba + 12b^2 \\ &= 6a^2 + 17ab + 12b^2 \quad (\because ba = ab) \end{aligned}$$

જ્યારે આપણે દરેક પદનો ગુણાકાર લઈએ છીએ, ત્યારે આપણે સ્વીકારીએ છીએ કે અહીં,  $2 \times 2 = 4$  પદો છે. પરંતુ, તે પૈકીના બે પદ સજાતીય પદો છે. જે પરસ્પર જોડાય છે અને તેથી છેલ્લે ત્રણ પદ મળે છે. આમ, જ્યારે બહુપદી સાથે બહુપદીનો ગુણાકાર કરીએ ત્યારે આપણે હંમેશાં સજાતીય પદો શોધવાં જોઈએ અને જો હોય, તો તેઓને પરસ્પર જોડવા જોઈએ. (સરવાળા દ્વારા કે બાદબાકી દ્વારા)

**ઉદાહરણ 8 :** ગુણાકાર કરો.

(i)  $(x - 4)$  અને  $(2x + 3)$     (ii)  $(x - y)$  અને  $(3x + 5y)$

**ઉકેલ :**

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad (x - 4) \times (2x + 3) &= x \times (2x + 3) - 4 \times (2x + 3) \\ &= (x \times 2x) + (x \times 3) - (4 \times 2x) - (4 \times 3) \\ &= 2x^2 + 3x - 8x - 12 \\ &= 2x^2 - 5x - 12 \text{ [સજાતીય પદોનું સાદું રૂપ આપતાં]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad (x - y) \times (3x + 5y) &= x \times (3x + 5y) - y \times (3x + 5y) \\ &= (x \times 3x) + (x \times 5y) - (y \times 3x) - (y \times 5y) \\ &= 3x^2 + 5xy - 3yx - 5y^2 \\ &= 3x^2 + 2xy - 5y^2 \text{ [સજાતીય પદોનું સાદું રૂપ આપતાં]} \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 9 :** ગુણાકાર કરો.

(i)  $(a + 7)$  અને  $(b - 5)$     (ii)  $(a^2 + 2b^2)$  અને  $(5a - 3b)$

**ઉકેલ :**

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad (a + 7) \times (b - 5) &= a \times (b - 5) + 7(b - 5) \\ &= ab - 5a + 7b - 35 \end{aligned}$$

(અહીં, આ ગુણાકારમાં કોઈ સજાતીય પદો નથી તેની નોંધ લઈએ.)

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad (a^2 + 2b^2) \times (5a - 3b) &= a^2 \times (5a - 3b) + 2b^2(5a - 3b) \\ &= 5a^3 - 3a^2b + 10ab^2 - 6b^3 \end{aligned}$$

### 9.9.2 દ્વિપદીનો ત્રિપદી સાથે ગુણાકાર

આ ગુણાકારમાં આપણે ત્રિપદીના દરેક ત્રણ પદોને દ્વિપદીના બંને પદો સાથે ગુણવા જોઈએ. જેથી કુલ  $(2 \times 3) = 6$  પદો મળશે. વળી, જો સજાતીય પદો હશે તો 6 પદોને બદલે ઉકેલમાં 5 કે તેથી ઓછા પદો મળશે.

ધારો કે,

$$\begin{aligned} \therefore (a + 7) \times (a^2 + 3a + 5) &= a \times (a^2 + 3a + 5) + 7 \times (a^2 + 3a + 5) \text{ (}\because \text{ વિભાજનનો નિયમ)} \\ \text{દ્વિપદી} \quad \quad \quad \text{ત્રિપદી} &= a^3 + 3a^2 + 5a + 7a^2 + 21a + 35 \\ &= a^3 + (3a^2 + 7a^2) + (5a + 21a) + 35 \\ &= a^3 + 10a^2 + 26a + 35 \text{ (શા માટે જવાબમાં માત્ર 4 પદો છે ?)} \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 10 :**  $(a + b)(2a - 3b + c) - (2a - 3b)c$ નું સાદું રૂપ આપો.

**ઉકેલ :** અહીં,

$$\begin{aligned} (a + b)(2a - 3b + c) &= a(2a - 3b + c) + b(2a - 3b + c) \\ &= 2a^2 - 3ab + ac + 2ab - 3b^2 + bc \\ &= 2a^2 - ab - 3b^2 + bc + ac \\ &\quad \text{(અહીં } -3ab \text{ અને } 2ab \text{ સજાતીય પદો છે.)} \end{aligned}$$

અને,  $(2a - 3b)c = 2ac - 3bc$

તેથી

$$\begin{aligned} (a + b)(2a - 3b + c) - (2a - 3b)c &= 2a^2 - ab - 3b^2 + bc + ac - (2ac - 3bc) \\ &= 2a^2 - ab - 3b^2 + bc + ac - 2ac + 3bc \\ &= 2a^2 - ab - 3b^2 + (bc + 3bc) + (ac - 2ac) \\ &= 2a^2 - 3b^2 - ab + 4bc - ac \end{aligned}$$



## સ્વાધ્યાય 9.4

- દ્વિપદીનો ગુણાકાર કરો.
  - $(2x + 5)$  અને  $(4x - 3)$
  - $(y - 8)$  અને  $(3y - 4)$
  - $(2.5l - 0.5m)$  અને  $(2.5l + 0.5m)$
  - $(a + 3b)$  અને  $(x + 5)$
  - $(2pq + 3q^2)$  અને  $(3pq - 2q^2)$
  - $\left(\frac{3}{4}a^2 + 3b^2\right)$  અને  $4\left(a^2 - \frac{2}{3}b^2\right)$
- ગુણાકાર શોધો.
  - $(5 - 2x)(3 + x)$
  - $(x + 7y)(7x - y)$
  - $(a^2 + b)(a + b^2)$
  - $(p^2 - q^2)(2p + q)$
- સાદું રૂપ આપો :
  - $(x^2 - 5)(x + 5) + 25$
  - $(a^2 + 5)(b^3 + 3) + 5$
  - $(t + s^2)(t^2 - s)$
  - $(a + b)(c - d) + (a - b)(c + d) + 2(ac + bd)$
  - $(x + y)(2x + y) + (x + 2y)(x - y)$
  - $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$
  - $(1.5x - 4y)(1.5x + 4y + 3) - 4.5x + 12y$
  - $(a + b + c)(a + b - c)$

### 9.10 નિત્યસમ એટલે શું ?

વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં નિત્યસમને સમજવા આપણે એક સમતા લઈએ.

$(a + 1)(a + 2) = a^2 + 3a + 2$  અહીં, આપણે આ સમતાની બંને બાજુઓ માટે  $a = 10$  લઈ કિંમત શોધીએ.

$$\text{ડા. બા.} = (a + 1)(a + 2) = (10 + 1)(10 + 2) = 11 \times 12 = 132$$

$$\text{જ. બા.} = a^2 + 3a + 2 = (10)^2 + 3(10) + 2 = 100 + 30 + 2 = 132$$

આમ,  $a = 10$  માટે આ સમતાની બંને બાજુની કિંમતો સરખી છે.

હવે આપણે  $a = -5$  લઈએ

$$\text{ડા. બા.} = (a + 1)(a + 2) = (-5 + 1)(-5 + 2) = (-4) \times (-3) = 12$$

$$\text{જ. બા.} = a^2 + 3a + 2 = (-5)^2 + 3(-5) + 2 = 25 - 15 + 2 = 10 + 2 = 12$$

તેથી  $a = -5$  લઈએ તોપણ ડા.બા. = જ.બા. મળે.

તો અહીં, તારવી શકીએ કે  $a$ ની કોઈ પણ કિંમત માટે આપેલ સમતાની ડા.બા. = જ.બા. મળે.

આમ, એવી સમતા કે જેમાં આપેલા ચલની કોઈ પણ કિંમત માટે તે સાચી હોય તો તેને નિત્યસમ (Identity) કહે છે.

આમ,  $(a + 1)(a + 2) = a^2 + 3a + 2$  એ એક નિત્યસમ છે.

આપણે એ પણ નોંધીએ કે, કોઈ પણ સમીકરણ એ તેમાં આપેલા ચલની કોઈ ચોક્કસ કિંમતો માટે જ સાચા હોય છે. તે જે-તે ચલની બધી જ કિંમતો માટે સાચા હોતા નથી.

દૃષ્ટાંત તરીકે,  $a^2 + 3a + 2 = 132$

ઉપરોક્ત સમીકરણ  $a = 10$  માટે સાચું છે. પરંતુ તે  $a = -5$  અથવા  $a = 0$  વિગેરે માટે સાચું નથી.

ચકાસો :  $a^2 + 3a + 2 = 132$  એ  $a = -5$  અને  $a = 0$  માટે સાચું નથી.

### 9.11 પ્રમાણિત નિત્યસમ

આપણે હવે, ખૂબ જ અગત્યનાં ત્રણ નિત્યસમનો અભ્યાસ કરીશું, જે આપણા કાર્યમાં ખૂબ ઉપયોગી થશે. આ નિત્યસમ આપણે દ્વિપદીનો દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર કરીને મેળવીશું.

- સૌપ્રથમ  $(a + b)(a + b)$  અથવા  $(a + b)^2$  મેળવીએ.

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= (a + b)(a + b) \\ &= a(a + b) + b(a + b) \\ &= a^2 + ab + ba + b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \quad (\because ab = ba)\end{aligned}$$

આમ,  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  (I)

અહીં, એ સ્પષ્ટ છે કે જ.બા.ની પદાવલિ એ ડા.બા.ની પદાવલિના ખરેખર ગુણાકારથી જ મળે છે જેથી તે નિત્યસમ છે. અહીં, આપણે ચલ 'a' અને 'b'ની કોઈ પણ કિંમત લઈએ તો પણ બંને બાજુઓની કિંમત એકસમાન જ મળે છે. અર્થાત્, ડા.બા. = જ.બા. થાય છે.

(i)  $a = 2, b = 3$  (ઉકેલ : 25) (ii)  $a = 5, b = 2$  (ઉકેલ : 49)

- હવે, આપણે  $(a - b)^2$  માટે વિચારીએ.

$$\begin{aligned}(a - b)^2 &= (a - b)(a - b) = a(a - b) - b(a - b) \\ &= a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2\end{aligned} \quad \text{(II)}$$

આમ,  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

- છેલ્લે,  $(a + b)(a - b)$  માટે વિચારો.  $(a + b)(a - b) = a(a - b) + b(a - b)$   
 $= a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2$  ( $\because ab = ba$ )

આમ,  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$  (III)

ઉપરોક્ત નિત્યસમ (I), (II) અને (III) એ પ્રમાણિત નિત્યસમ તરીકે ઓળખાય છે.

### પ્રયત્ન કરો

1. નિત્યસમ (I)માં  $b$ ને બદલે  $(-b)$  મૂકો. શું તમોને નિત્યસમ (II) મળશે ?

- હવે, આપણે એક વધુ ઉપયોગી નિત્યસમ માટે પ્રયત્ન કરીએ.

$$\begin{aligned}(x + a)(x + b) &= x(x + b) + a(x + b) \\ &= x^2 + bx + ax + ab \\ &= x^2 + (b + a)x + ab\end{aligned}$$

આમ,  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$  (IV)

### પ્રયત્ન કરો

1.  $a = 2, b = 3, x = 5$  માટે નિત્યસમ (IV) ચકાસો.
2. નિત્યસમ (IV)માં ખાસ કિસ્સા માટે  $a = b$  લો. તમને શું મળે છે ? શું તેને નિત્યસમ (I) સાથે કંઈ સંબંધ છે ?
3. નિત્યસમ (IV)માં ખાસ કિસ્સા માટે  $a = -c$  અને  $b = -c$  લો. તમને શું મળે છે ? શું તેને નિત્યસમ (II) સાથે કોઈ સંબંધ છે ?
4. નિત્યસમ (IV)માં ખાસ કિસ્સા માટે  $b = -a$  લો. તમને શું મળે છે ? શું તેને નિત્યસમ (III) સાથે કોઈ સંબંધ છે ?

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, નિત્યસમ (IV) એ નિત્યસમ (I), (II), (III)નું સામાન્ય સ્વરૂપ છે.

### 9.12 નિત્યસમની ઉપયોગિતા

હવે આપણે જોઈશું કે દ્વિપદીના ગુણાકાર તથા સંખ્યાઓના ગુણાકાર આધારિત કોયડાઓના ઉકેલ માટે નિત્યસમનો ઉપયોગ એ એક સરળ વૈકલ્પિક રીત છે.





**ઉદાહરણ 11 :** નિત્યસમ (I)નો ઉપયોગ કરીને સાદું રૂપ આપો. (i)  $(2x + 3y)^2$  (ii)  $103^2$

**ઉકેલ :**

$$(i) \quad (2x + 3y)^2 = (2x)^2 + 2(2x)(3y) + (3y)^2 \quad [\text{નિત્યસમ (I)નો ઉપયોગ કરતાં}]$$

$$= 4x^2 + 12xy + 9y^2$$

અહીં, આપણે નિત્યસમના ઉપયોગ વગર સીધી રીતે પણ ગણતરી કરી શકીએ.

$$(2x + 3y)^2 = (2x + 3y)(2x + 3y)$$

$$= (2x)(2x) + (2x)(3y) + (3y)(2x) + (3y)(3y)$$

$$= 4x^2 + 6xy + 6yx + 9y^2$$

$$= 4x^2 + 12xy + 9y^2 \quad (\because yx = xy)$$

નિત્યસમ (I)ના ઉપયોગથી આપણને  $(2x + 3y)$ નો વર્ગ કરવાની એક વૈકલ્પિક રીત મળે છે. શું તમે નોંધ્યું કે નિત્યસમની રીતમાં સીધી રીત કરતાં ઓછાં પગથિયાં છે ? તમે અનુભવશો કે  $(2x + 3y)$  કરતાં વધુ જટીલ (સંકીર્ણ) દ્વિપદીના વર્ગ કરવા માટે પણ આ રીત વધુ સરળ છે.

$$(ii) \quad (103)^2 = (100 + 3)^2$$

$$= (100)^2 + 2(100)(3) + (3)^2 \quad [\text{નિત્યસમ (I)નો ઉપયોગ કરતાં}]$$

$$= 10,000 + 600 + 9$$

$$= 10,609$$

અહીં, આપણે  $(103 \times 103)$  કરીને પણ ઉકેલ મેળવી શકીએ. પરંતુ તમે જોશો કે સીધી રીતે ગુણાકાર કરીને 103 નો વર્ગ કરવાની રીત કરતાં નિત્યસમ (I) નો ઉપયોગ કરવાથી વધુ સરળતા રહે છે. આ રીતે 1013 નો વર્ગ જાતે મેળવો.

તમે આ કિસ્સામાં એ પણ જોશો કે, સીધી રીતે ગુણાકાર કરીને ઉકેલ મેળવવાની રીત કરતાં નિત્યસમના ઉપયોગવાળી રીત વધુ આકર્ષક પણ છે.

**ઉદાહરણ 12 :** નિત્યસમ (II)નો ઉપયોગ કરીને, (i)  $(4p - 3q)^2$  (ii)  $(4.9)^2$  શોધો.

**ઉકેલ :**

$$(i) \quad (4p - 3q)^2 = (4p)^2 - 2(4p)(3q) + (3q)^2 \quad [\text{નિત્યસમ (II)નો ઉપયોગ કરતાં}]$$

$$= 16p^2 - 24pq + 9q^2$$

$$(ii) \quad (4.9)^2 = (5.0 - 0.1)^2 = (5.0)^2 - 2(5.0)(0.1) + (0.1)^2$$

$$= 25.00 - 1.00 + 0.01$$

$$= 24.00 + 0.01 = 24.01$$

**ઉદાહરણ 13 :** નિત્યસમ (III)નો ઉપયોગ કરીને કિંમત શોધો.

$$(i) \quad \left(\frac{3}{2}m + \frac{2}{3}n\right)\left(\frac{3}{2}m - \frac{2}{3}n\right) \quad (ii) \quad 983^2 - 17^2 \quad (iii) \quad 194 \times 206$$

**ઉકેલ :**

$$(i) \quad \left(\frac{3}{2}m + \frac{2}{3}n\right)\left(\frac{3}{2}m - \frac{2}{3}n\right) = \left(\frac{3}{2}m\right)^2 - \left(\frac{2}{3}n\right)^2$$

$$= \frac{9}{4}m^2 - \frac{4}{9}n^2$$

$$(ii) \quad 983^2 - 17^2$$

$$= (983 + 17)(983 - 17) \quad [\text{અહીં, } a = 983, b = 17,$$

$$= 1000 \times 966 \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$= 966000$$

સીધા ગુણાકારની રીતથી વર્ગ કરીને બાદબાકી મેળવો !!



$$(iii) 194 \times 206 = (200 - 6) \times (200 + 6) = (200)^2 - (6)^2 \\ = 40000 - 36 = 39964$$

**ଉଦାହରଣ 14 :** ନିତ୍ୟସମ  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$  ନିତ୍ୟସମର ଉପଯୋଗ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫଳାଫଳ ଖୋଜିବେ।

(i)  $501 \times 502$

(ii)  $95 \times 103$

**ଉତ୍ତର :**

$$(i) 501 \times 502 = (500 + 1) \times (500 + 2) = (500)^2 + (1 + 2) \times 500 + 1 \times 2 \\ = 250000 + 1500 + 2 \\ = 251502$$

$$(ii) 95 \times 103 = (100 - 5) \times (100 + 3) = (100)^2 + (-5 + 3) \times 100 + (-5) \times 3 \\ = 10000 - 200 - 15 = 9785$$

## સ્વાଧ୍ୟାୟ 9.5

1. ଯୋଗ୍ୟ ନିତ୍ୟସମର ଉପଯୋଗ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣାକାର ଖୋଜିବେ।

(i)  $(x + 3)(x + 3)$       (ii)  $(2y + 5)(2y + 5)$       (iii)  $(2a - 7)(2a - 7)$

(iv)  $(3a - \frac{1}{2})(3a - \frac{1}{2})$       (v)  $(1.1m - 0.4)(1.1m + 0.4)$

(vi)  $(a^2 + b^2)(-a^2 + b^2)$       (vii)  $(6x - 7)(6x + 7)$       (viii)  $(-a + c)(-a + c)$

(ix)  $(\frac{x}{2} + \frac{3y}{4})(\frac{x}{2} + \frac{3y}{4})$       (x)  $(7a - 9b)(7a - 9b)$

2.  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$  ନିତ୍ୟସମର ଉପଯୋଗ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣାକାର ଖୋଜିବେ।

(i)  $(x + 3)(x + 7)$       (ii)  $(4x + 5)(4x + 1)$

(iii)  $(4x - 5)(4x - 1)$       (iv)  $(4x + 5)(4x - 1)$

(v)  $(2x + 5y)(2x + 3y)$       (vi)  $(2a^2 + 9)(2a^2 + 5)$

(vii)  $(xyz - 4)(xyz - 2)$

3. ନିତ୍ୟସମର ଉପଯୋଗ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଗ ଖୋଜିବେ।

(i)  $(b - 7)^2$       (ii)  $(xy + 3z)^2$       (iii)  $(6x^2 - 5y)^2$

(iv)  $(\frac{2}{3}m + \frac{3}{2}n)^2$       (v)  $(0.4p - 0.5q)^2$       (vi)  $(2xy + 5y)^2$

4. ସାଠୁ ଢ଼ାଳି ଉପାଦାନ :

(i)  $(a^2 - b^2)^2$       (ii)  $(2x + 5)^2 - (2x - 5)^2$

(iii)  $(7m - 8n)^2 + (7m + 8n)^2$       (iv)  $(4m + 5n)^2 + (5m + 4n)^2$

(v)  $(2.5p - 1.5q)^2 - (1.5p - 2.5q)^2$

(vi)  $(ab + bc)^2 - 2ab^2c$       (vii)  $(m^2 - n^2m)^2 + 2m^3n^2$

5. ସାଧିତ କର :

(i)  $(3x + 7)^2 - 84x = (3x - 7)^2$       (ii)  $(9p - 5q)^2 + 180pq = (9p + 5q)^2$

(iii)  $(\frac{4}{3}m - \frac{3}{4}n)^2 + 2mn = \frac{16}{9}m^2 + \frac{9}{16}n^2$

(iv)  $(4pq + 3q)^2 - (4pq - 3q)^2 = 48pq^2$

(v)  $(a - b)(a + b) + (b - c)(b + c) + (c - a)(c + a) = 0$



6. નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરો.

- (i)  $71^2$                       (ii)  $99^2$                       (iii)  $102^2$                       (iv)  $998^2$   
 (v)  $5.2^2$                       (vi)  $297 \times 303$                       (vii)  $78 \times 82$                       (viii)  $8.9^2$   
 (ix)  $1.05 \times 9.5$

7. નિત્યસમ  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ નો ઉપયોગ કરીને કિંમત શોધો.

- (i)  $51^2 - 49^2$                       (ii)  $(1.02)^2 - (0.98)^2$                       (iii)  $153^2 - 147^2$                       (iv)  $12.1^2 - 7.9^2$

8.  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ નો ઉપયોગ કરીને કિંમત શોધો.

- (i)  $103 \times 104$                       (ii)  $5.1 \times 5.2$                       (iii)  $103 \times 98$                       (iv)  $9.7 \times 9.8$

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. 'ચલ' અને 'અચલ'ના ઉપયોગથી પદાવલિ રચી શકાય છે.
2. પદોનો સરવાળો કરીને પદાવલિ બનાવી શકાય છે. પદોને અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે.
3. જે પદાવલિમાં એક, બે કે ત્રણ પદો હોય તેવી પદાવલિને અનુક્રમે એકપદી, દ્વિપદી કે ત્રિપદી પદાવલિ કહેવામાં આવે છે. વ્યાપક સ્વરૂપે, એક કે તેથી વધુ પદો જેના સહગુણકો શૂન્ય ન હોય (અને ચલના ઘાતાંક અનૂણ હોય) તેને બહુપદી કહેવાય.
4. સમાન ચલ ધરાવતાં અને તે ચલોની સમાન ઘાત ધરાવતાં પદોને સજાતીય પદો કહે છે. સજાતીય પદોના સહગુણકો સમાન હોવા જરૂરી નથી.
5. જ્યારે બહુપદીના સરવાળા (કે બાદબાકી) કરવા હોય ત્યારે સૌ પ્રથમ તેના સજાતીય પદોની યોગ્ય ગોઠવણી કરી તેને ઉમેરવા (કે બાદ કરવા) જોઈએ. ત્યારબાદ વિજાતીય પદોની ગોઠવણી કરવી જોઈએ.
6. ઘણી બધી પરિસ્થિતિમાં બૈજિક પદાવલિઓનો ગુણાકાર કરવો જરૂરી બને છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો લંબચોરસની બાજુઓનાં માપ બૈજિક પદાવલિ તરીકે આપેલાં હોય અને તેનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું હોય.
7. એકપદીનો એકપદી સાથે ગુણાકાર કરવાથી એકપદી જ મળે છે.
8. જ્યારે બહુપદીનો એકપદી સાથે ગુણાકાર કરવાનો હોય ત્યારે આપેલ બહુપદીના દરેક પદ સાથે જે-તે એકપદીનો ગુણાકાર કરવો પડે છે.
9. જ્યારે બહુપદીનો ગુણાકાર દ્વિપદી (કે ત્રિપદી) સાથે કરી ગુણનફળ મેળવવાનું હોય ત્યારે એક પછી એક એમ દરેક પદનો ગુણાકાર કરવો પડે.  
અર્થાત્, આપેલ બહુપદીના દરેક પદનો દ્વિપદીના (કે ત્રિપદીના) દરેક પદ સાથે ગુણાકાર કરવો જોઈએ.
10. નિત્યસમ એ સમતા છે. જે ચલની કોઈ પણ કિંમત માટે સાચી ઠરે છે. જ્યારે સમીકરણ એ તેના ચલની અમુક ચોક્કસ કિંમતો માટે જ સાચું ઠરે છે. આમ, સમીકરણ એ નિત્યસમ નથી.
11. નીચેનાં નિત્યસમ પ્રમાણિત નિત્યસમ છે.  
 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  (I)  
 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  (II)  
 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$  (III)
12.  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$  (IV) પણ એક ઉપયોગી નિત્યસમ છે.
13. બૈજિક પદાવલિના વર્ગ અને ગુણાકાર શોધવા માટે ઉપરોક્ત નિત્યસમ ઘણાં ઉપયોગી છે. ઉપરાંત, સંખ્યાના વર્ગ અને ગુણાકાર શોધવા માટે પણ એક વૈકલ્પિક પદ્ધતિ તરીકે ઉપયોગી છે.



## ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ

પ્રકરણ

10





### 10.1 પ્રાસ્તાવિક





ધોરણ-7માં તમે સમતલ આકાર અને ઘન આકાર વિશે શીખી ગયા છો. સમતલ આકારોને બે માપ હોય છે : લંબાઈ અને પહોળાઈ. તેથી જ તેઓને દ્વિ-પરિમાણીય (Two Dimensional) આકાર કહેવાય છે. જ્યારે ઘન પદાર્થને ત્રણ માપ હોય છે : લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ અથવા ઊંડાઈ. તેથી તેમને ત્રિ-પરિમાણીય (Three Dimensional) આકાર કહે છે. આ ઉપરાંત એક ઘન પદાર્થ કેટલીક જગ્યા પણ રોકે છે. દ્વિ-પરિમાણીય અને ત્રિ-પરિમાણીય આકૃતિને ટૂંકમાં 2-D અને 3-D આકૃતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્રિકોણ, ચોરસ, લંબચોરસ, વર્તુળ વગેરેને તમે યાદ કરો. આ બધી 2-D આકૃતિ છે. જ્યારે સમઘન, નળાકાર, શંકુ, ગોલક વગેરે ત્રિ-પરિમાણીય (3-D) આકાર છે.

### આટલું કરો


પહેલા આકારને તેના પ્રકાર અને નામ સાથે આપની સમજણ માટે જોડેલ છે. તે મુજબ બાકીના આકારને યોગ્ય રીતે જોડો.




આકાર	આકારના પ્રકાર	આકારનું નામ
	ત્રિ-પરિમાણ	ગોલક (Sphere)
	દ્વિ-પરિમાણ	નળાકાર (Cylinder)
	ત્રિ-પરિમાણ	ચોરસ (Square)
	દ્વિ-પરિમાણ	વર્તુળ (Circle)

	ત્રિ-પરિમાણ	લંબઘન (Cuboid)
	ત્રિ-પરિમાણ	સમઘન (Cube)
	દ્વિ-પરિમાણ	શંકુ (Cone)
	ત્રિ-પરિમાણ	ત્રિકોણ (Triangle)

અહીં એ નોંધો કે ઉપરનો દરેક આકાર મૂળ આકાર છે. રોજબરોજના જીવનમાં આપણને ઉપર દર્શાવેલા આકારો ઉપરાંત બે કે તેથી વધારે આકારો મળીને બનતા કોઈ નવા આકાર સ્વરૂપે વસ્તુઓ જોવા મળે છે. નીચેની વસ્તુઓ ધ્યાનથી જુઓ :




તંબુ  
(નળાકાર ઉપર શંકુ)



ડબ્બો  
(પોલો નળાકાર)



આઈસ્ક્રીમ કોન  
(શંકુ ઉપર અર્ધગોલક)



ફોટોકેમ  
(લંબચોરસ પાથ)



કટોરો  
(પોલો અર્ધગોલક)



મિનારો  
(નળાકાર ઉપર અર્ધગોલક)

### આટલું કરો

નીચેનાં ચિત્રોને તેમના આકારો સાથે જોડો :

ચિત્ર(વસ્તુ)

(i) ખેતર



આકાર

લંબચોરસ બગીચામાં એકબીજાને  
છેદતાં લંબચોરસ રસ્તા

(ii) નળાકારમાં ખાંચો




વર્તુળાકાર મેદાનની ફરતે વર્તુળાકાર રસ્તો

(iii) ભમરડો



ચોરસ ખેતર સાથે જોડાયેલ ત્રિકોણીય ખેતર

(iv) વર્તુળાકાર બગીચો



નળાકારમાંથી શંકુ આકાર કાઢી લેવામાં આવેલ હોય

(v) રસ્તાની ચોકડી (ચોક)



શંકુ પર અર્ધગોલક ગોઠવવામાં આવેલ હોય



## 10.2 ત્રિ-પરિમાણીય આકારનાં દર્શ્યો


તમે નોંધ્યું હશે કે ત્રિ-પરિમાણીય વસ્તુઓને જુદી-જુદી જગ્યાએથી જોતાં જુદા-જુદા સ્વરૂપે જોવા મળે છે. આમ એક જ વસ્તુને આપણે જુદા-જુદા પરિપ્રેક્ષ્યથી અલગ-અલગ આકારે જોઈ શકીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે નીચે આપેલ જૂંપડીને જુદા-જુદા સ્થાનેથી જોતાં કેવી દેખાય છે તે જુઓ.



જૂંપડી



આગળનું દર્શ્ય



બાજુમાંથી દેખાતું દર્શ્ય



ઉપરથી દેખાતું દર્શ્ય


તેવી જ રીતે પ્યાલાને આ મુજબ જુદા-જુદા દર્શ્યોથી જોઈ શકાય.



પ્યાલો



બાજુમાંથી દેખાતું દર્શ્ય




ઉપરથી દેખાતું દર્શ્ય

એક પ્યાલાના ઉપરથી દેખાતા દર્શ્ય (Top view)માં સમકેન્દ્રીય વર્તુળની જોડ શા માટે જોવા મળે છે ? શું બીજા કેટલાક સ્થાનેથી જોતા પ્યાલાનું 'બાજુએથી દેખાતું દર્શ્ય' જુદું પડશે ? વિચારો. પ્યાલાનું આગળનું દર્શ્ય (Front view), પાછળનું દર્શ્ય (Back view), ડાબી બાજુથી દેખાતું દર્શ્ય (Left view) અને જમણી બાજુથી દેખાતું દર્શ્ય (Right view) સરખા જોવા મળે છે. શું આવી રીતે દરેક વસ્તુના બાજુ પરના દેખાવ (Side view) અને આગળના દેખાવ (Front view) સરખા હોય ?




હવે આપણે ઈંટને જુદા-જુદા સ્થાનેથી જોતાં મળતા દશ્યોને ધ્યાનથી જોઈએ.




ઈંટ


નીચે કેટલાક સમઘનથી બનેલા આકારોના જુદા-જુદા દશ્યો (view) આપેલા છે તેને જુઓ અને સમજો.



ત્રણ સમઘન દ્વારા બનેલ આકાર બાજુમાંથી દેખાતું દશ્ય આગળથી દેખાતું દશ્ય ઉપરથી દેખાતું દશ્ય



ચાર સમઘન દ્વારા બનેલ આકાર ઉપરથી દેખાતું દશ્ય આગળથી દેખાતું દશ્ય બાજુમાંથી દેખાતું દશ્ય


















ચાર સમઘન દ્વારા બનેલ આકાર બાજુમાંથી દેખાતું દશ્ય આગળથી દેખાતું દશ્ય ઉપરથી દેખાતું દશ્ય

### આટલું કરો

(તમારી આસપાસની જુદી-જુદી વસ્તુઓને જુદા-જુદા સ્થાનેથી જુઓ અને તેથી બનતા વિવિધ દશ્યોની તમારા મિત્ર સાથે ચર્ચા કરો.)

## સ્વાધ્યાય 10.1

1. અહીં દરેક ઘન વસ્તુઓના બે દશ્ય (view) બાજુનો દેખાવ (Side view) અને ઉપરનું દશ્ય (Top view) આપેલ છે. વસ્તુ અને તેના સાચા દશ્યો (view)ને જોડો. પહેલું જોડકું તમારી સમજ માટે બતાવેલ છે.

વસ્તુ	બાજુનો દેખાવ (Side View)	ઉપરનો દેખાવ (Top View)
(a)  બોટલ	(i) 	(i) 
(b)  વજનિયું	(ii) 	(ii) 
(c)  થરમોસ	(iii) 	(iii) 
(d)  કપ-રકાબી	(iv) 	(iv) 
(e)  ડબ્બો	(v) 	(v) 

2. આપેલ ઘન વસ્તુની સામે, તેના ત્રણ દૃશ્ય (view) આપેલ છે. આપેલ દરેક વસ્તુ માટે ઉપર (Top), આગળ (Front) અને બાજુ (Side)ના દૃશ્ય (view) ઓળખો અને સમજો.

વસ્તુ (i) (ii) (iii)

(a) ઉપર બાજુ આગળ

કબાટ

(b) ઉપર આગળ બાજુ

માચીસ

(c) ઉપર બાજુ આગળ

ટેલિવિઝન

(d) ઉપર આગળ બાજુ

મોટરગાડી

3. આપેલા દરેક ઘન આકાર માટે ઉપરનું દૃશ્ય (Top view), આગળનું દૃશ્ય (Front view) અને બાજુનું દૃશ્ય (Side view) ઓળખો.

(a) (i) (ii) (iii)

(b) (i) (ii) (iii)


(c) (i) (ii) (iii)

(d) (i) (ii) (iii)


(e) (i) (ii) (iii)

4. નીચે આપેલી વસ્તુઓનું આગળનું દૃશ્ય (Front view), બાજુનું દૃશ્ય (Side view) અને ઉપરનું દૃશ્ય (Top view) તમારી નોટબુકમાં દોરો.


(a) સૈનિકનો તંબુ




(c) લોખંડની નટ




(e) પાસો




(b) ટેબલ



(d) છોલ્યા વગરની પેન્સિલ



(f) ઘન




### 10.3 આપણી આસપાસની જગ્યાનું નકશા સ્વરૂપે આલેખન

તમે પ્રાથમિક શાળાના વર્ગોમાં હતા ત્યારથી જ તમે નકશાઓ વિશે જાણો છો. ભૂગોળ વિષયમાં તમને નકશામાં ચોક્કસ સ્થાન, ચોક્કસ રાજ્ય, ચોક્કસ નદી, પર્વત વગેરેને દર્શાવવાનું પૂછવામાં આવતું હતું. ઇતિહાસ વિષયમાં કદાચ તમને કોઈ નિશ્ચિત સ્થળને નકશામાં દર્શાવી અને ભૂતકાળમાં બનેલ મહત્વપૂર્ણ ઘટના વર્ણવવાનું કહેવામાં આવતું હતું. આ ઉપરાંત તમે નકશામાં નદીઓના પ્રવાહ, રોડ, રેલવે-લાઇન જોતા હતા અને દર્શાવતા હતા. આપણે નકશો કઈ રીતે વાંચી શકીએ ? (સમજી શકીએ ?) જ્યારે આપણે નકશો જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે શું સમજીએ છીએ અને શું તારણ કાઢીએ છીએ ? નકશામાં કઈ માહિતી આપેલ છે અને કઈ માહિતી આપેલ નથી ? શું ચિત્ર અને નકશા વચ્ચે કોઈ તફાવત છે ? આ વિભાગમાં આપણે આવા જ કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીશું. અહીં એક મકાનના ચિત્રની બાજુમાં મકાનનો નકશો આપેલ છે. આ બંનેને ધ્યાનથી જુઓ (આકૃતિ 10.1).



આકૃતિ 10.1






આકૃતિ 10.1ની રજુઆતથી તમે શું તારણ કાઢી શકો ? જ્યારે આપણે એક ચિત્ર દોરીએ છીએ ત્યારે આપણે વાસ્તવિક રજુઆત કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ માટે આપણે વાસ્તવિક વસ્તુની બધી વિગતો દર્શાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે આપણે નકશો દોરીએ છીએ ત્યારે આપણે માત્ર વસ્તુનું સ્થાન અને અન્ય ચીજ-વસ્તુની સાપેક્ષે સ્થાન અને અંતર પર જ વધારે ધ્યાન આપીએ છીએ. નકશામાં આપણે જે-તે વસ્તુના સ્વરૂપને વધુ મહત્ત્વ આપતા નથી. ચિત્ર અને નકશા વચ્ચેનો બીજો ભેદ એ છે કે કોઈ એક જ વસ્તુનું ચિત્ર જુદા-જુદા દૃષ્ટિકોણની સાપેક્ષે જુદા-જુદા સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ નકશાની બાબતે આવું થતું નથી એટલે કે અવલોકનકાર પોતાનું સ્થાન બદલે છતાં પણ મકાનનો નકશો તો જેમનો તેમ જ રહે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ચિત્ર દોરવા માટે દૃષ્ટિકોણ ખૂબ જ અગત્યનો છે, પરંતુ નકશા માટે દૃષ્ટિકોણનું મહત્ત્વ નથી.

હવે આકૃતિ 10.2માં સાત વર્ષના રાઘવે દોરેલો નકશો જુઓ તેમાં તેણે તેના ઘરેથી તેની શાળાએ પહોંચવાનો માર્ગ દર્શાવેલ છે. આ નકશા પરથી તમે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશો ?

- રાઘવના ઘરથી તેની શાળા કેટલી દૂર છે ?
- શું નકશાની અંદરના દરેક વર્તુળ કોઈ એક જ વસ્તુ બતાવે છે ?
- રાઘવ અને તેની બહેનની શાળામાંથી કોની શાળા રાઘવના ઘરથી નજીક છે ?



આકૃતિ 10.2


આકૃતિ 10.2માં આપેલ નકશામાંથી ઉપરોક્ત પ્રશ્નોના જવાબ આપવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. શું તમે કહી શકશો કે આમ શા માટે ? કારણ એ છે કે આપણે નથી જાણતા કે સ્થળ વચ્ચેનું અંતર સપ્રમાણ છે કે પછી અંદાજે વર્તુળો દોરેલા છે અને આ નાનાં-મોટાં વર્તુળો શું બતાવે છે તે પણ સ્પષ્ટ નથી.

હવે આકૃતિ 10.3માંનો નકશો જુઓ. તેમાં રાઘવની દસ વર્ષની બહેન મીનાએ તેના ઘરેથી તેની શાળાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે.

આ નકશો અગાઉના નકશા કરતા અલગ છે. અહીં મીનાએ જુદા-જુદા મહત્ત્વનાં સ્થળો(સીમા ચિહ્નો)ને જુદા-જુદા ચિહ્નોના ઉપયોગથી દર્શાવ્યાં છે અને લાંબા અંતર માટે લાંબી લાઈન તથા ટૂંકા અંતર માટે ટૂંકી લાઈન દોરવામાં આવેલ છે એટલે કે નકશો દોરવામાં પ્રમાણમાપ (સ્કેલ) નો ઉપયોગ કરેલ છે.

હવે તમે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશો :

- રાઘવના ઘરથી રાઘવની શાળા કેટલી દૂર આવેલી છે ?
- કોની શાળા ઘરથી વધુ નજીક છે, રાઘવની કે મીનાની ?
- માર્ગના મહત્ત્વના ભૂચિહ્નો (અગત્યના સ્થળો) કયા કયા છે ?



આકૃતિ 10.3



આ પરથી આપણને સમજાયું કે કેટલાક સંકેતોનો ઉપયોગ કરવાથી અને સ્થળો વચ્ચેના અંતર દર્શાવવાથી આપણે નકશાને ઘણી સરળતાથી સમજી શકીએ છીએ. તમે જોયું હશે કે નકશામાં દર્શાવેલ અંતર એ જમીન પરના વાસ્તવિક અંતરને સપ્રમાણ હોય છે. આમ કરવા માટે ચોક્કસ પ્રમાણમાપ (સ્કેલમાપ) ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, જ્યારે નકશો બનાવતા હોઈએ કે વાંચતા હોઈએ ત્યારે નકશો કેટલા સ્કેલનો છે તે બરાબર જાણવું જોઈએ એટલે કે નકશા પરનું 1 મિમી કે 1 સેમી અંતર વાસ્તવમાં કેટલું અંતર દર્શાવે છે તે જાણવું જરૂરી છે.

અર્થાત્ નકશો દોરતી વખતે જમીન પરના 1 કિમી કે 10 કિમી કે પછી 100 કિમી અંતરને નકશામાં 1 મિમી કે 1 સેમી દ્વારા દર્શાવી શકાય. આપણી જરૂરિયાત મુજબના માપના નકશાઓ તૈયાર કરવા નિશ્ચિત પ્રમાણમાપ (સ્કેલમાપ) ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. જુદા-જુદા માપના નકશામાં જુદા-જુદા સ્કેલમાપ હોય છે. પરંતુ એક જ નકશામાં એક જ સ્કેલમાપ હોય છે. આ બાબત ભૂલવી ન જોઈએ. તે સમજવા ભારતના નકશામાં ગુજરાતના શહેરો જુઓ અને ગુજરાતના નકશામાં ગુજરાતના શહેરો જુઓ અને આ બંને નકશાના પ્રમાણમાપ (સ્કેલમાપ) પણ ચકાસો.

તમે જોશો કે ભારત અને ગુજરાતના નકશા માપમાં સરખા હોવા છતાં બંને નકશામાં 1 સેમી જેટલી જગ્યા જુદા-જુદા માપનું અંતર બતાવતા હશે એટલે કે ભારતના નકશા કરતાં ગુજરાતના નકશામાં 1 સેમીને સપ્રમાણ અંતર ઓછું હશે જ્યારે ભારતના નકશામાં 1 સેમીને સપ્રમાણ અંતર વધુ હશે આમ નકશામાં સ્કેલમાપનો ઉપયોગ કરી વિશાળ જગ્યાઓને મર્યાદિત જગ્યામાં દર્શાવી શકીએ છીએ, તેથી નકશામાં 1 સેમી એ ઘણું મોટું અંતર દર્શાવે છે.

ટૂંકમાં કહીએ તો...

- (1) નકશા દ્વારા નિશ્ચિત વસ્તુ/સ્થળને અન્ય વસ્તુ/સ્થળની સાપેક્ષ (સંદર્ભ)માં દર્શાવાય છે.
- (2) જુદી-જુદી વસ્તુ/સ્થળને દર્શાવવા માટે જુદા-જુદા સંકેતોનો (સંજ્ઞાઓનો) ઉપયોગ થાય છે.
- (3) નકશામાં કોઈ પરિપ્રેક્ષ્ય (યથાર્થ ચિત્ર) કે સંદર્ભ નથી. જેથી નકશામાં દૃષ્ટિબિંદુ કે દૃષ્ટિકોણને કોઈ સ્થાન નથી. એટલે કે નકશામાં નજીકની વસ્તુ મોટી અને દૂરની વસ્તુ નાની દર્શાવવાની જરૂર હોતી નથી. નકશામાં દરેક સમાન વસ્તુનું કદ એકસરખું રાખવામાં આવે છે. કોઈ પણ સ્થળનો નકશો હંમેશાં તેના Top view(ઉપરથી દેખાતું દૃશ્ય)ને ધ્યાનમાં રાખી દોરવામાં આવે છે. નકશામાં અન્ય કોઈ દૃશ્ય (view)ને સ્થાન નથી. આ બાબત સમજવા આકૃતિ 10.4 જુઓ.




આકૃતિ 10.4

- (4) નકશામાં પ્રમાણમાપ (સ્કેલમાપ)નો ઉપયોગ થાય છે નિશ્ચિત નકશા માટે પ્રમાણમાપ (સ્કેલમાપ) એક જ રહે છે એટલે કે બદલાતું નથી. વાસ્તવિક અંતરને પ્રમાણસર ઘટાડીને નકશાને કાગળ પર દર્શાવાય છે.

## આટલું કરો

1. આ એક શહેરનો નકશો જુઓ (આકૃતિ 10.5).



આકૃતિ 10.5

- (a) નકશામાં રંગ પૂરો : પાણીમાં વાદળી, ફાયર સ્ટેશનમાં લાલ, પુસ્તકાલયમાં નારંગી, શાળામાં પીળો, બગીચામાં લીલો, કોમ્યુનિટી સેન્ટરમાં ગુલાબી, હોસ્પિટલમાં જાંબલી, કબ્રસ્તાનમાં કથ્થાઈ.


(b) શેરી નંબર 2 અને ડેનિમ માર્ગ જ્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં લીલા રંગનો X કરો. શેરી નંબર 3 અને નદી જ્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં કાળા રંગનો Y કરો. મુખ્ય માર્ગ અને શેરી નંબર 1 ભેગા થાય છે ત્યાં લાલ રંગનો Z કરો.

(c) કોલેજથી તળાવ સુધીનો ટૂંકો રસ્તો કથ્થાઈ રંગથી દર્શાવો.

2. તમારા ઘરથી તમારી શાળાનો નકશો દોરો. તેમાં મહત્વનાં સ્થળો (સીમાચિહ્નો) દર્શાવો.

## સ્વાધ્યાય 10.2

1. એક શહેરના નકશા પર નજર કરો.



નકશા પરથી આપેલ પ્રવૃત્તિ કરો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

(a) નકશામાં આ રીતે રંગ પૂરો : પાણી-બલ્યુ, ફાયર સ્ટેશન-લાલ, પુસ્તકાલય-નારંગી, શાળા-પીળો, બગીચો-લીલો, કોલેજ-ગુલાબી, હોસ્પિટલ-જાંબલી, કબ્રસ્તાન-કથ્થાઈ.

(b) નહેરુ રોડ અને રોડ 'C' જ્યાં ભેગા થાય છે. ત્યાં લીલા રંગનો 'X' કરો. ગાંધી રોડ અને રોડ 'A' જ્યાં મળતાં હોય ત્યાં લીલા રંગનો 'Y' કરો.

(c) બસ સ્ટેશનથી પુસ્તકાલય જવાનો ટૂંકો માર્ગ લાલ રંગથી દોરો.

(d) બગીચો અને બજાર બેમાંથી પૂર્વ દિશામાં શું આવેલ છે ?

(e) પ્રાથમિક શાળા અને માધ્યમિક શાળામાંથી કયું સ્થળ વધારે દક્ષિણ દિશામાં આવેલ છે ?


2. ચોક્કસ સ્કેલમાપ(પ્રમાણમાપ) લઈને તમારા વર્ગખંડનો નકશો દોરો અને વર્ગની જુદી-જુદી વસ્તુઓને સંકેતથી દર્શાવો.

3. ચોક્કસ પ્રમાણમાપ (સ્કેલ) લઈને તમારી શાળાના મેદાનનો નકશો દોરો. તેમાં શાળાના મેદાનની દરેક વસ્તુ, મુખ્ય મકાન, બગીચો વગેરે દર્શાવો.

4. તમારો મિત્ર કોઈ પણ મુશ્કેલી વગર તમારા ઘરે પહોંચી શકે તે માટેની સૂચના સાથેનો રસ્તો દર્શાવતો નકશો દોરો.

## 10.4 શિરોબિંદુ (Vertex), ધાર (Edge) અને ફલક (Face)


નીચેના ઘન આકારોને જુઓ :




ઉપાણું :

મારે શિરોબિંદુ નથી.  
મારે સપાટ મુખફલક  
નથી. હું કોણ છું ?






ઉપરોક્ત તમામ ઘન બહુકોણના જોડાણથી તૈયાર થયેલ છે. બહુકોણથી ઘેરાતા સમતલીય ભાગને ફલક (Face) કહેવામાં આવે છે. આમ, ઉપરોક્ત તમામ ઘન આકારો ફલક (Faces)થી બનેલા છે. આ ફલક જ્યાં મળે છે તેને ધાર (Edges) કહે છે. આ ધાર રેખાખંડ સ્વરૂપે હોય છે. આ ધાર જ્યાં મળે છે, તેને શિરોબિંદુ (Vertices) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ શિરોબિંદુ બિંદુ સ્વરૂપે હોય છે. આમ, આવા ઘનને બહુફલક (Polyhedrons) કહેવામાં આવે છે.



આ બહુફલકો (Polyhedrons) છે

આ બહુફલકો (Polyhedrons) નથી

બહુફલક (Polyhedrons) હોય બહુફલક ન હોય તેવા ઘન આકારો (Non-polyhedrons) કઈ રીતે એકબીજાથી જુદા પડે છે ? આ વાત સમજવા ઉપરોક્ત આકૃતિનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો. તમે જોઈ શકશો કે Non-polyhedrons ઘન આકારમાં વક્ર સપાટી આવેલી છે, જ્યારે Polyhedronsમાં માત્ર સમતલ ભાગ જ આવે છે. વક્રીય સપાટી આવતી નથી. નીચેના ત્રણ સામાન્ય ઘનના પ્રકારોને તમે જાણો છો :



ગોલક

શંકુ

નળાકાર


બહિર્વૃત્ત બહુફલક : બહિર્વૃત્ત બહુકોણ (Convex Polygons)નો ખ્યાલ યાદ કરો બહિર્વૃત્ત બહુફલક (Convex Polyhedrons)નો ખ્યાલ બહિર્વૃત્ત બહુકોણ જેવો જ છે.




બહિર્વૃત્ત બહુફલક છે

બહિર્વૃત્ત બહુફલક નથી

સામાન્ય બહુફલક : જ્યારે બહુફલકના દરેક ફલક સામાન્ય ફલક હોય અને તેના દરેક શિરોબિંદુ (Vertex) પર સરખી સંખ્યાના ફલક મળતા હોય ત્યારે તેને સામાન્ય બહુફલક (Regular Polyhedrons) કહેવામાં આવે છે.





(આ સામાન્ય બહુફલક છે. તેના દરેક ફલક એકરુપ (Congruent), સામાન્ય બહુકોણ છે. તેના શિરોબિંદુ (Vertices) પર સરખી સંખ્યામાં ફલક મળે છે.)





(સામાન્ય બહુફલક નથી, બધી બાજુઓ એકરુપ (Congruent) છે, પણ દરેક શિરોબિંદુ (Vertices) પાસે સરખી સંખ્યામાં ફલક ભેગા થતા નથી. અહીં A બિંદુ આગળ ત્રણ ફલક મળે છે. B બિંદુ આગળ ચાર ફલક મળે છે.)

બહુફલકના અગત્યના બે પ્રકાર છે : (1) પ્રિઝમ (2) પિરામિડ



આ પ્રિઝમ છે



આ પિરામિડ છે

જે બહુફલકનો પાયો અને મથાળું એકરુપ Congruent બહુકોણ હોય અને બાકીના ફલક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય, તેને પ્રિઝમ કહે છે. પણ પિરામિડમાં (કોઈપણ સંખ્યાની બાજુવાળો) બહુકોણ પાયા તરીકે હોય છે. પાયાની દરેક બાજુમાંથી શરુ થતાં ફલકો ત્રિકોણ આકારના હોય છે. આ ત્રિકોણાકાર ફલકો એક જ શિરોબિંદુ (Vertex)માં મળે છે.

પ્રિઝમ અને પિરામિડ તેના પાયા પરથી ઓળખાય છે. આમ ષટ્કોણીય (Hexagonal) પ્રિઝમનો પાયો ષટ્કોણથી બનેલો હોય છે અને ત્રિકોણીય પિરામિડનો પાયો ત્રિકોણ હોય છે. શું લંબચોરસીય પ્રિઝમ હોય ? ચોરસીય પિરામિડ કેવો હોય ? સ્પષ્ટ છે કે તેમના પાયા અનુક્રમે લંબચોરસ અને ચોરસ હશે.

### આટલું કરો

નીચે કોષ્ટકમાં આપેલા બહુફલકના ફલક (Faces), ધાર (Edges) અને શિરોબિંદુ (Vertices)ની સંખ્યા દર્શાવો. અહીં V એટલે શિરોબિંદુ (Vertices)ની સંખ્યા F એટલે ફલક (Faces)ની સંખ્યા અને E એટલે Edges(ધાર)ની સંખ્યા છે.



ઘન	F	V	E	F + V	E + 2
લંબઘન					
ત્રિકોણીય પિરામિડ					
ત્રિકોણીય પ્રિઝમ					
ચોરસ પાયાવાળો પિરામિડ					
ચોરસ પાયાવાળો પ્રિઝમ					



કોષ્ટકના છેલ્લા બે ખાનાની માહિતી શું દર્શાવે છે ? દરેક કિસ્સામાં (દરેક બહુફલક માટે) તમને  $F + V = E + 2$  મળે છે ? એટલે કે  $F + V - E = 2$  મળે છે ? આ સંબંધને યુલર (Euler)નું સૂત્ર કહે છે. અલબત્ત, આ સૂત્ર દરેક બહુફલક માટે સાચું છે.

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

કોઈ પણ બહુફલકમાંથી થોડો ભાગ કાપી નાખવામાં આવે તો  $F$ ,  $V$  અને  $E$ માં શું ફેરફાર થશે ? (આ બાબત વિચારવા સૌ પ્રથમ સમઘન લો. હવે તેનો ખૂણો કાપી નાખો અને હવે વિચારો  $F$ ,  $V$  અને  $E$ માં શું ફેરફાર થયો ?)

### સ્વાધ્યાય 10.3

- શું કોઈ બહુફલકને આટલા ફલક હોઈ શકે ?
  - ત્રણ ત્રિકોણ
  - ચાર ત્રિકોણ
  - એક ચોરસ અને ચાર ત્રિકોણ
- શું આપેલી કોઈપણ સંખ્યાના ફલકથી બહુફલક બની શકે ?  
(સૂચન : પિરામિડને ધ્યાનમાં રાખી વિચારો.)
- નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ પ્રિઝમ છે ?
  - 
  -




ખીલી




છોલ્યા વગરની પેન્સિલ

(iii)




પેપર વેઈટ

(iv)




ખોખું

- પ્રિઝમ અને નળાકારમાં શું સામ્ય છે ?
  - પિરામિડ અને શંકુમાં શું સામ્ય છે ?
- શું ચોરસ પ્રિઝમ એ સમઘન જેવો જ હોય છે. સમજાવો.
- યુલર (Euler)નું સૂત્ર નીચેના ઘનાકાર માટે તપાસો.



(i)



(ii)

7. યુલર(Euler's)ના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અજ્ઞાત સંખ્યા મેળવો.

ફલક (F)	?	5	20
શિરોબિંદુ (V)	6	?	12
ધાર (E)	12	9	?

8. શું કોઈ બહુફલકને 10 ફલક (Faces), 20 ધાર (Edges) અને 15 શિરોબિંદુ (Vertices) હોઈ શકે ?

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. 2D અને 3D વસ્તુઓની સમજ
2. જુદી-જુદી વસ્તુમાં રહેલ મુખ્ય/મૂળ આકારોની ઓળખ
3. 3D વસ્તુઓ જુદી-જુદી જગ્યાએથી જુદી-જુદી દેખાય છે.
4. નકશા ચિત્ર કરતાં અલગ હોય છે.
5. નકશામાં નિશ્ચિત વસ્તુ/સ્થળને અન્ય વસ્તુ/સ્થળની સાપેક્ષમાં દર્શાવવામાં આવે છે.
6. નકશામાં જુદી-જુદી વસ્તુ/સ્થળને દર્શાવવા જુદા-જુદા ખાસ સંજ્ઞા કે સંકેતોનો ઉપયોગ થાય છે.
7. નકશામાં કોઈ સંદર્ભ કે દૃષ્ટિકોણને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો નથી.
8. કોઈ એક નકશામાં પ્રમાણમાપ (સ્કેલ) અચળ રહે છે, ફરતો નથી.
9. યુલર (Euler)નું સૂત્ર : કોઈ પણ બહુફલક માટે  $F + V - E = 2$

જ્યાં F = ફલકની સંખ્યા

V = શિરોબિંદુની સંખ્યા

E = ધારની સંખ્યા







## માપન

પ્રકરણ

11

### 11.1 પ્રાસ્તાવિક

બંધ સમતલ આકૃતિ માટે આપણે શીખી ગયા, કે તેની હદ કે સીમાની ચારે બાજુનું કુલ અંતર એટલે પરિમિતિ અને તે આકૃતિ દ્વારા ઘેરાયેલા કુલ ક્ષેત્રને તેનું ક્ષેત્રફળ કહેવામાં આવે છે. આપણે ત્રિકોણ, લંબચોરસ, વર્તુળ વગેરે જેવી વિભિન્ન સમતલ આકૃતિઓની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું શીખી ચૂક્યા છીએ. ઉપરાંત લંબચોરસ આકાર ફરતે આવેલા રસ્તા કે પગદંડીનું ક્ષેત્રફળ શોધતા પણ શીખી ગયા છીએ.


આ પ્રકરણમાં આપણે ચતુષ્કોણ જેવી બંધ સમતલ આકૃતિઓની પરિમિતિ તથા ક્ષેત્રફળ સાથે સંબંધિત સમસ્યા કે પ્રશ્નો ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

આપણે સમઘન, લંબઘન અને નળાકાર જેવા ઘન આકારોના પૃષ્ઠફળ અને કદ અંગે પણ અધ્યયન કરીશું.

### 11.2 ચાલો ફરી યાદ કરી લઈએ

આપણા પૂર્વજ્ઞાનની ચકાસણી માટે એક ઉદાહરણની ચર્ચા કરીએ. આ એક લંબચોરસ આકારના બગીચાની આકૃતિ છે (આકૃતિ 11.1). જેની લંબાઈ 30 મીટર અને પહોળાઈ 20 મીટર છે.

- આ બગીચાની ચારે બાજુ આવેલ વાડની કુલ લંબાઈ કેટલી હશે ? વાડની લંબાઈ મેળવવા આપણે બગીચાની પરિમિતિ મેળવવાની જરૂર પડશે કે જે 100 મીટર છે (આ બાબત ચકાસો).
- બગીચામાં કેટલી જમીન રોકાયેલી છે ? આ બગીચાએ રોકેલી જમીન શોધવા માટે આપણે બગીચાનું ક્ષેત્રફળ શોધવાની જરૂર પડશે. તે 600 ચોરસ મીટર (મી<sup>2</sup>) છે (કઈ રીતે ?).
- બગીચાની પરિમિતિ પર અંદરની તરફ એક મીટર પહોળો સિમેન્ટનો રસ્તો તૈયાર કરવાનો છે. જો 4 ચોરસ મીટર (મી<sup>2</sup>) પર સિમેન્ટ લગાવવા એક થેલી સિમેન્ટ જોઈએ છે. તો આ આખા રસ્તા પર સિમેન્ટ લગાવવા માટે કેટલી થેલી સિમેન્ટની જરૂર પડશે ?



આકૃતિ 11.1

આપણે કહી શકીએ કે, જરૂરી સિમેન્ટની થેલી =  $\frac{\text{રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ}}{\text{સિમેન્ટની એક થેલીથી તૈયાર થતા વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ}}$

સિમેન્ટના રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ = બગીચાનું કુલ ક્ષેત્રફળ - બગીચાના જે ભાગ પર સિમેન્ટ નથી લગાવવાનો તેનું ક્ષેત્રફળ  
રસ્તાની પહોળાઈ 1 મીટર છે તેથી સિમેન્ટ નથી લગાવવાનો તે ભાગના લંબચોરસ ભાગનું ક્ષેત્રફળ =  $(30 - 2) \times (20 - 2)$  મી<sup>2</sup> થાય. =  $(28 \times 18)$  મી<sup>2</sup>

તેથી વપરાશમાં જરૂરી સિમેન્ટની થેલીની સંખ્યા = \_\_\_\_\_






- આકૃતિ 11.1માં દર્શાવ્યા મુજબ, આ બગીચામાં બે લંબચોરસ આકારનાં ફૂલોના ક્યારા છે. જેનું માપ 1.5 મી × 2 મી. છે અને બગીચાના બાકી ભાગમાં ઘાસ છે. બગીચાના ઘાસવાળા વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

લંબચોરસ ક્યારાનું ક્ષેત્રફળ = \_\_\_\_\_

બગીચામાંથી સિમેન્ટનો રસ્તો બાદ કર્યા પછીનું બાગનું ક્ષેત્રફળ = \_\_\_\_\_

ઘાસવાળા વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ = \_\_\_\_\_





જો આપણને કેટલાક માપ આપ્યા હોય તો આપણે લંબચોરસ સિવાયના બીજા ભૌમિતિક આકારોનું ક્ષેત્રફળ પણ શોધી શકીએ. નીચેના આકારોનાં ક્ષેત્રફળનાં સૂત્રો યાદ કરી યોગ્ય જોડકાં જોડવાનો પ્રયત્ન કરો.

આકૃતિ	આકાર	ક્ષેત્રફળ
	લંબચોરસ	$a \times b$
	ચોરસ	$a \times a$
	ત્રિકોણ	$\frac{1}{2} b \times h$
	સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ	$b \times h$
	વર્તુળ	$\pi b^2$

શું તમે ઉપરોક્ત દરેક આકારોની પરિમિતિનાં સૂત્ર લખી શકો છો ?

### પ્રયત્ન કરો

(a) નીચે આપેલા આકારોને બોક્સમાં આપેલા ક્ષેત્રફળ સાથે યોગ્ય રીતે જોડો.



49 સેમી<sup>2</sup>

77 સેમી<sup>2</sup>



98 સેમી<sup>2</sup>

(b) ઉપર દર્શાવેલા દરેક આકારની પરિમિતિ લખો.




## સ્વાધ્યાય 11.1

1. અહીં આકૃતિમાં એક ચોરસ અને એક લંબચોરસ ખેતર તેમના માપ સાથે આપેલા છે. આ બંને ખેતરોની પરિમિતિ સમાન છે. કયા ખેતરનું ક્ષેત્રફળ વધારે હશે ?
2. શ્રીમતી કૌશિકનો આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબના માપનો ચોરસ પ્લોટ છે. તે પ્લોટના મધ્યભાગમાં મકાન બનાવવા માગે છે. મકાનને ફરતે બગીચો વિકસાવેલ છે. બગીચો વિકસાવવાનો ભાવ ₹ 55 પ્રતિ ચોરસ મીટર હોય તો મકાનની ફરતે બગીચો વિકસાવવાનો કુલ ખર્ચ કેટલો થશે ?
3. અહીં આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબનો એક બગીચો છે. બગીચાનો મધ્યભાગ લંબચોરસ છે અને આ લંબચોરસની બંને બાજુ છેડા પર



એક-એક અર્ધવર્તુળાકાર ભાગ આવેલ છે. આ બગીચાની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધો. (લંબ-ચોરસની લંબાઈ 20 – (3.5 + 3.5) મીટર છે.)




4. ભોંયતળિયે લગાવવાની એક લાદીનો આકાર સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે. તેના પાયાની લંબાઈ 24 સેમી અને આનુષંગિક ઊંચાઈ 10 સેમી છે. 1080 ચોરસ મીટર ભોંયતળિયા ઉપર આ મુજબની લાદી લગાડવાની હોય તો કેટલી લાદી જોઈશે ? (ભોંયતળિયાના ખૂણાને લાદીથી ભરવા માટે જરૂરિયાત મુજબ લાદીને કોઈ પણ આકારમાં તમે કાપી શકો છો.)
5. એક કીડી કોઈ ભોંયતળિયા પર પડેલા જુદા-જુદા આકારોના ખાદ્યપદાર્થોની ચારે બાજુ પરિમિતિના માર્ગે પરિભ્રમણ કરે છે. ખાદ્ય પદાર્થના કયા ટુકડાના પરિભ્રમણ માટે કીડીને વધુ અંતર કાપવું પડશે ? (યાદ રાખો કે વર્તુળના પરિઘનું સૂત્ર  $c = 2\pi r$  છે, જ્યાં  $r$  વર્તુળની ત્રિજ્યા છે.)


(a)



(b)



(c)




## 11.3 સમલંબનું ક્ષેત્રફળ (Area of Trapezium)


નજમા પાસે એક પ્લોટ છે, જે મેઈન રોડની નજીક છે (આકૃતિ 11.2 મુજબ). નજમાનો આ પ્લોટ તેના પાડોશના અન્ય કેટલાક લંબચોરસ પ્લોટ જેવો નથી. તેના પ્લોટની સામસામેની બાજુઓની એક જોડ પરસ્પર સમાંતર છે. તેથી તેનો પ્લોટ લગભગ સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારનો છે. શું તમે આ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ મેળવી શકો ?

ચાલો આકૃતિ 11.3માં બતાવ્યા મુજબ પ્લોટને નામ નિર્દેશન કરીએ.

હવે અહીં આપણે AB રેખાખંડને સમાંતર રેખાખંડ EC રચીએ. જેથી ABCE લંબચોરસ બને અને પ્લોટનો બીજો ભાગ ECD ત્રિકોણ આકાર બને. જ્યાં  $\angle C$  કાટખૂણો છે જે આકૃતિ 11.3માં દર્શાવેલ છે.



આકૃતિ 11.2



$$(b = c + a = 30 \text{ મી})$$

આકૃતિ 11.3

$$\Delta ECD\text{નું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times h \times c = \frac{1}{2} \times 12 \times 10 = 60 \text{ મી}^2$$

$$\text{લંબચોરસ } ABCE\text{નું ક્ષેત્રફળ} = h \times a = 12 \times 20 = 240 \text{ મી}^2$$

$$\text{હવે, સમલંબ ચતુષ્કોણ } ABDE\text{નું ક્ષેત્રફળ} = \Delta ECD\text{નું ક્ષેત્રફળ} + \text{લંબચોરસ } ABCE\text{નું ક્ષેત્રફળ} \\ = 60 + 240 = 300 \text{ મી}^2$$

ઉપરોક્ત ગણતરી આ રીતે પણ થઈ શકે.

$$\begin{aligned} \text{સમલંબ } ABDE\text{નું ક્ષેત્રફળ} &= \left(\frac{1}{2} \times h \times c\right) + (h \times a) = h \left(\frac{c}{2} + a\right) \\ &= h \left(\frac{c + 2a}{2}\right) = h \left(\frac{c + a + a}{2}\right) \\ &= h \frac{(b + a)}{2} = \frac{\text{ઊંચાઈ (સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો)}}{2} \end{aligned}$$


આ વ્યાપક સૂત્રમાં  $h$ ,  $b$  તથા  $a$ ની કિંમત લઈને ગણતરી કરતાં આપણને,  $h \frac{(b + a)}{2} = 300 \text{ મી}^2$  પ્રાપ્ત થશે.



### પ્રયત્ન કરો

1. નજમાની બહેન પાસે પણ એક સમલંબ આકારનો પ્લોટ છે. જે આકૃતિ 11.4માં દર્શાવેલ છે. આ પ્લોટને આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ ત્રણ ભાગમાં વિભાજિત કરો. હવે આ સમલંબ ચતુષ્કોણ

$$WXYZ\text{નું ક્ષેત્રફળ} = \frac{h(a+b)}{2} \text{ છે તેમ દર્શાવો.}$$




આકૃતિ 11.4

2. જો  $h = 10$  સેમી,  $c = 6$  સેમી,  $b = 12$  સેમી અને  $d = 4$  સેમી હોય, તો પ્લોટના દરેક ભાગનું ક્ષેત્રફળ અલગ-અલગ શોધો અને સમલંબ પ્લોટનું કુલ ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે આ ભાગનો સરવાળો કરો. ત્યાર બાદ સૂત્ર  $\frac{h(a+b)}{2}$  માં  $h$ ,  $a$  અને  $b$ ની કિંમત મૂકીને જવાબનો તાળો મેળવો.


### આટલું કરો



1. આલેખપત્રમાં આકૃતિ 11.5માં દર્શાવ્યા મુજબ કોઈ પણ સમલંબ ચતુષ્કોણ WXYZ દોરી તેને કાપીને અલગ કરો.
2. હવે આકૃતિ 11.6માં દર્શાવ્યા મુજબ ચતુષ્કોણની બાજુ XYને વાળીને તેનું મધ્યબિંદુ મેળવો અને તેને A નામ આપો.




આકૃતિ 11.5



આકૃતિ 11.6

3. ચતુષ્કોણ WXYZ ને રેખાખંડ ZAમાંથી કાપી બે ભાગમાં વહેંચો હવે  $\Delta ZYA$  આકૃતિ 11.7માં દર્શાવ્યા મુજબ એવી રીતે રાખો કે જેથી AY અને AX એક ઉપર એક રહે.

હવે પ્રાપ્ત થતાં મોટા ત્રિકોણના પાયાની લંબાઈ કેટલી થશે ? આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટેનું સૂત્ર લખો.



આકૃતિ 11.7


4. આ ત્રિકોણ WZB અને સમલંબ WXYZનું ક્ષેત્રફળ સમાન હશે. કેવી રીતે ? આ મોટા ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ મેળવવાના સૂત્ર પરથી સમલંબ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મેળવો.

આ રીતે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે આપણને સમાંતર બાજુઓની લંબાઈ અને આ સમાંતરબાજુ વચ્ચેનાં લંબઅંતરની જરૂર પડશે. સમાંતર બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો અને તેમની વચ્ચેના લંબઅંતરના ગુણાકારનું અડધું કરવાથી આપણને સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ પ્રાપ્ત થાય છે.


### પ્રયત્ન કરો

આકૃતિ 11.8માં બતાવેલા સંમલંબનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(i)



(ii)




આકૃતિ 11.8



### આટલું કરો

ધોરણ-7માં આપણે સમાન ક્ષેત્રફળ ધરાવતા અને જુદી-જુદી પરિમિતિ ધરાવતા સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ દોરતાં શીખ્યા છીએ. શું સમલંબ ચતુષ્કોણ માટે પણ આમ કરી શકાય ? આકૃતિ 11.9માં દર્શાવેલા જુદી-જુદી પરિમિતિ ધરાવતા સમલંબનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે કે કેમ ? તે ચકાસો.



આકૃતિ 11.9

આપણે જાણીએ છીએ કે એકરુપ આકૃતિઓનાં ક્ષેત્રફળ સરખાં હોય છે. તે પરથી આપણે શું એમ કહી શકીએ કે, સમાન ક્ષેત્રફળવાળી આકૃતિ એકરુપ હોય છે ?

એક આલેખપત્ર પર ઓછામાં ઓછા ત્રણ સમલંબ ચતુષ્કોણ એવા બનાવો કે જેની પરિમિતિ સમાન હોય પરંતુ ક્ષેત્રફળ જુદા-જુદા હોય.



### 11.4 સામાન્ય ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ

કોઈ પણ સામાન્ય ચતુષ્કોણ (General Quadrilateral)નો એક વિકર્ણ દોરી તેને બે ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. આ રીતે ચતુષ્કોણને વિભાજિત કરવાની પ્રક્રિયા આપણને સામાન્ય ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર મેળવવામાં ઉપયોગી થાય છે. આકૃતિ 11.10નો અભ્યાસ કરો.


ચતુષ્કોણ ABCDનું ક્ષેત્રફળ =  $(\Delta ABC$ નું ક્ષેત્રફળ) +  $(\Delta ADC$ નું ક્ષેત્રફળ)

$$= \left(\frac{1}{2}AC \times h_1\right) + \left(\frac{1}{2}AC \times h_2\right)$$

$$= \frac{1}{2}AC (h_1 + h_2)$$

$$= \frac{1}{2}d(h_1 + h_2)$$


જ્યાં  $d$  = કર્ણ ACની લંબાઈ છે.



આકૃતિ 11.10

**ઉદાહરણ 1 :** આકૃતિ 11.11માં દર્શાવેલા ચતુષ્કોણ PQRSનું ક્ષેત્રફળ મેળવો.

**ઉકેલ :** અહીં  $d = 5.5$  સેમી,  $h_1 = 2.5$  સેમી,  $h_2 = 1.5$  સેમી



આકૃતિ 11.11

$$\therefore \text{ચતુષ્કોણ PQRSનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2}d(h_1 + h_2)$$


$$= \frac{1}{2} \times 5.5 \times (2.5 + 1.5) \text{ સેમી}^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 5.5 \times 4 \text{ સેમી}^2$$

$$= 11 \text{ સેમી}^2$$

### પ્રયત્ન કરો

આપણે જાણીએ છીએ કે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ પણ એક ચતુષ્કોણ જ છે. તો ચાલો, આ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનો એક વિકર્ણ દોરી તેને બે ત્રિકોણોમાં વિભાજિત કરીએ અને તે બન્ને ત્રિકોણનાં ક્ષેત્રફળ શોધીએ. આ રીતે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ પણ મેળવી શકાય. શું સમાંતર ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર આગળ મેળવેલ સૂત્ર સાથે સામ્ય ધરાવે છે ? (આકૃતિ 11.12)



આકૃતિ 11.12


### 11.4.1 વિશિષ્ટ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ

ચતુષ્કોણને કર્ણ દ્વારા બે ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરવાની આ પદ્ધતિના આધારે આપણે સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર મેળવી શકીએ. આકૃતિ 11.13માં ચતુષ્કોણ ABCD એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે. તેથી તેના વિકર્ણો એકબીજાને લંબ સમદ્વિભાજક થશે.

સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ =  $(\Delta ACD$ નું ક્ષેત્રફળ) +  $(\Delta ABC$ નું ક્ષેત્રફળ)



$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{1}{2} \times AC \times OD\right) + \left(\frac{1}{2} \times AC \times OB\right) \\
 &= \frac{1}{2} AC(OD + OB) = \frac{1}{2} AC \times BD \quad (\because OD + OB = BD) \\
 &= \frac{1}{2} d_1 \times d_2 \quad \text{જ્યાં } d_1 = AC \text{ અને } d_2 = BD \text{ છે.}
 \end{aligned}$$



આકૃતિ 11.13

આમ, સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ તેના બંને વિકર્ણના ગુણાકારનું અડધું હોય છે.

**ઉદાહરણ 2 :** એક સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણોની લંબાઈ 10 સેમી અને 8.2 સેમી હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

**ઉકેલ :** સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ =  $\frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$  જ્યાં  $d_1, d_2$  વિકર્ણોની લંબાઈ છે.

$$= \frac{1}{2} (10)(8.2) = 41 \text{ સેમી}^2$$


### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનો વિકર્ણ દોરી તેને એકરૂપ ત્રિકોણોમાં વહેંચી શકાય છે. શું સમલંબ ચતુષ્કોણને પણ આ રીતે વિકર્ણ દ્વારા વિભાજિત કરવાથી બે એકરૂપ ત્રિકોણ પ્રાપ્ત થશે ?



### પ્રયત્ન કરો


નીચે દોરેલા ચતુષ્કોણોનાં ક્ષેત્રફળ શોધો. (આકૃતિ 11.14)



આકૃતિ 11.14


### 11.5 બહુકોણનું ક્ષેત્રફળ

આપણે, જેમ ચતુષ્કોણને ત્રિકોણોમાં વહેંચીને તેનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકીએ છીએ, તે જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને બહુકોણ (Polygon)નું ક્ષેત્રફળ મેળવી શકાય છે. નીચે આપેલ આકૃતિ 11.15 અને 11.16માં દર્શાવેલા પંચકોણનાં ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરો.



આકૃતિ 11.15

વિકર્ણ AC અને ADની રચના કરીને પંચકોણ ABCDEને ત્રણ ત્રિકોણોમાં વહેંચી શકાય છે. તેથી પંચકોણ ABCDEનું ક્ષેત્રફળ =  $\Delta ABC$ નું ક્ષેત્રફળ +  $\Delta ACD$ નું ક્ષેત્રફળ +  $\Delta AED$ નું ક્ષેત્રફળ થશે.



આકૃતિ 11.16



એક વિકર્ણ AD અને તેના પર બે લંબ BF અને CGની રચના કરવાથી પંચકોણ ABCDEને ચાર ભાગોમાં વહેંચી શકાય છે. તેથી, પંચકોણ ABCDEનું ક્ષેત્રફળ = કાટકોણ ત્રિકોણ AFBનું ક્ષેત્રફળ + સમલંબ BFGCનું ક્ષેત્રફળ + કાટકોણ ત્રિકોણ CGDનું ક્ષેત્રફળ +  $\Delta AED$ નું ક્ષેત્રફળ (અહીં સમલંબ ચતુષ્કોણ BFGCની સમાંતર બાજુઓને ઓળખો.)





### પ્રયત્ન કરો

- (i) નીચેની આકૃતિ 11.17માં દર્શાવેલા બહુકોણના ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે તેને ત્રિકોણ અને સમલંબ ચતુષ્કોણમાં વિભાજિત કરો.



આકૃતિ 11.17

બહુકોણ EFGHIનો એક વિકર્ણ FI છે. બહુકોણ MNOPQRનો એક વિકર્ણ NQ છે.

- (ii) બહુકોણ ABCDEને આકૃતિ 11.18માં દર્શાવ્યા મુજબ જુદા-જુદા ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલ છે. અહીં  $AD = 8$  સેમી,  $AH = 6$  સેમી,  $AG = 4$  સેમી,  $AF = 3$  સેમી અને લંબ  $BF = 2$  સેમી,  $CH = 3$  સેમી,  $EG = 2.5$  સેમી આપવામાં આવેલ છે તો બહુકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

બહુકોણ ABCDEનું ક્ષેત્રફળ =

$\Delta AFB$ નું ક્ષેત્રફળ + .....

$$\Delta AFB \text{નું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times AF \times BF =$$

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 2 = \dots\dots\dots$$

$$\text{સમલંબ ચતુષ્કોણ FBCHનું ક્ષેત્રફળ} = FH \times \frac{(BF+CH)}{2}$$


$$= 3 \times \frac{(2+3)}{2} \quad (FH = AH - AF)$$

$$\Delta CHD \text{નું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times HD \times CH = \dots\dots\dots$$


$$\Delta ADE \text{નું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times AD \times GE = \dots\dots\dots$$

તેથી, બહુકોણ ABCDEનું ક્ષેત્રફળ = .....

- (iii) આકૃતિ 11.19માં દર્શાવેલ બહુકોણ MNOPQRમાં જો  $MP = 9$  સેમી,  $MD = 7$  સેમી,  $MC = 6$  સેમી,  $MB = 4$  સેમી અને  $MA = 2$  સેમી હોય, તો બહુકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.  $NA$ ,  $OC$ ,  $QD$  અને  $RB$  એ વિકર્ણ  $MP$ ને દોરેલા લંબ છે.



આકૃતિ 11.18



આકૃતિ 11.19

**ઉદાહરણ 1 :** એક સમલંબ આકારના ખેતરનું ક્ષેત્રફળ  $480 \text{ મી}^2$  છે. આ ખેતરની સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબઅંતર 15 મીટર છે અને સમાંતર બાજુઓમાંથી એકની લંબાઈ 20 મીટર છે તો બીજી સમાંતર બાજુની લંબાઈ શોધો.

**ઉકેલ :** સમલંબ ચતુષ્કોણની સમાંતર બાજુઓમાંથી એકની લંબાઈ  $a = 20$  મીટર અને બીજી સમાંતર બાજુની લંબાઈ  $b$  ધારો અને તેમની વચ્ચેનું લંબ અંતર  $h = 15$  મીટર છે.

ઉપરાંત સમલંબ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ =  $480 \text{ મીટર}^2$  આપેલ છે.

$$\text{સમલંબનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2}h(a + b)$$

$$\therefore 480 = \frac{1}{2} \times 15 \times (20 + b)$$

$$\therefore \frac{480 \times 2}{15} = 20 + b$$

$$\therefore 64 = 20 + b \therefore b = 44 \text{ મીટર}$$

આથી સમલંબ ચતુષ્કોણની બીજી સમાંતર બાજુ 44 મીટરની હશે.

**ઉદાહરણ 2 :** સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 240 સેમી<sup>2</sup> છે અને તેના એક વિકર્ણની લંબાઈ 16 સેમી છે તો બીજા વિકર્ણની લંબાઈ શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે એક વિકર્ણની લંબાઈ  $d_1 = 16$  સેમી છે અને બીજા વિકર્ણની લંબાઈ  $d_2$  છે.

$$\text{હવે સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2}d_1 \cdot d_2$$


$$\therefore 240 = \frac{1}{2} \times 16 \times d_2$$

$$\therefore \frac{240 \times 2}{16} = d_2$$


$$\therefore d_2 = 30 \text{ સેમી}$$

સમબાજુ ચતુષ્કોણના બીજા વિકર્ણની લંબાઈ 30 સેમી છે.


**ઉદાહરણ 3 :** આકૃતિ 11.20માં એક સમબાજુ ષટ્કોણ MNOPQR દર્શાવેલ છે, તેની દરેક બાજુ 5 સેમી લંબાઈની છે. આકૃતિ 11.21માં દર્શાવ્યા મુજબ અમન અને રિદ્ધિમા આ ષટ્કોણને જુદી-જુદી રીતે વિભાજિત કરે છે. આ બંને પ્રકારના વિભાજનના આધારે ષટ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવો.



આકૃતિ 11.20



અમનની રીત




રિદ્ધિમાની રીત

આકૃતિ 11.21

**ઉકેલ :** અમન દ્વારા કરેલ વિભાજન પ્રમાણે :

આપેલ ષટ્કોણ સમબાજુ હોવાથી NQ વિકર્ણ ષટ્કોણને બે એકરૂપ સમલંબ ચતુષ્કોણમાં વિભાજિત કરે છે. તમે તેને કાગળમાં ષટ્કોણ કાપી પછી NQમાંથી વાળીને ખરાઈ કરી શકો (જુઓ આકૃતિ

11.22). હવે સમલંબ MNQRનું ક્ષેત્રફળ =  $4 \times \frac{(11+5)}{2} = 2 \times 16 = 32$  સેમી<sup>2</sup>



આકૃતિ 11.23

તેથી, ષટ્કોણ MNOPQRનું ક્ષેત્રફળ =  $2 \times 32 = 64$  સેમી<sup>2</sup>

રિદ્ધિમાએ કરેલ ષટ્કોણના વિભાજન પ્રમાણે :


આકૃતિ 11.23માં  $\Delta MNO$  અને  $\Delta RPQ$  એકરૂપ ત્રિકોણ છે. તેના શિરોબિંદુમાંથી દોરેલા લંબની લંબાઈ 3 સેમી છે (આકૃતિ 11.23). આ બન્ને ત્રિકોણોને કાપી એકબીજા પર મૂકીને એકરૂપતાની ચકાસણી કરી શકાય.

$$\Delta MNO\text{નું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12 \text{ સેમી}^2$$

$\Delta RPQ$ નું ક્ષેત્રફળ = 12 સેમી<sup>2</sup> ( $\therefore \Delta MNO$  અને  $\Delta RPQ$  એકરૂપ ત્રિકોણો છે.)

લંબચોરસ MOPRનું ક્ષેત્રફળ =  $8 \times 5 = 40$  સેમી<sup>2</sup>


હવે ષટ્કોણ MNOPQRનું ક્ષેત્રફળ =  $40 + 12 + 12 = 64$  સેમી<sup>2</sup>




આકૃતિ 11.22

## સ્વાધ્યાય 11.2


- એક ટેબલની ઉપર સમતલ પાટિયું સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારનું છે. જો તેની સમાંતર બાજુઓની લંબાઈ 1 મીટર અને 1.2 મીટર હોય અને સમાંતર બાજુઓની વચ્ચેનું લંબઅંતર 0.8 મી હોય, તો આ ટેબલના આ પાટીયાનું ક્ષેત્રફળ શોધો.





2. એક સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 34 સેમી<sup>2</sup> છે અને તેની ઊંચાઈ 4 સેમી છે. આ સમલંબની સમાંતરબાજુઓમાંથી એક બાજુની લંબાઈ 10 સેમી છે, તો તેની બીજી સમાંતર બાજુની લંબાઈ શોધો.




3. એક સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારના ખેતર ABCDની વાડની લંબાઈ 120 મીટર છે. જો BC = 48 મીટર, CD = 17 મીટર અને AD = 40 મીટર હોય, તો આ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ શોધો. અહીં બાજુ AB એ સમાંતર બાજુ AD અને BC પર લંબ છે.



4. એક ચતુષ્કોણ આકારના ખેતરના વિકર્ણની લંબાઈ 24 મીટર છે અને બાકીનાં બે શિરોબિંદુમાંથી આ વિકર્ણ પર દોરેલા લંબ 8 મીટર અને 13 મીટર છે તો ખેતરનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
5. એક સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણોની લંબાઈ 7.5 સેમી અને 12 સેમી છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
6. એક સમબાજુ ચતુષ્કોણની બાજુ 5 સેમી અને વેધ 4.8 સેમી છે, તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો. જો એક વિકર્ણની લંબાઈ 8 સેમી હોય તો બીજા વિકર્ણની લંબાઈ મેળવો.
7. કોઈ મકાનના ભોંયતળિયામાં સમબાજુ ચતુષ્કોણ આકારની 3000 લાદીઓ લગાડેલ છે. આ લાદીના વિકર્ણની લંબાઈ 45 સેમી અને 30 સેમી છે. હવે એક ચોરસ મીટર લાદી ઘસવાનો ખર્ચ જો 4 રૂપિયા હોય તો સમગ્ર ભોંયતળિયાની લાદી ઘસાવવા માટે કેટલો ખર્ચ થશે ?
8. મોહન એક સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારનું ખેતર ખરીદવા ઇચ્છે છે. આ ખેતરની નદી તરફની બાજુ એ, રસ્તા તરફની બાજુને સમાંતર અને અંતરમાં બમણી છે. જો આ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ 10,500 મી<sup>2</sup> હોય અને ખેતરની સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર 100 મીટર હોય તો ખેતરની નદી તરફની બાજુઓની લંબાઈ શોધો.




9. જમીનથી ઉપર ઊઠેલ એક ઓટલો છે. તેની ઉપરનું સમતલ સમબાજુ અષ્ટકોણ આકારનું છે. જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. આ અષ્ટકોણીય સમતલનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
10. એક પંચકોણ આકારનો બગીચો છે જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. આ પંચકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે જ્યોતિ અને કવિતાએ જુદી-જુદી રીતે પંચકોણને વિભાજિત કરેલ છે.



જ્યોતિએ કરેલ વિભાજન કવિતાએ કરેલ વિભાજન


બન્ને રીતે કરેલા વિભાજનની મદદથી બગીચાનું ક્ષેત્રફળ શોધો. શું તમે આ પંચકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાની અન્ય કોઈ રીત બતાવી શકો છો ?

11. આકૃતિમાં બતાવેલ ફોટો ફેમની બહારની ધારનું માપ 24 સેમી × 28 સેમી છે અને અંદરની ધારનું માપ અનુક્રમે 16 સેમી × 20 સેમી છે. હવે જો ફેમના ચારે ટુકડાની જાડાઈ સમાન હોય તો ફેમના પ્રત્યેક ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ શોધો.



### 11.6 ઘન આકાર

આગળના ધોરણમાં આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ કે દ્વિ-પરિમાણીય આકૃતિઓને, ત્રિ-પરિમાણીય આકારના ફલક સ્વરૂપે ઓળખી શકાય છે. અત્યાર સુધીમાં મુખ્યત્વે આપણે જે ઘન આકાર (Solid Shape)નો અભ્યાસ કર્યો તે આકૃતિ 11.24માં દર્શાવેલ છે તે જુઓ.




આકૃતિ 11.24


આકૃતિ 11.24માં દર્શાવેલા કેટલાક આકારોમાં બે કે બેથી વધારે એકરૂપ સપાટી આવેલી છે. તેનું નામકરણ કરો. કયા ઘનમાં બધી સપાટી એકરૂપ છે ? તે જણાવો.

**આટલું કરો**

આકૃતિ 11.25માં દર્શાવ્યા મુજબ સાબુ, રમકડાં, દંતમંજન, બિસ્કિટ વગેરે ઘનાકાર, નળાકાર જેવા જુદા-જુદા આકારના ખોખા(બોક્સ)માં આવે છે. આવા ડબ્બા કે ખોખાં ભેગાં કરો અને તેના આકારોનો અભ્યાસ કરો (આકૃતિ 11.25).




આકૃતિ 11.25



હવે એક પછી એક જુદા-જુદા આકારના ડબ્બા/ખોખા લો. તેની દરેક સપાટીને કાપીને અલગ કરો. દરેક સપાટીના આકારનું અવલોકન કરો. સપાટીને એકબીજા ઉપર રાખીને ખાતરી કરો કે તેઓ સમાન છે કે કેમ ? કુલ સપાટી અને સમાન સપાટીની સંખ્યા શોધો અને તમારાં તારણો લખો.






આકૃતિ 11.26  
(લંબવૃત્તીય  
નળાકાર)

શું તમે નીચેની બાબતો પર ધ્યાન આપ્યું ?

નળાકારના સમાન (એકરૂપ) વર્તુળાકાર બંને સપાટી એકબીજાને સમાંતર છે (આકૃતિ 11.26 જુઓ).


હવે આ વર્તુળાકાર સપાટી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, વર્તુળાકાર સપાટીના મધ્યકેન્દ્રને જોડતો રેખાખંડ આધારને લંબ છે. આવા નળાકારને લંબવૃત્તીય નળાકાર કહે છે. આપણે માત્ર આ પ્રકારના જ નળાકારનો અભ્યાસ કરીશું. અલબત્ત, આકૃતિ 11.27માં દર્શાવ્યા મુજબના બીજા પ્રકારના નળાકાર પણ હોય છે, જે લંબવૃત્તીય નળાકાર નથી.



આકૃતિ 11.27  
(આ એક લંબવૃત્તીય  
નળાકાર નથી.)



## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

અહીં આપેલી આકૃતિમાં આપેલા ઘનાકારને નળાકાર કહેવો એ કંઈ ખોટું છે ?



### 11.7 ઘન, લંબઘન અને નળાકારના પૃષ્ઠફળ (પૃષ્ઠીય ક્ષેત્રફળ)

ઈમરાન, મોનિકા અને જસપાલ ક્રમશઃ આકૃતિ 11.28માં દર્શાવેલા સમાન ઊંચાઈના લંબઘન, સમઘન અને નળાકારને રંગ કરે છે.



આકૃતિ 11.28

હવે તેઓ એ જાણવા પ્રયત્ન કરે છે કે કોણે વધુ રંગ કર્યો ? હરિ તેમને સલાહ આપે છે કે પ્રત્યેક ઊબાનું પૃષ્ઠફળ શોધવાથી તેઓ નક્કી કરી શકશે કે કોણે વધુ રંગ કર્યો છે.


કુલ પૃષ્ઠફળ મેળવવા માટે ઘનાકારની દરેક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ મેળવો અને તેનો સરવાળો કરો. આમ, કોઈ પણ ઘન આકારનું પૃષ્ઠફળ તેની સપાટીના ક્ષેત્રફળના સરવાળા જેટલું હોય છે. આ બાબતને વધુ સ્પષ્ટ કરવા આપણે એક પછી એક કરીને દરેક આકાર વિશે આપણે સમજીએ.

#### 11.7.1 લંબઘન


ધારો કે આકૃતિ 11.29માં દર્શાવ્યા મુજબનું દંતમંજન(ટૂથપેસ્ટ)નું પોખું તમારી પાસે છે. હવે આ પોખા(બોક્સ)ને આકૃતિ 11.30માં દર્શાવ્યા મુજબ કાપી અને ખોલી નાખતા દરેક ફલકના ક્ષેત્રફળ જાળીની જેમ એક બીજા સાથે જોડાયેલા પ્રાપ્ત થશે.

હવે અહીં દરેક બાજુની લંબાઈ દર્શાવો. આપણે જાણીએ છીએ કે લંબઘન (Cuboid)માં ત્રણ જોડ એકરૂપ લંબચોરસ ફલક પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રત્યેક ફલકનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીશું ?

પોખા(બોક્સ)ના દરેક ફલકનું ક્ષેત્રફળ મેળવી કુલ ક્ષેત્રફળ મેળવો. આપણે જાણીએ છીએ કે, લંબઘનનું કુલ ક્ષેત્રફળ = ક્ષેત્રફળ I + ક્ષેત્રફળ II + ક્ષેત્રફળ III + ક્ષેત્રફળ IV + ક્ષેત્રફળ V + ક્ષેત્રફળ VI

$$= (h \times l) + (b \times l) + (b \times h) + (l \times h) + (b \times h) + (l \times b)$$


આકૃતિ 11.29



આકૃતિ 11.30




તેથી કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ =  $2[(h \times l) + (b \times h) + (b \times l)] = 2(lb + bh + hl)$

જ્યાં,  $h$ ,  $l$  અને  $b$  અનુક્રમે લંબઘનની ઊંચાઈ, લંબાઈ અને પહોળાઈ છે. હવે જો ઉપરોક્ત દર્શાવેલ ખોખાની ઊંચાઈ, લંબાઈ અને પહોળાઈ ક્રમશઃ 20 સેમી, 15 સેમી અને 10 સેમી હોય તો,


$$\begin{aligned} \text{કુલ પૃષ્ઠફળ} &= 2[(20 \times 15) + (20 \times 10) + (10 \times 15)] \\ &= 2(300 + 200 + 150) = 1300 \text{ ચોરસસેમી થાય.} \end{aligned}$$

### પ્રયત્ન કરો


આકૃતિ 11.31માં દર્શાવેલ લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ મેળવો.



આકૃતિ 11.31



- લંબઘનના કુલ પૃષ્ઠફળમાંથી તેના તળિયા અને ઉપરની સપાટીને બાદ કરતાં લંબઘનની ચાર દીવાલનું ક્ષેત્રફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે તમે જે લંબઘન આકારના ઓરડામાં બેઠા છો, તેની ચારે દીવાલનું કુલ ક્ષેત્રફળ, ઓરડાનું પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ (ખુલ્લા લંબઘનનું ક્ષેત્રફળ) તરીકે ઓળખાય છે જુઓ આકૃતિ 11.32. આમ, લંબઘનના પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ (lateral surface area)  $2(h \times l + b \times h)$  અથવા  $2h(l + b)$  વડે મેળવી શકાય છે.




આકૃતિ 11.32

### આટલું કરો

- તમારા વર્ગમાં શિક્ષક જે ડસ્ટર લઈને આવે છે તે લંબઘન આકારનું છે. આ ડસ્ટરની ઊંચાઈ જેટલી પહોળાઈ ધરાવતી ભૂરા રંગની કાગળની પટ્ટીને ડસ્ટરની આસ-પાસની ચારે સપાટી સાથે ગોઠવીને એક પરિભ્રમણ પૂરું કરી વધારાની કાગળની પટ્ટી દૂર કરો. હવે આ કાગળની પટ્ટી દ્વારા લંબઘનની ચારે સપાટી ઘેરાયેલી છે. હવે આ કાગળની પટ્ટીને હટાવીને તેનું ક્ષેત્રફળ માપો. શું આ માપ ડસ્ટરના પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ જેટલું છે ?
- તમારા વર્ગખંડની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ માપો અને નીચે માગ્યા મુજબનું પૃષ્ઠફળ શોધો.
  - દરવાજા અને બારીને બાદ કરતા વધતું ઓરડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ
  - આ ઓરડાનું પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ
  - ઓરડાને જે ભાગમાં રંગવાનો છે તેનું કુલ ક્ષેત્રફળ

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

- શું આપણે કહી શકીએ કે લંબઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ = પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ + 2 (તળિયાનું ક્ષેત્રફળ) ?
- જો આકૃતિ 11.33(i)માં દર્શાવેલા લંબઘનની ઊંચાઈ અને આધારની લંબાઈને પરસ્પર બદલી નાખીએ તો આકૃતિ 11.33(ii)માં દર્શાવેલ લંબઘન પ્રાપ્ત થાય છે તો તેનું પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ બદલાઈ જશે ?



(i)

આકૃતિ 11.33




(ii)


## 11.7.2 ઘન (Cube)

## આટલું કરો


એક આલેખપત્ર પર આકૃતિ 11.34(i)માં દર્શાવ્યા મુજબની રેખાકૃતિ દોરો અને તેને કાપો. તમે જાણો છો તેમ આ રેખાકૃતિ એક ઘનનું પૃષ્ઠફળ દર્શાવતી નેટ (જાળી) છે. આ નેટને આકૃતિ 11.34(ii)માં દર્શાવ્યા મુજબ વાળો અને આકૃતિ 11.34(iii)માં દર્શાવ્યા મુજબ ગમ પટ્ટી લગાવીને ઘન તૈયાર કરો.



આકૃતિ 11.34



(i)



(ii)



આકૃતિ 11.35

- (a) આકૃતિ 11.35(i)માં દર્શાવેલ ઘનની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ કેટલી છે ? યાદ રાખો કે ઘનની દરેક સપાટી ચોરસ આકારની હોય છે. તેથી ઘનની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ સમાન હોય છે.
- (b) ઘનની દરેક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ લખો. શું બધાં ફલકોનું ક્ષેત્રફળ સમાન મળે છે ?
- (c) આ ઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ લખો.
- (d) જો ઘનની પ્રત્યેક બાજુની લંબાઈ  $l$  હોય, તો પ્રત્યેક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શું થશે ? (આકૃતિ 11.35 (ii) જુઓ.)
- શું એમ કહી શકાય કે  $l$  લંબાઈની બાજુવાળા ઘનનું પૃષ્ઠફળ  $6l^2$  થાય ?

## પ્રયત્ન કરો



આકૃતિ 11.36માં દર્શાવેલ ઘન Aનું પૃષ્ઠફળ અને ઘન Bનું પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ શોધો.




આકૃતિ 11.36

વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો




- (i) આકૃતિ 11.37માં દર્શાવ્યા મુજબ  $b$  બાજુવાળા બે ઘનને જોડીને એક લંબઘન બનાવ્યો છે તો આ લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શું હશે ? શું એ  $12b^2$  હશે ? શું આવી જ રીતે  $b$  બાજુ ધરાવતાં ત્રણ ઘન જોડીને બનાવેલ લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ  $18b^2$  થશે ? કેમ ?



આકૃતિ 11.37

- (ii) સમાન બાજુવાળા 12 લંબઘનને કઈ રીતે ગોઠવીએ તો તેનાથી બનતા લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ લઘુત્તમ થાય ?
- (iii) આકૃતિ 11.38માં દર્શાવ્યા મુજબ એક ઘન ઉપર રંગ કર્યા બાદ તેના એકસરખા 64 ઘન બને તેમ કાપવામાં આવેલ છે અને અલગ કરવામાં આવે છે. તો આમાંથી કેટલા ઘન એવા હશે કે તેની એક પણ બાજુ રંગેલી નહીં હોય ? કેટલા ઘનનું માત્ર એક ફલક (બાજુ) રંગેલું હશે ? કેટલા ઘનની બે સપાટી રંગેલી હશે ? અને કેટલા ઘનની ત્રણ સપાટી રંગેલી હશે ?




આકૃતિ 11.38

11.7.3 નળાકાર

આપણે જેટલા નળાકાર (Cylinder) જોઈએ છીએ તેમાંથી મોટા ભાગના લંબવૃત્તીય નળાકાર હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે ડબ્બો, ભૂંગળું (ગોળ પાઈપ), ટયૂબલાઈટ, પાણીની પાઈપ વગેરે.

આટલું કરો


- (i) આકૃતિ 11.39(i)માં દર્શાવ્યા મુજબ એક આલેખપત્ર પર એક નળાકાર કેન કે ડબ્બાને રાખી તેના તળિયાના માપનો ટુકડો કાપીને અલગ કરો. હવે આકૃતિ 11.39(ii)માં બતાવ્યા મુજબ નળાકારની ઊંચાઈ જેટલી પહોળાઈના એક આલેખપત્રને નળાકારની ફરતે વીંટાળો અને વધારાનો આલેખપત્ર કાપી નાખો. હવે આકૃતિ 11.39(iii)માં દર્શાવ્યા મુજબના બે વર્તુળાકાર અને એક લંબચોરસ આલેખના ટુકડાને આકૃતિ 11.39(iv)માં બતાવ્યા મુજબ ગમપટ્ટીથી જોડી નળાકાર તૈયાર કરો.
- આકૃતિ 11.39(iv)માં નળાકાર કેનની વક્સપાટી પર વીંટાળેલ ભાગનો આકાર કેવો છે ?



આકૃતિ 11.39

આ આકાર ચોક્કસપણે લંબચોરસ જ છે. હવે જ્યારે આપણે નળાકારના આ ભાગોને એકબીજા સાથે પટ્ટીથી જોડીએ ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લંબચોરસ પટ્ટીની લંબાઈ નળાકારના તળિયે (કે ઉપરની તરફ) આવેલા વર્તુળના પરિઘ જેટલી હોય છે. વર્તુળાકાર આધાર(તળિયા)ની ત્રિજ્યા  $r$ , લંબચોરસ પટ્ટીની લંબાઈ  $l$  અને પટ્ટીની પહોળાઈ  $h$  માપો. શું  $2\pi r =$  પટ્ટીની લંબાઈ થાય છે ? લંબચોરસ પટ્ટીનું ક્ષેત્રફળ  $2\pi rh$  થાય છે ? ચકાસો. હવે નળાકાર બનાવવામાં વપરાયેલ આલેખપત્ર પરના ચોરસોની સંખ્યા ગણીને નક્કી કરો કે નળાકાર બનાવવા કેટલા ચોરસ એકમનો ઉપયોગ થયેલ છે. શું ગણતરી કરેલ આ માપ લગભગ  $2\pi r (r + h)$ ના માપ જેટલું છે ?

- (ii) આપણે નળાકારના પૃષ્ઠફળનો  $2\pi r (r + h)$  સાથેનો સંબંધ બીજી રીતે પણ મેળવી શકીએ છીએ. નીચેની આકૃતિ 11.40માં દર્શાવ્યા મુજબના એક નળાકારને કાપવાની કલ્પના કરો. (આકૃતિ 11.40)



આકૃતિ 11.40



નોંધ : જ્યારે  $\pi$ ની કિંમત વિષે કંઈ કહેવામાં આવેલ ન હોય ત્યારે તેની કિંમત આપણે  $\frac{22}{7}$  લઈશું.

આથી નળાકારનું પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ (વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ)  $2\pi rh$  છે.  
 નળાકારનું કુલ પૃષ્ઠફળ =  $\pi r^2 + 2\pi rh + \pi r^2$   
 =  $2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r (r + h)$



### પ્રયત્ન કરો

આકૃતિ 11.41માં દર્શાવેલા નળાકારનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો.



આકૃતિ 11.41



### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો


નોંધ કરો કે કોઈ નળાકારના પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ (વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ) નળાકારના આધારના પરિઘ  $\times$  નળાકારની ઊંચાઈ જેટલું હોય છે. શું આપણે લંબઘનના પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ(ચારે દીવાલનું ક્ષેત્રફળ)ને આધાર(તળિયા)ના લંબચોરસની પરિમિતિ  $\times$  લંબઘનની ઊંચાઈના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ ?

**ઉદાહરણ 4 :** એક માછલીઘર લંબઘન આકારનું છે, તેનું બહારથી માપ 80 સેમી  $\times$  30 સેમી  $\times$  40 સેમી છે. હવે આ માછલીઘરના તળિયા પર, બન્ને બાજુ પર, અને માછલીઘરની પાછળની સપાટી પર કાગળ લગાડવાનો છે તો જોઈતા કાગળનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

**ઉકેલ :** માછલીઘરની લંબાઈ ( $l$ ) = 80 સેમી  
 માછલીઘરની પહોળાઈ ( $b$ ) = 30 સેમી



$$\begin{aligned}
 \text{માછલીઘરની ઊંચાઈ (h)} &= 40 \text{ સેમી છે.} \\
 \text{તેથી તળિયાનું ક્ષેત્રફળ} &= l \times b = 80 \times 30 = 2400 \text{ સેમી}^2 \\
 \text{એક સાઈડ(બાજુ)નું ક્ષેત્રફળ} &= b \times h = 30 \times 40 = 1200 \text{ સેમી}^2 \\
 \text{પાછલા ફલકનું ક્ષેત્રફળ} &= l \times h = 80 \times 40 = 3200 \text{ સેમી}^2 \\
 \text{માંગેલ ક્ષેત્રફળ} &= \text{તળિયાનું ક્ષેત્રફળ} + \text{પાછળના ફલકનું ક્ષેત્રફળ} \\
 &\quad + (2 \times \text{બાજુ પરના ફલકનું ક્ષેત્રફળ}) \\
 &= 2400 + 3200 + (2 \times 1200) = 8000 \text{ સેમી}^2
 \end{aligned}$$



તેથી જરૂરી રંગીન કાગળનું ક્ષેત્રફળ 8000 સેમી<sup>2</sup> છે.

**ઉદાહરણ 5 :** એક લંબઘન આકારના ઓરડાનું અંદરનું માપ 12 મી × 8 મી × 4 મી છે. ઓરડો રંગવાનો ભાવ 5 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર હોય તો ઓરડાની ચારે દીવાલ રંગવાનો ખર્ચ કેટલો થશે ? અને જો ઓરડાની છતને પણ રંગીએ તો રંગ કરાવવાનો ખર્ચ કેટલો થશે ?

**ઉકેલ :**

$$\begin{aligned}
 \text{ધારો કે ઓરડાની લંબાઈ (l)} &= 12 \text{ મીટર} \\
 \text{ઓરડાની પહોળાઈ (b)} &= 8 \text{ મીટર} \\
 \text{ઓરડાની ઊંચાઈ (h)} &= 4 \text{ મીટર} \\
 \text{ઓરડાની ચારે દીવાલનું ક્ષેત્રફળ} &= \text{ભોંયતળિયાની પરિમિતિ} \times \text{ઓરડાની ઊંચાઈ} \\
 &= 2(l + b) \times h \\
 &= 2(12 + 8) \times 4 \\
 &= 2 \times 20 \times 4 = 160 \text{ મીટર}^2
 \end{aligned}$$

હવે રંગ કરાવવાનો ખર્ચ 5 રૂપિયા/મીટર<sup>2</sup> છે.

$$\begin{aligned}
 \text{તેથી ઓરડાની ચારે દીવાલ રંગવાનો કુલ ખર્ચ} &= 160 \times 5 = 800 \text{ રૂપિયા} \\
 \text{છતનું ક્ષેત્રફળ} &= l \times b = 12 \times 8 = 96 \text{ મી}^2 \\
 \text{માટે છતને રંગવાનો ખર્ચ} &= 96 \times 5 = 480 \text{ રૂપિયા} \\
 \text{તેથી ઓરડાને રંગવાનો કુલ ખર્ચ} &= \text{ચાર દીવાલ રંગવાનો ખર્ચ} + \text{છત રંગવાનો ખર્ચ} \\
 &= 800 + 480 = ₹ 1280
 \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 6 :** એક મહેલમાં 24 નળાકાર સ્તંભો છે. દરેક સ્તંભની ત્રિજ્યા 28 સેમી અને ઊંચાઈ 4 મીટર છે. 8 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટરના ભાવથી બધા સ્તંભોની વક્સપાટીને રંગવાનો કુલ ખર્ચ કેટલો થશે ?

**ઉકેલ :**

$$\begin{aligned}
 \text{નળાકાર સ્તંભની ત્રિજ્યા} &= 28 \text{ સેમી} = 0.28 \text{ મીટર} \\
 \text{નળાકાર સ્તંભની ઊંચાઈ} &= 4 \text{ મીટર} \\
 \text{હવે, નળાકારની વક્સપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= 2\pi rh \\
 \text{સ્તંભની વક્સપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= 2 \times \frac{22}{7} \times 0.28 \times 4 = 7.04 \text{ મી}^2 \\
 \text{આવા 24 સ્તંભોની વક્સપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= 7.04 \times 24 = 168.96 \text{ મી}^2 \\
 \text{વળી, 1 મીટર}^2 \text{ રંગકામ માટેનો ખર્ચ} &= ₹ 8 \text{ છે.}
 \end{aligned}$$

તેથી 168.96 મીટર<sup>2</sup> રંગકામ કરવાનો કુલ ખર્ચ = 168.96 × 8 = ₹ 1351.68

**ઉદાહરણ 7 :** એક નળાકારની ત્રિજ્યા 7 સેમી અને કુલ પૃષ્ઠફળ 968 સેમી<sup>2</sup> છે, તો તેની ઊંચાઈ શોધો.

**ઉકેલ :**

$$\begin{aligned}
 \text{ધારો કે નળાકારની ઊંચાઈ} &= h \text{ છે.} \\
 \text{નળાકારની ત્રિજ્યા} &= r = 7 \text{ સેમી} \\
 \text{નળાકારનું કુલ પૃષ્ઠફળ} &= 2\pi r (h + r) \\
 \therefore 968 &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 (h + 7) \\
 \therefore h &= 15 \text{ સેમી થાય.}
 \end{aligned}$$

એટલે કે નળાકારની ઊંચાઈ 15 સેમી હશે.










## સ્વાધ્યાય 11.3

- બાજુની આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબના માપનો એક લંબઘન અને એક સમઘન છે. આ બન્ને ડબ્બામાંથી કયો ડબ્બો બનાવવામાં ઓછી સામગ્રી વપરાશે ?
- 80 સેમી × 48 સેમી × 24 સેમી માપ ધરાવતી એક સૂટકેસને તાડપત્રીના કપડાથી ઢાંકવાની છે (કવર બનાવવાનું છે). આવી 100 સૂટકેસને ઢાંકવા માટે 96 સેમી પહોળાઈ ધરાવતી તાડપત્રીના કેટલા મીટર કાપડની જરૂર પડશે ?
- એક એવા ઘનની બાજુનું માપ શોધો કે જેનું પૃષ્ઠફળ 600 સેમી<sup>2</sup> હોય ?
- રુખસારે 1 મી × 2 મી × 1.5 મી માપવાળી પેટીને બહારથી રંગ કર્યો. જો તેણે પેટીના તળિયા સિવાય બહારની તરફ બધે રંગ કર્યો હોય, તો તેણે કેટલા પૃષ્ઠફળમાં રંગ કર્યો હશે ?
- ડેનિયલ એક લંબઘન આકારના ઓરડાની દીવાલ અને છતને રંગે છે જેની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ક્રમશઃ 15 મી, 10 મી અને 7 મી છે. રંગના એક ડબ્બામાંથી 100 મીટર<sup>2</sup> ક્ષેત્રફળ પર રંગ કરી શકાતો હોય, તો ઓરડાને રંગવા માટે કેટલા ડબ્બા રંગ જોઈશે ?
- જમણી બાજુએ આપેલી આકૃતિમાંના બંને ડબ્બા કઈ રીતે સમાન છે અને કઈ રીતે એક બીજાથી જુદા પડે છે ? કયા ડબ્બાનું પાર્શ્વ પૃષ્ઠફળ વધારે હશે ?
- 7 મીટર ત્રિજ્યા અને 3 મીટર ઊંચાઈવાળી એક બંધ નળાકાર ટાંકી ધાતુના પતરામાંથી બનાવવામાં આવેલ છે. આ ટાંકીને બનાવવા માટે ધાતુનું કેટલું પતરું જોઈશે ?
- એક ખુલ્લા નળાકારની વક્સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 4224 સેમી<sup>2</sup> છે. આ નળાકારને તેની ઊંચાઈ તરફથી કાપીને 33 સેમી પહોળાઈની એક લંબચોરસ આકારની સીટ બનાવવામાં આવે છે, તો લંબચોરસ સીટની પરિમિતિ મેળવો.
- એક રસ્તાને એક વખત સમતલ કરવા માટે રોલરને 750 વખત પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. હવે જો રોલરનો વ્યાસ 84 સેમી અને પહોળાઈ 1 મીટર હોય તો રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
- એક કંપની તેના દૂધ પાવડરને એવા નળાકાર ડબ્બામાં પેક કરે છે જેનો વ્યાસ 14 સેમી અને ઊંચાઈ 20 સેમી હોય. બાજુની આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કંપની ડબ્બાની વક્સપાટી પર ફરતે લેબલ લગાવે છે. જો આ લેબલ નળાકારના શીર્ષ અને તળિયા બન્નેથી 2 સેમી દૂર ચોંટાડવામાં આવતું હોય તો લેબલનું ક્ષેત્રફળ શોધો.




### 11.8 ઘન, લંબઘન અને નળાકારનું ઘનફળ/કદ

ત્રિપરિમાણીય આકાર દ્વારા ઘેરાતી જગ્યાને તેનું ઘનફળ/કદ (Volume) કહેવામાં આવે છે. તમારી આસપાસની વસ્તુઓના ઘનફળ(કદ)ની સરખામણી કરવાનો પ્રયત્ન કરો. ઉદાહરણ તરીકે, ઓરડામાં રાખેલા કબાટના ઘનફળની સરખામણીમાં તે ઓરડાનું ઘનફળ વધારે છે. એ જ રીતે તમારા પેન્સિલબોક્સનું ઘનફળ તેમાં રાખેલી પેન્સિલ કે દરેક રબ્બરના ઘનફળ કરતા વધારે છે. શું તમે એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુનું ઘનફળ માપી શકો છો ?



યાદ કરો કે આપણે કોઈ પણ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે આલેખપત્ર જેવા ચોરસ એકમોનો ઉપયોગ કરતા હતા. અહીં આપણે ઘનાકાર વસ્તુનું ઘનફળ મેળવવા માટે ઘન એકમોનો ઉપયોગ કરીશું કારણ કે ઘન એ સૌથી વધારે સુવિધાયુક્ત ઠોસ આકાર છે. (જેમ સપાટીના ક્ષેત્રફળના માપન માટે ચોરસ સૌથી વધારે સુવિધાયુક્ત આકાર છે, તેમ ઘન વસ્તુનું ઘનફળ માપવા માટે ઘન એ સૌથી વધુ સુવિધાયુક્ત ઘન આકાર છે.)



આકૃતિ 11.42

કોઈ પણ ઘન પદાર્થનું ઘનફળ મેળવવા માટે આપણે જે-તે ઘનાકાર વસ્તુને ઘન એકમોમાં વિભાજિત કરવાની જરૂર પડે છે. આકૃતિ 11.42માં આપેલ દરેક ઘન આકારનું ઘનફળ 8 ઘન એકમ છે. આ બાબતે વિચારો.

આથી આપણે કહી શકીએ કે, કોઈ પણ ઠોસ(ઘન)ના ઘનફળ માપવા માટે આપણે તેમાં રહેલા ઘન એકમો ગણીએ છીએ.

$$1 \text{ ઘન સેમી} = 1 \text{ સેમી} \times 1 \text{ સેમી} \times 1 \text{ સેમી} = 1 \text{ સેમી}^3$$

$$1 \text{ ઘન મીટર} = 1 \text{ મી} \times 1 \text{ મી} \times 1 \text{ મી} = 1 \text{ મી}^3$$

$$= \dots\dots\dots \text{સેમી}^3$$

$$1 \text{ ઘન મિલીમીટર} = 1 \text{ મિમી} \times 1 \text{ મિમી} \times 1 \text{ મિમી} = 1 \text{ મિમી}^3$$



$$= 0.1 \text{ સેમી} \times 0.1 \text{ સેમી} \times 0.1 \text{ સેમી} = \dots\dots\dots \text{સેમી}^3$$

હવે આપણે ઘન, લંબઘન અને નળાકારનાં ઘનફળ મેળવવા માટેનાં સૂત્ર શોધીશું. ચાલો, દરેક ઘન ઉપર એક પછી એક ચર્ચા કરીએ.

#### 11.8.1 લંબઘન

સમાન આકાર (પ્રત્યેક ઘનની લંબાઈ સમાન) હોય તેવા 36 સમઘન લો અને તેમને વ્યવસ્થિત ગોઠવીને લંબઘન (Cuboid) બનાવો. તમે આવા ઘણા પ્રકારના લંબઘન બનાવી શકો છો. નીચેના કોષ્ટક ઉપર વિચાર કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.


	ઘન	લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	$l \times b \times h = V$
(i)		12	3	1	$12 \times 3 \times 1 = 36$
(ii)		...	...	...	...

(iii)		...	...	...	...
(iv)		...	...	...	...

ઉપર દર્શાવેલ સારણીમાં તમે શું જોયું ?

સારણીના દરેક લંબઘન બનાવવામાં આપણે 36 ઘનનો ઉપયોગ કરેલ છે, તેથી પ્રત્યેક લંબઘનનું ઘનફળ પણ 36 ઘન એકમ થશે. આ ઉપરાંત દરેક લંબઘનનું ઘનફળ તેની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈના ગુણાકારને સમાન છે, તે આપણે અનુભવે જોયું. આથી, ઉપરના ઉદાહરણના આધારે આપણે કહી શકીએ કે, લંબઘનનું ઘનફળ = લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ =  $l \times b \times h$


આ ઉપરાંત આ આપણે લંબઘનનું ઘનફળ = લંબઘનના આધારનું ક્ષેત્રફળ × ઊંચાઈ પણ કહી શકીએ કારણ કે  $l \times b$  = લંબઘનના આધારનું ક્ષેત્રફળ થાય છે.



### આટલું કરો



એક કાગળ લો અને તેનું ક્ષેત્રફળ માપો. આ માપનાં જ બીજાં કાગળ લઈને કાગળની થપ્પી લગાવી એક લંબઘન બનાવો (આકૃતિ 11.43 મુજબ). આ થપ્પીની ઊંચાઈ માપો. કાગળનું ક્ષેત્રફળ અને થપ્પીની ઊંચાઈના ગુણાકારનું મૂલ્ય મેળવી લંબઘનનું ઘનફળ જાણો.



આકૃતિ 11.43


આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે ઘનનું ઘનફળ આ પ્રકારે પણ મેળવી શકાય. (જો કોઈ ઘન આકારનું શીર્ષ (TOP) અને આધાર (BASE) એકરૂપ હોય અને એકબીજાને સમાંતર હોય તો તેની ધાર/કિનારી (EDGE), આધાર(BASE)ને લંબ હશે.) જેનું ઘનફળ શોધવામાં આ રીતના ઉપયોગ કરી શકાતો હોય તેવી વસ્તુઓ બાબતે તમે વિચારી શકો છો ?

### પ્રયત્ન કરો



નીચેની આકૃતિ 11.44માં દર્શાવેલા લંબઘનનું ઘનફળ શોધો.

(i)



આકૃતિ 11.44

### 11.8.2 ઘન

ઘન (Cube) એ લંબઘનનો એક ખાસ પ્રકાર છે. જેમાં  $l = b = h$  થતા હોય, એટલે કે ઘનનું ઘનફળ  $= l \times l \times l = l^3$

#### પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલા ઘનના ઘનફળ શોધો.

(a) 4 સેમી બાજુવાળો ઘન

(b) 1.5 મીટર બાજુવાળો ઘન

#### આટલું કરો

સમાન આકારવાળા 64 ઘનનો ઉપયોગ કરીને જેટલા પ્રકારના લંબઘન બનાવી શકો તેટલા બનાવો અને આ પ્રત્યેક સ્વરૂપના લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધો. શું સમાન ઘનફળવાળી ઘન આકૃતિઓના પૃષ્ઠફળ પણ સમાન હોય છે ?

#### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

એક કંપની બિસ્કિટ વેચે છે. બિસ્કિટને પેક કરવા માટે લંબઘન આકારના ડબ્બાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડબ્બો A  $\rightarrow$  3 સેમી  $\times$  8 સેમી  $\times$  20 સેમી અને ડબ્બો B  $\rightarrow$  4 સેમી  $\times$  12 સેમી  $\times$  10 સેમીનો છે. તો કંપનીને કયા માપના ડબ્બાનો ઉપયોગ કરવાથી આર્થિક લાભ થશે ? કેમ ? શું તમે આવા કોઈ બીજા આકારના ડબ્બાનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી શકો કે જેનું ઘનફળ તેના જેટલું જ હોય પરંતુ આર્થિક દૃષ્ટિએ વધુ લાભદાયક હોય.



### 11.8.3 નળાકાર

આપણે જાણીએ છીએ કે લંબઘનનું ઘનફળ તેના આકારના ક્ષેત્રફળ અને તેની ઊંચાઈના ગુણાકાર દ્વારા મેળવી શકાય છે. શું આ જ રીતે આપણે નળાકારનું ઘનફળ મેળવી શકીએ ?



લંબઘનની જેમ નળાકાર (Cylinder)માં પણ એક આધાર (Base) અને શીર્ષ (Top) હોય છે, જે એકબીજાને એકરૂપ અને સમાંતર હોય છે. લંબઘનની જેમ નળાકારની વક્રસપાટી તેના આધારને લંબ હોય છે.

તેથી, લંબઘનનું ઘનફળ = આધારનું ક્ષેત્રફળ  $\times$  ઊંચાઈ

$$= (l \times b) \times h = lbh$$



નળાકારનું ઘનફળ = આધારનું ક્ષેત્રફળ  $\times$  ઊંચાઈ

$$= \pi r^2 \times h = \pi r^2 h$$



#### પ્રયત્ન કરો

નીચે આપેલા નળાકારના ઘનફળ મેળવો.







### 11.9 ઘનફળ (કદ) અને ક્ષમતા

આ બે શબ્દોમાં વધારે તફાવત નથી.

(a) કોઈ વસ્તુ દ્વારા ઘેરાયેલી જગ્યાની માત્રાને ઘનફળ (કદ - Volume) કહે છે.

(b) કોઈ વાસણમાં ભરી શકાતી વસ્તુની માત્રાને તે વાસણની ક્ષમતા (Capacity) કહેવામાં આવે છે.

નોંધ : જો કોઈ પાણી ભરવાના ધાતુના વાસણમાં 100 સેમી<sup>3</sup> પાણી ભરી શકાય તો તે ધાતુના વાસણની ક્ષમતા 100 સેમી<sup>3</sup> છે.

ક્ષમતાને લિટરમાં પણ માપી શકાય છે. લિટર અને સેમી<sup>3</sup>માં નીચે મુજબ સંબંધ છે :

1 મિલી = 1 સેમી<sup>3</sup>, 1 લિટર = 1000 સેમી<sup>3</sup>. આમ, 1 મીટર<sup>3</sup> = 1000000 સેમી<sup>3</sup> = 1000 લિટર

**ઉદાહરણ 8 :** જેનું ઘનફળ 275 સેમી<sup>3</sup> અને આધારનું ક્ષેત્રફળ 25 સેમી<sup>2</sup> હોય, એવા લંબઘનની ઊંચાઈ મેળવો.

**ઉકેલ :** લંબઘનનું ઘનફળ = આધારનું ક્ષેત્રફળ × ઊંચાઈ

$$\begin{aligned} \text{તેથી લંબઘનની ઊંચાઈ} &= \frac{\text{લંબઘનનું ઘનફળ}}{\text{આધારનું ક્ષેત્રફળ}} \\ &= \frac{275}{25} = 11 \text{ સેમી} \end{aligned}$$

આ રીતે લંબઘનની ઊંચાઈ 11 સેમી છે.

**ઉદાહરણ 9 :** એક લંબઘન આકારનું ગોદામ છે. તેનું માપ = 60 મી × 40 મી × 30 મી છે. આ ગોદામની અંદર 0.8 મી<sup>3</sup> ઘનફળ ધરાવતાં કેટલા ડબ્બા રાખી શકાય ?

**ઉકેલ :** એક ડબ્બાનું ઘનફળ = 0.8 મી<sup>3</sup>  
ગોદામનું ઘનફળ = 60 × 40 × 30 = 72000 મી<sup>3</sup>


ગોદામની અંદર રાખી શકાય તેમ હોય તે ડબ્બાની સંખ્યા =  $\frac{\text{ગોદામનું ઘનફળ}}{\text{એક ડબ્બાનું ઘનફળ}} = \frac{60 \times 40 \times 30}{0.8} = 90,000$

આ રીતે, ગોદામની અંદર 90,000 ડબ્બા રાખી શકાશે.

**ઉદાહરણ 10 :** 14 સેમી પહોળાઈ ધરાવતાં કાગળને તેની પહોળાઈની દિશામાં વાળીને 20 સેમી ત્રિજ્યાવાળો એક નળાકાર બનાવવામાં આવે છે, તો નળાકારનું ઘનફળ મેળવો (જુઓ આકૃતિ 11.45).

(અહીં  $\pi$  ની કિંમત  $\frac{22}{7}$  લેવી.)

**ઉકેલ :** કાગળને તેની પહોળાઈની દિશામાંથી ગોળ વાળીને નળાકાર બનાવવામાં આવેલ છે, તેથી કાગળની પહોળાઈ નળાકારની ઊંચાઈ થશે અને આ નળાકારની ત્રિજ્યા 20 સેમી છે.



આકૃતિ 11.45

નળાકારની ઊંચાઈ ( $h$ ) = 14 સેમી

ત્રિજ્યા ( $r$ ) = 20 સેમી

નળાકારનું ઘનફળ =  $V = \pi r^2 h$

$$= \frac{22}{7} \times 20 \times 20 \times 14 = 17600 \text{ સેમી}^3$$

તેથી નળાકારનું ઘનફળ 17600 સેમી<sup>3</sup> થશે.



**ઉદાહરણ 11 :** 11 સેમી × 4 સેમી માપ ધરાવતાં લંબચોરસ કાગળના ટુકડાને એકબીજા પર વધુ ન રહે તે રીતે વાળીને 4 સેમી ઊંચાઈનો એક નળાકાર બનાવવામાં આવે છે, તો આ નળાકારનું ઘનફળ શોધો.

**ઉકેલ :** અહીં કાગળની લંબાઈ નળાકારના આધારનો પરિઘ બની જાય છે અને કાગળની પહોળાઈ એ નળાકારની ઊંચાઈ બની જાય છે.

ધારો કે નળાકારની ત્રિજ્યા =  $r$  અને ઊંચાઈ =  $h$  છે.

નળાકારના આધારનો પરિઘ =  $2\pi r = 11$

$$2 \times \frac{22}{7} \times r = 11$$

તેથી,  $r = \frac{7}{4}$  સેમી થશે.

નળાકારનું ઘનફળ ( $V$ ) =  $\pi r^2 h$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{7}{4} \times \frac{7}{4} \times 4 = 38.5 \text{ સેમી}^3$$


તેથી નળાકારનું ઘનફળ 38.5 ઘન સેમી છે.

## સ્વાધ્યાય 11.4


- તમને એક નળાકાર ટાંકી આપેલ છે. નીચે આપેલી કઈ પરિસ્થિતિમાં તમે તેનું પૃષ્ઠફળ મેળવશો અને કઈ પરિસ્થિતિમાં તેનું ઘનફળ મેળવશો ?
  - નળાકાર ટાંકીમાં કેટલું પાણી રાખી શકાશે, તે નક્કી કરવા માટે.
  - નળાકાર ટાંકીને પ્લાસ્ટર કરવા માટે જરૂરી સિમેન્ટની થેલીઓની સંખ્યા જાણવા.
  - નળાકાર ટાંકીમાં ભરેલા પાણીથી પાણીની કેટલી નાની ટાંકીઓ ભરાશે તેની સંખ્યા જાણવા.




- નળાકાર Aનો વ્યાસ 7 સેમી અને ઊંચાઈ 14 સેમી છે. નળાકાર Bનો વ્યાસ 14 સેમી અને ઊંચાઈ 7 સેમી છે. ગણતરી કર્યા વગર તમે કહી શકશો કે ઉપરના બે નળાકારમાંથી કોનું ઘનફળ વધારે હશે ? બંને નળાકારનું ઘનફળ મેળવી તમારા જવાબને ચકાસો. આ ઉપરાંત એ પણ ચકાસો કે વધુ ઘનફળ ધરાવતાં નળાકારનું પૃષ્ઠફળ પણ વધારે છે ?



- એક લંબઘનના આધારનું ક્ષેત્રફળ  $180 \text{ સેમી}^2$  છે અને તેનું ઘનફળ  $900 \text{ સેમી}^3$  છે, તો તે લંબઘનની ઊંચાઈ શોધો.
- એક લંબઘનનું માપ  $60 \text{ સેમી} \times 54 \text{ સેમી} \times 30 \text{ સેમી}$  છે. આ લંબઘનની અંદર 6 સેમી બાજુવાળા કેટલા નાના ઘન રાખી શકાશે ?
- જેનું ઘનફળ  $1.54 \text{ મી}^3$  અને તેના આધારનો વ્યાસ 140 સેમી હોય એવા નળાકારની ઊંચાઈ મેળવો.
- એક દૂધનું ટેન્કર નળાકાર છે, જેની ત્રિજ્યા 1.5 મીટર અને લંબાઈ 7 મીટર છે. આ ટેન્કરમાં કેટલા લિટર દૂધ ભરી શકાશે ?
- જો કોઈ ઘનની દરેક બાજુને બમણી કરી દેવામાં આવે તો
  - તેના પૃષ્ઠફળમાં કેટલા ગણો વધારો થશે ?
  - તેના ઘનફળમાં કેટલા ગણો વધારો થશે ?



8. એક કુંડની અંદર 60 લિટર પાણી પ્રતિ મિનિટના દરથી પડે છે. જો કુંડનું ઘનફળ 108 મી<sup>3</sup> હોય, તો આ કુંડને પાણીથી સંપૂર્ણ ભરાતા કેટલા કલાક લાગશે ?



## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ

(i) સમલંબનું ક્ષેત્રફળ = સમાંતર બાજુઓની લંબાઈઓના સરવાળાનું અડધું × તેમની વચ્ચેનું લંબ અંતર

(ii) સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = વિકર્ણોના ગુણાકારનું અડધું

2. એક ઘનનું પૃષ્ઠફળ તેના ફલકોના ક્ષેત્રફળના સરવાળા જેટલું હોય છે.

3. લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ =  $2(lb + bh + hl)$

ઘનનું પૃષ્ઠફળ =  $6l^2$

નળાકારનું પૃષ્ઠફળ =  $2\pi r(r + h)$

4. કોઈ પણ ઘન વસ્તુ દ્વારા ઘેરાયેલી જગ્યાની માત્રાને તે ઘનાકારનું ઘનફળ કહેવામાં આવે છે.

5. લંબઘનનું ઘનફળ =  $l \times b \times h$



ઘનનું ઘનફળ =  $l^3$

નળાકારનું ઘનફળ =  $\pi r^2 h$

6. (i) 1 સેમી<sup>3</sup> = 1 મિલી

(ii) 1 લિટર = 1000 સેમી<sup>3</sup>

(iii) 1 મી<sup>3</sup> = 1000000 સેમી<sup>3</sup> = 1000 લિટર





## ઘાત અને ઘાતાંક

પ્રકરણ

12

### 12.1 પ્રાસ્તાવિક

શું તમે જાણો છો ?


પૃથ્વીનું વજન 5,970,000,000,000,000,000,000 કિગ્રા છે. અગાઉના ધોરણમાં આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ કે આ પ્રકારની મોટી સંખ્યાઓને ઘાતાંકનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે વધારે સરળતાથી લખી શકાય. દા.ત.,  $5.97 \times 10^{24}$  કિગ્રા. આપણે  $10^{24}$ ને 10ની 24 ઘાત એમ વાંચીશું.

આપણે જાણીએ છીએ કે  $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

તેમજ

$$2^m = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2 \times 2 \dots (m \text{ વખત})$$

ચાલો હવે  $2^{-2}$ નું મૂલ્ય કોના બરાબર છે તે શોધીએ.



### 12.2 ઋણ પૂર્ણાંક ઘાતાંક

તમે જાણો છો કે  $10^2 = 10 \times 10 = 100$

$$10^1 = 10 = \frac{100}{10}$$

$$10^0 = 1 = \frac{10}{10}$$

$$10^{-1} = ?$$

ઉપરની ક્રિયાને આગળ વધારતાં

$$10^{-1} = \frac{1}{10}$$

તે જ રીતે

$$10^{-2} = \frac{1}{10} \div 10 = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100} = \frac{1}{10^2}$$

$$10^{-3} = \frac{1}{100} \div 10 = \frac{1}{100} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3}$$

તો  $10^{-10}$  નું મૂલ્ય કેટલું થાય ?

અહીં ઘાતાંક ઋણ પૂર્ણાંક છે.

ઘાતાંકમાં 1નો ઘટાડો થતાં, મૂલ્ય અગાઉના મૂલ્ય કરતાં  $\frac{1}{10}$  જેટલું થાય છે.

નીચેનાં પદોને ધ્યાનમાં લો.



$$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$$3^2 = 3 \times 3 = 9 = \frac{27}{3}$$

$$3^1 = 3 = \frac{9}{3}$$

$$3^0 = 1 = \frac{3}{3}$$

અગાઉની સંખ્યાને 3  
વડે ભાગતા

ઉપરનાં પદોને જોતાં કહી શકાય કે,

$$3^{-1} = 1 \div 3 = \frac{1}{3}$$

$$3^{-2} = \frac{1}{3} \div 3 = \frac{1}{3 \times 3} = \frac{1}{3^2}$$

$$3^{-3} = \frac{1}{3^2} \div 3 = \frac{1}{3^2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3^3}$$

આ જ પ્રમાણે હવે તમે  $2^2$  નું મૂલ્ય શોધી શકશો.

અહીં,

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2} \quad \text{અથવા} \quad 10^2 = \frac{1}{10^{-2}}$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} \quad \text{અથવા} \quad 10^3 = \frac{1}{10^{-3}}$$

$$3^{-2} = \frac{1}{3^2} \quad \text{અથવા} \quad 3^2 = \frac{1}{3^{-2}} \text{ વગેરે}$$

આમ, આપણે કહી શકીએ કે કોઈપણ શૂન્યેતર પૂર્ણાંક સંખ્યા  $a$  માટે,  $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ , જ્યાં  $m$  એક ધન

પૂર્ણાંક સંખ્યા છે.  $a^{-m}$  એ  $a^m$ નો વ્યસ્ત છે.



### પ્રયત્ન કરો

નિમ્નલિખિત સંખ્યાના વ્યસ્ત શોધો.

- (i)  $2^{-4}$     (ii)  $10^{-5}$     (iii)  $7^{-2}$     (iv)  $5^{-3}$     (v)  $10^{-100}$

આપણે 1425 જેવી સંખ્યાને વિસ્તૃત ઘાત સ્વરૂપે લખતાં શીખ્યા છીએ.

જેમ કે,  $1425 = 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

ચાલો, હવે આપણે 1425.36ને વિસ્તૃત સ્વરૂપે કેવી રીતે દર્શાવાય તે જોઈએ.

$$\text{અહીં, } 1425.36 = 1 \times 1000 + 4 \times 100 + 2 \times 10 + 5 \times 1 + \frac{3}{10} + \frac{6}{100}$$

$$= 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

### પ્રયત્ન કરો

નીચેની સંખ્યાઓને વિસ્તૃત સ્વરૂપે લખો.

- (i) 1025.63    (ii) 1256.249

$$10^{-1} = \frac{1}{10}, 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

### 12.3 ઘાતાંકના નિયમો

આપણે જાણીએ છીએ કે, કોઈપણ શૂન્યેત્તર પૂર્ણાંક સંખ્યા  $a$  માટે,  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  જ્યાં,  $m$  અને  $n$  પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે. શું આ નિયમ ઋણ ઘાતાંક માટે પણ લાગુ પડશે ? ચાલો સમજીએ.

(i) આપણે જાણીએ છીએ કે

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} \text{ અને } 2^{-2} = \frac{1}{2^2}$$

$$\text{માટે } 2^{-3} \times 2^{-2} = \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{2^2} = \frac{1}{2^3 \times 2^2} = \frac{1}{2^{3+2}} = 2^{-5}$$

કોઈપણ શૂન્યેત્તર સંખ્યા  $a$  માટે  $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$



(ii)  $(-3)^{-4} \times (-3)^{-3}$  લેતાં,

$$(-3)^{-4} \times (-3)^{-3} = \frac{1}{(-3)^4} \times \frac{1}{(-3)^3}$$

$$= \frac{1}{(-3)^4 \times (-3)^3}$$

$$= \frac{1}{(-3)^{4+3}} = (-3)^{-7}$$

$(-4) + (-3) = -7$

બે ઘાતાંક  $-3$  અને  $-2$ નો સરવાળો  $-5$  છે.

(iii) હવે  $5^{-2} \times 5^4$  માટે

$$5^{-2} \times 5^4 = \frac{1}{5^2} \times 5^4 = \frac{5^4}{5^2} = 5^{4-2} = 5^2$$

$(-2) + 4 = 2$

ધોરણ 7 માં તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો કે કોઈપણ શૂન્યેત્તર પૂર્ણાંક સંખ્યા  $a$  માટે  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  જ્યાં  $m$  અને  $n$  પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે અને  $m > n$

(iv) હવે,  $(-5)^{-4} \times (-5)^2$  માટે,

$$(-5)^{-4} \times (-5)^2 = \frac{1}{(-5)^4} \times (-5)^2 = \frac{(-5)^2}{(-5)^4} = \frac{1}{(-5)^4 \times (-5)^{-2}}$$

$$= \frac{1}{(-5)^{4-2}} = (-5)^{-2}$$

$(-4) + 2 = -2$

આમ, આપણે કહી શકીએ કે કોઈપણ શૂન્યેત્તર સંખ્યા  $a$  માટે,

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ , જ્યાં  $m$  અને  $n$  પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે.



### પ્રયત્ન કરો

સાદું રૂપ આપી અને ઘાત સ્વરૂપે લખો.

(i)  $(-2)^{-3} \times (-2)^{-4}$  (ii)  $p^3 \times p^{-10}$  (iii)  $3^2 \times 3^{-5} \times 3^6$

આ જ પ્રમાણે તમે નીચે દર્શાવેલ ઘાતાંકના નિયમો ચકાસી શકો છો, જ્યાં  $a$  અને  $b$  શૂન્યેત્તર પૂર્ણાંક હોય તથા  $m$  અને  $n$  કોઈપણ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય.

(i)  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  (ii)  $(a^m)^n = a^{mn}$  (iii)  $a^m \times b^m = (ab)^m$

(iv)  $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$  (v)  $a^0 = 1$

ધન ઘાતાંક માટે આ નિયમો આપણે ધોરણ 7માં શીખી ચૂક્યા છીએ.

ચાલો, હવે આપણે ઉપરના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને થોડાંક ઉદાહરણના ઉકેલ મેળવીએ.



**ઉદાહરણ 1 :** ક્રિમત શોધો.

(i)  $2^{-3}$  (ii)  $\frac{1}{3^{-2}}$

**ઉકેલ :**

(i)  $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$  (ii)  $\frac{1}{3^{-2}} = 3^2 = 3 \times 3 = 9$



**ઉદાહરણ 2 :** સાદું રૂપ આપો.

(i)  $(-4)^5 \times (-4)^{-10}$  (ii)  $2^5 \div 2^{-6}$

**ઉકેલ :**

(i)  $(-4)^5 \times (-4)^{-10} = (-4)^{(5-10)} = (-4)^{-5} = \frac{1}{(-4)^5}$  ( $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ,  $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ )

(ii)  $2^5 \div 2^{-6} = 2^{5-(-6)} = 2^{11}$  ( $a^m \div a^n = a^{m-n}$ )

**ઉદાહરણ 3 :**  $4^{-3}$ ને આધાર 2 હોય તેવા ઘાત સ્વરૂપે દર્શાવો.

**ઉકેલ :** અહીં,  $4 = 2 \times 2 = 2^2$

માટે  $4^{-3} = (2 \times 2)^{-3} = (2^2)^{-3} = 2^{2 \times (-3)} = 2^{-6}$  [ $(a^m)^n = a^{mn}$ ]

**ઉદાહરણ 4 :** સાદુંરૂપ આપો અને જવાબને ઘાત સ્વરૂપે દર્શાવો.

(i)  $(2^5 \div 2^8)^5 \times 2^{-5}$  (ii)  $(-4)^{-3} \times (5)^{-3} \times (-5)^{-3}$

(iii)  $\frac{1}{8} \times (3)^{-3}$  (iv)  $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4$

**ઉકેલ :**

(i)  $(2^5 \div 2^8)^5 \times 2^{-5} = (2^{5-8})^5 \times 2^{-5} = (2^{-3})^5 \times 2^{-5} = 2^{-15-5} = 2^{-20} = \frac{1}{2^{20}}$

(ii)  $(-4)^3 \times (5)^3 \times (-5)^3 = [(-4) \times 5 \times (-5)]^3 = [100]^3 = \frac{1}{100^3}$

$[a^m \times b^m = (ab)^m, a^{-m} = \frac{1}{a^m}$  નિયમનો ઉપયોગ કરતાં]

(iii)  $\frac{1}{8} \times (3)^3 = \frac{1}{2^3} \times (3)^3 = 2^3 \times 3^3 = (2 \times 3)^3 = 6^3 = \frac{1}{6^3}$

(iv)  $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4 = (-1 \times 3)^4 \times \frac{5^4}{3^4} = (-1)^4 \times 3^4 \times \frac{5^4}{3^4}$   
 $= (-1)^4 \times 5^4 = 5^4$   $[(-1)^4 = 1]$

**ઉદાહરણ 5 :** જો  $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$  હોય તો  $m$  શોધો.

**ઉકેલ :**  $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$

$\therefore (-3)^{m+1+5} = (-3)^7$

$\therefore (-3)^{m+6} = (-3)^7$

બંને તરફના ઘાત સ્વરૂપનો આધાર સમાન છે. જે 1 અને -1થી ભિન્ન છે. તેથી તેમના ઘાતાંક પણ સમાન થાય.

માટે,  $m + 6 = 7$   
 $m = 7 - 6 = 1$

જો  $n = 0$  હોય તો જ  $a^n = 1$  થાય. જે  $a$ ની કોઈપણ કિંમત માટે સત્ય છે,  $a = 1$  માટે,  $1^1 = 1^2 = 1^3 = 1^2 \dots = 1$  અથવા અનંત સંખ્યા  $n$  માટે  $(1)^n = 1$ .  
 $a = -1$  માટે  $(-1)^0 = (-1)^2 = (-1)^4 = (-1)^2 \dots = 1$  અથવા કોઈપણ યુગ્મ સંખ્યા  $p$  માટે  $(-1)^p = 1$ .

**ઉદાહરણ 6 :**  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$  ની કિંમત શોધો.

**ઉકેલ :**  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}} = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$

**ઉદાહરણ 7 :** સાદું રૂપ આપો. (i)  $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right\} \div \left[\frac{1}{4}\right]^{-2}$

(ii)  $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-5}$

**ઉકેલ :**

(i)  $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right\} \div \left[\frac{1}{4}\right]^{-2} = \left\{\frac{1^{-2}}{3^{-2}} - \frac{1^{-3}}{2^{-3}}\right\} \div \frac{1^{-2}}{4^{-2}}$   
 $= \left\{\frac{3^2}{1^2} - \frac{2^3}{1^3}\right\} \div \frac{4^2}{1^2}$   
 $= \{9 - 8\} \div 16 = \frac{1}{16}$

(ii)  $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-5} = \frac{5^{-7}}{8^{-7}} \times \frac{8^{-5}}{5^{-5}} = \frac{5^{-7}}{5^{-5}} \times \frac{8^{-5}}{8^{-7}} = 5^{(-7) - (-5)} \times 8^{(-5) - (-7)}$   
 $= 5^{-2} \times 8^2 = \frac{8^2}{5^2} = \frac{64}{25}$

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}} = \frac{3^2}{2^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$   
 સામાન્ય રીતે,  $\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$

## સ્વાધ્યાય 12.1

1. કિંમત શોધો.

(i)  $3^{-2}$

(ii)  $(-4)^{-2}$

(iii)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$

2. સાદું રૂપ આપો અને પરિણામને ધન ઘાતાંક સ્વરૂપે દર્શાવો.

(i)  $(-4)^5 \div (-4)^8$

(ii)  $\left(\frac{1}{2^3}\right)^2$

(iii)  $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4$

(iv)  $(3^{-7} \div 3^{-10}) \times 3^{-5}$

(v)  $2^{-3} \times (-7)^{-3}$

3. કિંમત શોધો.

(i)  $(3^0 + 4^{-1}) \times 2^2$

(ii)  $(2^{-1} \times 4^{-1}) \div 2^{-2}$

(iii)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

(iv)  $(3^{-1} + 4^{-1} + 5^{-1})^0$

(v)  $\left\{\left(\frac{-2}{3}\right)^{-2}\right\}^2$



4. કિંમત શોધો.

$$(i) \frac{8^{-1} \times 5^3}{2^{-4}}$$

$$(ii) (5^{-1} \times 2^{-1}) \times 6^{-1}$$

5. જો  $5^m \div 5^{-3} = 5^5$  હોય, તો  $m$  શોધો.

6. કિંમત શોધો.

$$(i) \left\{ \left( \frac{1}{3} \right)^{-1} - \left( \frac{1}{4} \right)^{-1} \right\}^{-1}$$

$$(ii) \left( \frac{5}{8} \right)^{-7} \times \left( \frac{8}{5} \right)^{-4}$$

7. સાદું રૂપ આપો.

$$(i) \frac{25 \times t^{-4}}{5^{-3} \times 10 \times t^{-8}} \quad (t \neq 0)$$

$$(ii) \frac{3^{-5} \times 10^{-5} \times 125}{5^{-7} \times 6^{-5}}$$

## 12.4 નાની સંખ્યાઓને પ્રમાણિત સ્વરૂપે દર્શાવવામાં ઘાતાંકનો ઉપયોગ

નીચેનાં તથ્યોનું અવલોકન કરો.

1. પૃથ્વીનું સૂર્યથી અંતર આશરે 150,000,000,000 મી. છે.
2. પ્રકાશની ઝડપ 300,000,000 મી/સે છે.
3. ધોરણ 7ના ગણિતના પાઠ્યપુસ્તકની જાડાઈ 20 મીમી છે.
4. રક્તકણોનો સરેરાશ વ્યાસ 0.000007 મી છે.
5. મનુષ્યના વાળની જાડાઈ 0.005 સેમીથી 0.01 સેમીની વચ્ચે હોય છે.
6. પૃથ્વીથી ચંદ્રનું અંતર આશરે 384,467,000 મી છે.
7. વનસ્પતિ કોષનું માપ 0.00001275 મી છે.
8. સૂર્યની સરેરાશ ત્રિજ્યા 695000 કિમી છે.
9. અંતરિક્ષ યાનમાં રહેલા ઘન રોકેટ બૂસ્ટરમાં બળતણનું દ્રવ્યમાન 503600 કિગ્રા છે.
10. કાગળના ટુકડાની જાડાઈ 0.0016 સેમી છે.
11. કમ્પ્યુટર ચિપના એક તારનો વ્યાસ 0.000003 સેમી છે.
12. માઉન્ટ એવરેસ્ટની ઊંચાઈ 8848 મી છે.

આપણે જોઈશું કે અહીં બહુ જ ઓછી સંખ્યાઓ છે જેને આપણે વાંચી શકીશું જેવી કે, 20 મીમી, 8848 મી, 6,95,000 કિમી. અહીં 150,000,000,000 મી જેવી બહુ જ મોટી સંખ્યાઓ છે તેમજ 0.000007 મી જેવી બહુ જ નાની સંખ્યાઓ છે. ઉપરોક્ત વિધાનોમાંથી આવી બહુ જ મોટી અને બહુ જ નાની સંખ્યાઓ શોધો અને આપેલ કોષ્ટકમાં લખો.

બહુ જ મોટી સંખ્યા	બહુ જ નાની સંખ્યા
150,000,000,000 મી	0.000007 મી
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

આગળના ધોરણમાં આપણે શીખ્યા છીએ કે બહુ જ મોટી સંખ્યાઓને તેમના પ્રમાણિત સ્વરૂપે કેવી રીતે દર્શાવી શકાય.

$$\text{દા.ત. } 150,000,000,000 = 1.5 \times 10^{11}$$

હવે, આપણે 0.000007 મી ને પ્રમાણિત સ્વરૂપે દર્શાવીએ.

$$0.000007 = \frac{7}{1000000} = \frac{7}{10^6} = 7 \times 10^{-6}$$

$$\therefore 0.000007 \text{ મી} = 7 \times 10^{-6} \text{ મી}$$

આ જ રીતે, એક કાગળના ટુકડાની જાડાઈ 0.0016 સેમી

$$\begin{aligned} \text{તેથી } 0.0016 &= \frac{16}{10000} \\ &= \frac{1.6 \times 10}{10^4} = 1.6 \times 10 \times 10^{-4} \\ &= 1.6 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

માટે કાગળની જાડાઈ  $1.6 \times 10^{-3}$  સેમી છે.

1500000000000  
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

. દશાંશચિહ્ન  
11 એકમ ડાબી  
બાજુ જશે

0.000007  
1 2 3 4 5 6

દશાંશચિહ્ન 6  
એકમ જમણી  
બાજુ જશે.

0.0016  
1 2 3

દશાંશચિહ્ન 3 સ્થાન  
જમણી બાજુ જશે.

### પ્રયત્ન કરો

1. નીચેની સંખ્યાઓને પ્રમાણિત સ્વરૂપે દર્શાવો.

(i) 0.000000564      (ii) 0.0000021      (iii) 21600000      (iv) 15240000

2. આગળ આપેલ તથ્યોમાં દર્શાવેલ સંખ્યાને તેના પ્રમાણિત સ્વરૂપે લખો.

### 12.4.1 બહુ જ મોટી તથા બહુ જ નાની સંખ્યાઓની સરખામણી

સૂર્યનો વ્યાસ  $1.4 \times 10^9$  મી અને પૃથ્વીનો વ્યાસ  $1.2756 \times 10^7$  મી છે. ધારો કે તમે પૃથ્વીના વ્યાસની તુલના સૂર્યના વ્યાસ સાથે કરવા માગો છો.

$$\text{સૂર્યનો વ્યાસ} = 1.4 \times 10^9 \text{ મી}$$

$$\text{પૃથ્વીનો વ્યાસ} = 1.2756 \times 10^7 \text{ મી}$$

$$\text{માટે, } \frac{1.4 \times 10^9}{1.2756 \times 10^7} = \frac{1.4 \times 10^{9-7}}{1.2756} = \frac{1.4 \times 100}{1.2756} \text{ જે લગભગ } 100 \text{ થશે.}$$

તેથી, સૂર્યનો વ્યાસ પૃથ્વીના વ્યાસ કરતાં 100 ગણો છે.

ચાલો, હવે 0.000007 મી માપ ધરાવતાં રક્તકણોની તુલના 0.00001275 મી માપ ધરાવતાં વનસ્પતિકોષ સાથે કરીએ.

$$\text{રક્તકણનું માપ} = 0.000007 \text{ મી} = 7 \times 10^{-6} \text{ મી}$$

$$\text{વનસ્પતિકોષનું માપ} = 0.00001275 \text{ મી} = 1.275 \times 10^{-5} \text{ મી}$$

$$\text{માટે, } \frac{7 \times 10^{-6}}{1.275 \times 10^{-5}} = \frac{7 \times 10^{-6-(-5)}}{1.275} = \frac{7 \times 10^{-1}}{1.275} = \frac{0.7}{1.275} = \frac{0.7}{1.3} = \frac{1}{2} \text{ (આશરે)}$$

તેથી, રક્તકણનું કદ વનસ્પતિકોષના કદ કરતાં અડધું છે.

પૃથ્વીનું દ્રવ્યમાન  $5.97 \times 10^{24}$  કિગ્રા અને ચંદ્રનું દ્રવ્યમાન  $7.35 \times 10^{22}$  કિગ્રા છે, તો કુલ દ્રવ્યમાન કેટલું હશે ?

$$\begin{aligned} \text{કુલ દ્રવ્યમાન} &= 5.97 \times 10^{24} \text{ કિગ્રા} + 7.35 \times 10^{22} \text{ કિગ્રા} \\ &= 5.97 \times 100 \times 10^{22} + 7.35 \times 10^{22} \\ &= 597 \times 10^{22} + 7.35 \times 10^{22} \\ &= (597 + 7.35) \times 10^{22} \\ &= 604.35 \times 10^{22} \text{ કિગ્રા} \end{aligned}$$

પ્રમાણિત સ્વરૂપે રહેલી સંખ્યાઓનો સરવાળો કરતી વખતે, સૌપ્રથમ તેમને સમાન ઘાતાંકવાળી સંખ્યામાં ફેરવીશું.

સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર  $1.496 \times 10^{11}$  મી તથા પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર  $3.84 \times 10^8$  મી છે. સૂર્યગ્રહણ વખતે ચંદ્ર પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે આવે છે. આ સમયે ચંદ્રનું સૂર્યથી અંતર કેટલું હશે ?

$$\text{સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર} = 1.496 \times 10^{11} \text{ મી}$$

$$\text{પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર} = 3.84 \times 10^8 \text{ મી}$$

$$\text{સૂર્ય અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર} = 1.496 \times 10^{11} - 3.84 \times 10^8$$

$$= 1.496 \times 1000 \times 10^8 - 3.84 \times 10^8$$

$$= (1,496 - 3.84) \times 10^8 \text{ મી} = 1492.16 \times 10^8 \text{ મી}$$

**ઉદાહરણ 8 :** નીચેની સંખ્યાઓને પ્રમાણિત સ્વરૂપે દર્શાવો.

(i) 0.000035

(ii) 4050000

**ઉકેલ :**

(i)  $0.000035 = 3.5 \times 10^{-5}$  (ii)  $4050000 = 4.05 \times 10^6$

**ઉદાહરણ 9 :** નીચેની સંખ્યાઓને સામાન્ય સ્વરૂપે લખો.

(i)  $3.52 \times 10^5$

(ii)  $7.54 \times 10^{-4}$

(iii)  $3 \times 10^{-5}$

**ઉકેલ :**

(i)  $3.52 \times 10^5 = 3.52 \times 100000 = 352000$

(ii)  $7.54 \times 10^{-4} = \frac{7.54}{10^4} = \frac{7.54}{10000} = 0.000754$

(iii)  $3 \times 10^{-5} = \frac{3}{10^5} = \frac{3}{100000} = 0.00003$

ફરીથી આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપે આપેલી સંખ્યાઓને સમાન ઘાતાંક વાળી સંખ્યામાં બદલવી પડશે.

## સ્વાધ્યાય 12.2



1. નીચેની સંખ્યાઓને તેમનાં પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવો.

(i) 0.000000000000085

(ii) 0.000000000000942

(iii) 6020000000000000

(iv) 0.00000000837

(v) 31860000000

2. નીચેની સંખ્યાઓને તેમનાં સામાન્ય સ્વરૂપે લખો.

(i)  $3.02 \times 10^{-6}$

(ii)  $4.5 \times 10^4$

(iii)  $3 \times 10^{-8}$

(iv)  $1.0001 \times 10^9$

(v)  $5.8 \times 10^{12}$

(vi)  $3.61492 \times 10^6$

3. નીચે આપેલાં વિધાનોમાં દર્શાવેલ સંખ્યાને તેમનાં પ્રમાણિત સ્વરૂપે લખો.

(i) 1 માર્કોન બરાબર  $\frac{1}{1000000}$  મી થાય.

(ii) એક ઈલેક્ટ્રોનનો વીજભાર 0.000,000,000,000,000,000,16 કુલંબ છે.

(iii) બેક્ટેરિયાનું માપ 0.0000005 મી છે.

(iv) વનસ્પતિકોષનું માપ 0.00001275 મી છે.

(v) એક જાડા કાગળની જાડાઈ 0.07 મિમી છે.

4. એક થપ્પીમાં 20 મિમી જાડાઈ હોય તેવી 5 ચોપડી અને 0.016 મિમી જાડાઈના 5 કાગળ ગોઠવેલા છે, તો થપ્પીની કુલ ઊંચાઈ શોધો.

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. ઋણ ઘાતાંક ધરાવતી સંખ્યાઓને પણ નીચેના નિયમો લાગુ પડે છે.

(a)  $a^m \times a^n = a^{m+n}$

(b)  $a^m \div a^n = a^{m-n}$

(c)  $(a^m)^n = a^{mn}$

(d)  $a^m \times b^m = (ab)^m$

(e)  $a^0 = 1$

(f)  $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$

2. બહુ જ નાની સંખ્યાઓને ઋણ ઘાતાંકનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાણિત સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે.





## સમપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ

પ્રકરણ

13

### 13.1 પ્રાસ્તાવિક

મોહન પોતાના માટે અને પોતાની બહેન માટે ચા બનાવે છે. આ માટે તે 300 મિલી પાણી, 2 ચમચી ખાંડ, 1 ચમચી ચાની ભૂકી અને 50 મિલી દૂધનો ઉપયોગ કરે છે. હવે જો તેને પાંચ વ્યક્તિઓ માટે ચા બનાવવી હોય તો, ઉપરોક્ત વસ્તુઓનો કેટલો જથ્થો જોઈશે ?

જો બે વિદ્યાર્થીઓને કોઈ એક સભામાં ખુરશીઓ ગોઠવવામાં 20 મિનિટનો સમય લાગે તો આ જ કામ પાંચ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા સમયમાં કરી શકે ?

દૈનિક જીવનમાં આપણે આવી ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરતાં હોઈએ છીએ જેમાં, આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ એક રાશિમાં થતાં પરિવર્તનને કારણે અન્ય રાશિમાં પણ પરિવર્તન આવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે,

(i) જો ખરીદેલી વસ્તુની સંખ્યામાં વધારો થાય તો તેની કુલ ખરીદ કિંમતમાં પણ વધારો થાય છે.

(ii) બેંકમાં વધારે રકમ જમા કરાવીએ તો વધારે વ્યાજ મેળવી શકાય.

(iii) જો વાહનની ઝડપમાં વધારો થાય તો અંતર કાપવા માટે લાગતાં સમયમાં ઘટાડો થાય છે.

(iv) કોઈ એક કાર્ય માટે, કારીગરની સંખ્યા વધે તો કાર્ય પૂરું કરવા લાગતો સમય ઘટે.

ધ્યાન રાખો, અહીં એક રાશિમાં થતાં પરિવર્તનને કારણે બીજી રાશિમાં પરિવર્તન થાય છે.

આવી બીજી પાંચ પરિસ્થિતિઓ લખો કે જેમાં એક રાશિમાં થતાં પરિવર્તનને કારણે અન્ય રાશિમાં પણ પરિવર્તન આવે છે.

મોહનને જોઈતી વસ્તુઓનો જથ્થો આપણે કેવી રીતે શોધીશું ? અથવા પાંચ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કાર્યને પૂરું કરવા માટે લાગતાં સમયને કેવી રીતે શોધીશું ?

આ પ્રકારના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે આપણે ચલન (variation)ના મહત્વના મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરીશું.

### 13.2 સમપ્રમાણ

જો 1 કિગ્રા ખાંડની કિંમત ₹ 36 હોય,

તો 3 કિગ્રા ખાંડની કિંમત કેટલી હશે ?

તે ₹ 108 થાય.



આ જ પ્રકારે, આપણે 5 કિગ્રા તથા 8 કિગ્રા ખાંડની કિંમત શોધી શકીશું. નીચેના કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો.

		$\times 3$	$\times 5$	$\times 6$	$\times 8$	$\times 10$
ખાંડનું વજન (કિગ્રામાં)	1	3	5	6	8	10
કિંમત (રૂપિયામાં)	36	108	180	...	...	...
		$\times 3$	$\times 5$	$\times 6$	$\times 8$	$\times 10$

ધ્યાન આપો, અહીં ખાંડના જથ્થામાં વધારો થતાં તેની કિંમતમાં પણ એવી રીતે વધારો થાય છે કે જેથી તેનો ગુણોત્તર અચળ રહે.

બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે એક કાર 60 કિમી અંતર કાપવા માટે 4 લિટર પેટ્રોલ વાપરે છે તો 12 લિટર પેટ્રોલમાં તે કેટલું અંતર કાપશે ? જવાબ 180 કિમી આવશે. આ અંતર કેવી રીતે શોધીશું ?

અહીં આપેલ પરિસ્થિતિમાં 12 લિટર પેટ્રોલ એટલે કે 4 લિટરનું ત્રણ ગણું પેટ્રોલ વપરાય છે. તેથી કાપેલું અંતર પણ 60 કિમીનું ત્રણ ગણું થશે. એટલે કે પેટ્રોલનો વપરાશ ત્રણ ગણો વધારે થાય તો કાપેલું અંતર પણ અગાઉના અંતર કરતાં ત્રણ ગણું થશે. હવે, ધારો કે પેટ્રોલનો વપરાશ  $x$  લિટર અને તેને અનુરૂપ કાપેલું અંતર  $y$  કિમી છે. હવે, નીચેનું કોષ્ટક પૂર્ણ કરો.



પેટ્રોલ લિટરમાં ( $x$ )	4	8	12	15	20	25
અંતર કિમીમાં ( $y$ )	60	...	180	...	...	...

અહીં આપણે જોઈશું કે  $x$ ના મૂલ્યમાં વધારો થાય છે ત્યારે  $y$ ના મૂલ્યમાં પણ એવી રીતે વધારો થાય છે કે જેથી ગુણોત્તર  $\frac{x}{y}$ માં કોઈ ફેરફાર ન થાય. એટલે કે તે અચળ રહે. (ધારો કે  $k$ ) આ

સ્થિતિમાં અચળાંક  $\frac{1}{15}$  છે.

(જાતે ચકાસો !)

આમ, આપણે કહી શકીએ કે જો  $\frac{x}{y} = k$  અથવા  $x = ky$  હોય તો  $x$  એ  $y$  ના સમપ્રમાણમાં છે.

આ ઉદાહરણમાં,  $\frac{4}{60} = \frac{12}{180}$  છે, જ્યાં 4 અને 12 વપરાયેલા પેટ્રોલનો જથ્થો ( $x$ ) લિટરમાં છે તથા 60 અને 180 એ કપાયેલ અંતર ( $y$ ) કિમીમાં છે. આમ, જો  $x$  અને  $y$  સમપ્રમાણમાં હોય, તો આપણે  $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$  લખી શકીએ. (જ્યાં  $x$ નાં મૂલ્યો  $x_1$  અને  $x_2$  ને અનુરૂપ  $y$ નાં મૂલ્યો અનુક્રમે  $y_1$  અને  $y_2$  છે.)

પેટ્રોલનો વપરાશ અને કાર દ્વારા કપાયેલ અંતર એક સમપ્રમાણની સ્થિતિ બતાવે છે. આ જ પ્રમાણે કુલ ખર્ચેલ રકમ અને ખરીદેલ વસ્તુઓની સંખ્યા પણ સમપ્રમાણનું એક ઉદાહરણ છે.

સમપ્રમાણનાં થોડાંક વધારે ઉદાહરણો વિશે વિચારો. શરૂઆતના ઉદાહરણમાં પાંચ વ્યક્તિઓ માટે ચા બનાવવા માટે મોહન 750 મિલી પાણી, 5 ચમચી ખાંડ,  $2\frac{1}{2}$  ચમચી ચાની ભૂકી અને 125 મિલી દૂધનો ઉપયોગ કરશે. ચાલો સમપ્રમાણના આ મુદ્દાને નીચેની પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

### આટલું કરો



- (i) ● એક ઘડિયાળ લો અને તેના મિનિટ કાંટાને 12 પર ગોઠવો.  
● મિનિટ કાંટાએ તેની પ્રારંભિક સ્થિતિ સાથે બનાવેલ ખૂણા તથા વીતેલા સમયને નીચેના કોષ્ટક સ્વરૂપે દર્શાવો.

વિતેલો સમય મિનિટમાં (T)	(T <sub>1</sub> ) 15	(T <sub>2</sub> ) 30	(T <sub>3</sub> ) 45	(T <sub>4</sub> ) 60
બનાવેલ ખૂણો (રિઝીમાં) (A)	(A <sub>1</sub> ) 90°	(A <sub>2</sub> ) ...	(A <sub>3</sub> ) ...	(A <sub>4</sub> ) ...
$\frac{T}{A}$	...	...	...	...

તમને T અને Aના અવલોકન દ્વારા શું જાણવા મળ્યું ? શું બંનેમાં એક સાથે વધારો થાય

છે ? શું  $\frac{T}{A}$  દરેક વખતે સમાન હોય છે ?

શું મિનિટ કાંટાએ બનાવેલ ખૂણો વિતેલા સમયના સમપ્રમાણમાં છે ?

હા. ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં તમે જોઈ શકો છો કે,

$$T_1 : T_2 = A_1 : A_2 \text{ કારણ કે}$$


$$T_1 : T_2 = 15 : 30 = 1 : 2$$

$$A_1 : A_2 = 90 : 180 = 1 : 2$$

ચકાસો  $T_2 : T_3 = A_2 : A_3$  અને  $T_3 : T_4 = A_3 : A_4$  થાય છે ?

હવે તમે પોતાની રીતે સમયગાળો નક્કી કરી અને ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિ ફરીથી કરી શકો છો.

- (ii) તમારા મિત્રને નીચેનું કોષ્ટક ભરવાનું કહો તથા તેની ઉંમરને અનુરૂપ તેની માતાની ઉંમરનો ગુણોત્તર શોધવાનું પણ કહો.



	પાંચ વર્ષ પહેલાની ઉંમર	હાલની ઉંમર	પાંચ વર્ષ પછીની ઉંમર
મિત્રની ઉંમર (F)			
માતાની ઉંમર (M)			
$\frac{F}{M}$			

તમે શું અવલોકન કર્યું ? શું F અને Mમાં એકસાથે વધારો (અથવા ઘટાડો) થાય છે ?

શું  $\frac{F}{M}$  નું મૂલ્ય દરેક વખતે સમાન છે ? ના. આ પ્રવૃત્તિને તમે તમારા અન્ય મિત્રો સાથે ફરીથી કરો અને અવલોકનો નોંધો.

આમ, એક સાથે વધતાં (અથવા ઘટતા) ચલ હંમેશા સમપ્રમાણમાં જ હોય તે જરૂરી નથી. ઉદાહરણ તરીકે :

- (i) સમયની સાથે મનુષ્યમાં શારીરિક ફેરફારો થાય છે પરંતુ તે જરૂરી નથી કે તે પૂર્વનિર્ધારિત ગુણોત્તરમાં જ હોય.
- (ii) મનુષ્યના વજન અને ઊંચાઈમાં થતાં ફેરફારો કોઈ નિશ્ચિત પ્રમાણમાં નથી હોતા.
- (iii) કોઈ વૃક્ષની ઊંચાઈ અને તેની ડાળીઓ પર રહેલા પાનાની સંખ્યા વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ નથી આવાં બીજાં ઉદાહરણો વિશે વિચારો.



### પ્રયત્ન કરો

1. નીચેનાં કોષ્ટકનું અવલોકન કરો અને જણાવો કે  $x$  અને  $y$  સમપ્રમાણમાં છે કે નહીં.

(i)	$x$	20	17	14	11	8	5	2
	$y$	40	34	28	22	16	10	4

(ii)	$x$	6	10	14	18	22	26	30
	$y$	4	8	12	16	20	24	28

(iii)	$x$	5	8	12	15	18	20
	$y$	15	24	36	60	72	100

2. મુદ્દલ = ₹ 1000, વ્યાજનો દર = વાર્ષિક 8% માટે નીચે દર્શાવેલ કોષ્ટક પૂર્ણ કરો અને ચકાસો કે આ પ્રકારનું વ્યાજ (સાદું અથવા ચક્રવૃદ્ધિ) આપેલ સમયના સમપ્રમાણમાં છે.

$$\frac{P \times r \times t}{100}$$

$$P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t - P$$

આપેલ સમયગાળો	1 વર્ષ	2 વર્ષ	3 વર્ષ
સાદું વ્યાજ (રૂમાં)			
ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ (રૂમાં)			

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો



જો આપણે સમયગાળો તથા વ્યાજનો દર નિશ્ચિત રાખીએ તો સાદું વ્યાજ તેના મુદ્દલના સમપ્રમાણમાં હોય છે, શું આ જ સંબંધ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ માટે પણ સત્ય છે ? કેમ ?

ચાલો, હવે થોડાંક એવાં ઉદાહરણોના ઉકેલ મેળવીએ જેમાં સમપ્રમાણના મુદ્દાનો ઉપયોગ થતો હોય.

**ઉદાહરણ 1 :** એક વિશેષ પ્રકારના 5 મીટર કાપડની કિંમત ₹ 210 છે. તો આ પ્રકારના 2, 4, 10 અને 13 મીટર કાપડની કિંમત માટે કોષ્ટક બનાવો.

**ઉકેલ :** ધારો કે કાપડની લંબાઈ  $x$  મીટર છે અને તેની કિંમત ₹  $y$  છે.

$x$	2	4	5	10	13
$y$	$y_2$	$y_3$	210	$y_4$	$y_5$



હવે જેમ કાપડની લંબાઈમાં વધારો થાય તેમ કાપડની કિંમત પણ તે જ ગુણોત્તરમાં વધે છે. આ એક સમપ્રમાણની સ્થિતિ છે.

આપણે અહીં  $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$  પ્રકારના સંબંધનો ઉપયોગ કરીએ.

(i) અહીં  $x_1 = 5$ ,  $y_1 = 210$  અને  $x_2 = 2$

માટે  $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$  એટલે  $\frac{5}{210} = \frac{2}{y_2}$  અથવા  $5y_2 = 2 \times 210$ ,  $\therefore y_2 = \frac{2 \times 210}{5} = 84$

(ii) જો  $x_3 = 4$  હોય તો  $\frac{5}{210} = \frac{4}{y_3}$ ,  $\therefore 5y_3 = 4 \times 210$ ,  $\therefore y_3 = \frac{4 \times 210}{5} = 168$

[અહીં  $\frac{x_2}{y_2} = \frac{x_3}{y_3}$  નો ઉપયોગ કરી શકાય ? પ્રયત્ન કરો.]

(iii) જો  $x_4 = 10$  હોય તો  $\frac{5}{210} = \frac{10}{y_4}$ ,  $\therefore y_4 = \frac{10 \times 210}{5} = 420$

(iv) જો  $x_5 = 13$  હોય તો  $\frac{5}{210} = \frac{13}{y_5}$ ,  $\therefore y_5 = \frac{13 \times 210}{5} = 546$

[ધ્યાન આપો, અહીં આપણે  $\frac{5}{210}$  ની જગ્યાએ  $\frac{2}{84}$  અથવા  $\frac{4}{168}$  અથવા  $\frac{10}{420}$  નો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ.]

**ઉદાહરણ 2 :** 14 મીટર ઊંચાઈ ધરાવતા વિજળીના એક થાંભલાના પડછાયાની લંબાઈ 10 મીટર છે. આ જ પરિસ્થિતિમાં એક વૃક્ષના પડછાયાની લંબાઈ 15 મીટર હોય, તો વૃક્ષની ઊંચાઈ શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે વૃક્ષની ઊંચાઈ  $x$  મીટર છે. હવે નીચે પ્રમાણે કોષ્ટક બનાવતાં,

પદાર્થની ઊંચાઈ (મીટરમાં)	14	$x$
પડછાયાની લંબાઈ (મીટરમાં)	10	15

ધ્યાન આપો, પદાર્થની ઊંચાઈ જેટલી વધારે, તેટલી જ તેના પડછાયાની લંબાઈ વધારે હશે. આથી આ

એક સમપ્રમાણની સ્થિતિ છે. અર્થાત્  $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$  લેતાં,

આપણને  $\frac{14}{10} = \frac{x}{15}$  મળે. (કેમ ?)

$\therefore \frac{14}{10} \times 15 = x$

$\therefore \frac{14 \times 3}{2} = x$

તેથી  $21 = x$

આમ, વૃક્ષની ઊંચાઈ 21 મીટર છે.


આપણે  $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$  ને  $\frac{y_1}{x_2} = \frac{y_2}{x_1}$  તરીકે પણ દર્શાવી શકીએ.

એટલે કે,  $x_1 : x_2 = y_1 : y_2$

$\therefore 14 : x = 10 : 15$

માટે  $10 \times x = 15 \times 14$

$\therefore x = \frac{15 \times 14}{10} = 21$





**ઉદાહરણ 3 :** જો 12 જાડા કાગળનું વજન 40 ગ્રામ હોય, તો આ જ પ્રકારના કેટલા કાગળનું વજન  $2\frac{1}{2}$  કિલોગ્રામ થાય ?

**ઉકેલ :** ધારો કે  $x$  સંખ્યાના કાગળનું વજન  $2\frac{1}{2}$  કિગ્રા થાય છે. ઉપરોક્ત માહિતીને કોષ્ટક સ્વરૂપે દર્શાવતાં,

કાગળની સંખ્યા	12	$x$
કાગળનું વજન (ગ્રામમાં)	40	2500

કાગળની સંખ્યા વધારે હશે તો તેનું વજન પણ વધશે. તેથી કાગળની સંખ્યા તેના વજનના સમપ્રમાણમાં છે.


1 કિલોગ્રામ = 1000 ગ્રામ  
 $2\frac{1}{2}$  કિલોગ્રામ = 2500 ગ્રામ

$$\text{તેથી, } \frac{12}{40} = \frac{x}{2500}$$

$$\therefore \frac{12 \times 2500}{40} = x$$

$$\therefore 750 = x$$

આમ, માંગેલ કાગળની સંખ્યા = 750



**બીજી રીત :** બે રાશિઓ  $x$  અને  $y$  એકબીજાના સમપ્રમાણમાં રહેલ છે. તેથી  $x = ky$  અથવા  $\frac{x}{y} = k$

$$\text{અહીં, } k = \frac{\text{કાગળની સંખ્યા}}{\text{કાગળનું ગ્રામમાં વજન}} = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$$

હવે જો  $x$  સંખ્યાના કાગળનું વજન  $2\frac{1}{2}$  કિગ્રા (2500 ગ્રામ) હોય તો,

$$x = ky \text{નો ઉપયોગ કરતાં, } x = \frac{3}{10} \times 2500 = 750$$

આમ, 750 કાગળનું વજન  $2\frac{1}{2}$  કિગ્રા હશે.

**ઉદાહરણ 4 :** એક રેલગાડી, 75 કિમી/કલાકની અચળ ઝડપે ગતિ કરે છે. તો,

(i) 20 મિનિટમાં કેટલું અંતર કાપશે ?

(ii) 250 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે રેલગાડીએ 20 મિનિટમાં કાપેલ અંતર  $x$  કિમી છે અને 250 કિમી માટે લાગતો સમય (મિનિટમાં)  $y$  છે.

1 કલાક = 60 મિનિટ

કાપેલ અંતર (કિમીમાં)	75	$x$	250
સમય (મિનિટમાં)	60	20	$y$

અહીં ઝડપ અચળ છે, તેથી કાપેલું અંતર સમયના સમપ્રમાણમાં હશે.

$$(i) \text{ અહીં, } \frac{75}{60} = \frac{x}{20}$$

$$\therefore \frac{75 \times 20}{60} = x$$

$$\therefore x = 25$$


તેથી, રેલગાડી 20 મિનિટમાં 25 કિમીનું અંતર કાપશે.

$$(ii) \text{ અને } \frac{75}{60} = \frac{250}{y}$$

$$\therefore y = \frac{250 \times 60}{75} = 200 \text{ મિનિટ અથવા 3 કલાક અને 20 મિનિટ}$$

આમ, 250 કિમી અંતર કાપતાં લાગતો સમય 3 કલાક અને 20 મિનિટ છે. વૈકલ્પિક રીતે, જો

તમે  $x$  જાણતા હોય તો  $\frac{x}{20} = \frac{250}{y}$  પરથી તમે  $y$ ને શોધી શકો છો.



તમે જાણો છો કે ભૌગોલિક નકશો એક મોટા પ્રદેશનું લઘુ સ્વરૂપ છે. નકશાના નીચેના ભાગમાં પ્રમાણમાપ (સ્કેલ) આપેલ હોય છે. આ પ્રમાણમાપ વાસ્તવિક લંબાઈ અને નકશામાં દર્શાવેલ લંબાઈ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. આમ, પ્રમાણમાપ નકશાના બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર અને વાસ્તવિક અંતર વચ્ચેનો ગુણોત્તર છે.

ઉદાહરણ તરીકે, નકશા પરનું 1 સેમી અંતર વાસ્તવિક અંતર 8 કિમી દર્શાવતું હોય (એટલે કે પ્રમાણમાપ 1 સેમી : 8 કિમી અથવા 1 : 8,00,000) તો નકશા પરનું 2 સેમીનું માપ 16 કિમી દર્શાવશે. આથી આપણે કહી શકીએ કે નકશા પર દર્શાવેલ પ્રમાણમાપ, સમપ્રમાણતાને આધારિત છે.

**ઉદાહરણ 5 :** નકશામાં પ્રદર્શિત પ્રમાણમાપ 1 : 30000000 છે. નકશામાં બે શહેર વચ્ચેનું અંતર 4 સેમી હોય, તો વાસ્તવિક અંતર શોધો.

**ઉકેલ :** ધારો કે નકશા પરનું અંતર  $x$  સેમી

અને વાસ્તવિક અંતર  $y$  સેમી છે.

$$\text{માટે} \quad 1 : 30000000 = x : y$$

$$\therefore \frac{1}{3 \times 10^7} = \frac{x}{y}$$

$$\text{પરંતુ } x = 4 \text{ છે. તેથી, } \frac{1}{3 \times 10^7} = \frac{4}{y}$$

$$\therefore y = 4 \times 3 \times 10^7 = 12 \times 10^7 \text{ સેમી} = 1200 \text{ કિમી}$$

આમ, નકશામાં 4 સેમીના અંતરે આવેલા બે શહેર વાસ્તવિક રૂપે એકબીજાથી 1200 કિમીના અંતરે આવેલ છે.




### આટલું કરો

તમારા રાજ્યનો ભૌગોલિક નકશો લો. તેમાં આપેલ પ્રમાણમાપની નોંધ કરો. હવે ફૂટપટ્ટીની મદદથી નકશામાં દર્શાવેલ બે શહેર વચ્ચેનું અંતર માપો. હવે તેમનું વાસ્તવિક અંતર શોધો.



## સ્વાધ્યાય 13.1

1. એક રેલવે સ્ટેશન પર કાર પાર્કિંગનો દર નીચે પ્રમાણે છે :




4 કલાક	₹ 60
8 કલાક	₹ 100
12 કલાક	₹ 140
24 કલાક	₹ 180

ઉપરોક્ત પાર્કિંગના દર તેમને અનુરૂપ સમય સાથે સમપ્રમાણમાં છે કે નહીં તે ચકાસો.

2. એક રંગના મૂળ મિશ્રણના 8 ભાગમાં, 1 ભાગ લાલ રંગ મેળવીને મિશ્રણ તૈયાર કરેલ છે. નીચેના કોષ્ટકમાં મૂળ મિશ્રણનો ભાગ શોધો.

લાલ રંગ	1	4	7	12	20
મૂળ મિશ્રણ	8	-	-	-	-

3. પ્રશ્ન 2માં, જો લાલ રંગના પદાર્થના 1 ભાગ માટે 75 મિલી મૂળ મિશ્રણ જોઈએ તો 1800 મિલી મૂળ મિશ્રણમાં કેટલા ભાગનો લાલ રંગનો પદાર્થ જોઈશે ?
4. ઠંડાં પીણાં બનાવતી એક ફેક્ટરીમાં, એક યંત્ર 6 કલાકમાં 840 બોટલ ભરે છે, તો આ યંત્ર 5 કલાકમાં કેટલી બોટલ ભરશે ?
5. એક જીવાણુ(bacteria)ના ચિત્રને 50,000 ગણું મોટું કરતાં તેની લંબાઈ 5 સેમી થાય છે. જે આકૃતિમાં બતાવેલ છે. તો આ જીવાણુની વાસ્તવિક લંબાઈ કેટલી હશે ? હવે જો ચિત્રને 20,000 ગણું કરવામાં આવે તો તેની લંબાઈ શોધો.
6. એક વહાણની પ્રતિકૃતિમાં તેના કૂવાથંભની ઊંચાઈ 9 સેમી છે અને વાસ્તવિક વહાણમાં તેની ઊંચાઈ 12 મીટર છે. હવે જો વહાણની લંબાઈ 28 મીટર હોય, તો તેની પ્રતિકૃતિની લંબાઈ શોધો.
7. જો 2 કિગ્રા ખાંડમાં રહેલા સ્ફટિકોની સંખ્યા  $9 \times 10^6$  છે, તો નીચે દર્શાવેલ જથ્થામાં કેટલા સ્ફટિકો હશે ? (i) 5 કિગ્રા(ii) 1.2 કિગ્રા
8. રશ્મિ પાસે, 1 સેમી બરાબર 18 કિમી પ્રમાણમાપ ધરાવતો એક સડક માર્ગનો નકશો છે. હવે જો તે આ સડક પર 72 કિમીનું અંતર કાપે છે, તો તેના દ્વારા કાપેલ અંતર નકશામાં કેટલું દર્શાવ્યું હોય ?
9. એક 5 મીટર અને 60 સેમી ઊંચા શિરોલંબ થાંભલાના પડછાયાની લંબાઈ 3 મીટર 20 સેમી છે. આ જ સમયે (i) 10 મીટર 50 સેમી ઊંચા થાંભલાના પડછાયાની લંબાઈ શોધો. (ii) 5 મીટર લંબાઈનો પડછાયો હોય તેવા થાંભલાની ઊંચાઈ શોધો.
10. એક ભારવાહક ખટારો 25 મિનિટમાં 14 કિમી અંતર કાપે છે. આ જ ઝડપે ગતિ કરે તો 5 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે ?



## આટલું કરો

1. એક ચોરસ પેપર ઉપર અલગ-અલગ લંબાઈના પાંચ ચોરસ દોરો. નીચેની માહિતી કોષ્ટકમાં લખો :



	ચોરસ-1	ચોરસ-2	ચોરસ-3	ચોરસ-4	ચોરસ-5
બાજુની લંબાઈ (L)					
પરિમિતિ (P)					
$\frac{L}{P}$					

ક્ષેત્રફળ (A)					
$\frac{L}{A}$					

શોધવાનો પ્રયત્ન કરો કે, તેની બાજુની લંબાઈ

(a) ચોરસની પરિમિતિના સમપ્રમાણમાં છે.

(b) ચોરસના ક્ષેત્રફળના સમપ્રમાણમાં છે.


2. પાંચ વ્યક્તિઓ માટે શીરો બનાવવા નીચેની સામગ્રીની જરૂરિયાત છે.

સોજી/રવો = 250 ગ્રામ, ખાંડ = 300 ગ્રામ,

ઘી = 200 ગ્રામ, પાણી = 500 મિલી.

સમપ્રમાણના પરિણામનો ઉપયોગ કરીને તમારા વર્ગનાં બધાં જ બાળકો માટે શીરો બનાવવા કેટલી સામગ્રી જોઈશે તે શોધો.

3. કોઈ એક પ્રમાણમાપ નક્કી કરીને તમારા વર્ગખંડનો એક નકશો બનાવો જેમાં બારી, બારણાં, કાળું પાટિયું વગેરે દર્શાવેલ હોય. (ઉદાહરણ આપેલ છે.)



### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

અત્યાર સુધી ચર્ચામાં લીધેલ સમપ્રમાણના ઉદાહરણો પૈકી થોડાક ઉદાહરણો લો અને વિચારો કે આ ઉદાહરણનો ઉકેલ એકમ પદ્ધતિ દ્વારા મળી શકે ?



### 13.3 વ્યસ્ત પ્રમાણ

બે રાશિઓ નીચે પ્રમાણે પણ પરિવર્તિત થઈ શકે છે. જેમ કે, એક રાશિમાં વધારો થાય તો તેને અનુરૂપ બીજી રાશિમાં ઘટાડો થાય અથવા તો એક રાશિમાં ઘટાડો થાય તો તેને અનુરૂપ બીજી રાશિમાં વધારો થાય. ઉદાહરણ તરીકે એક કામ પૂરું કરવા માટે કારીગરની સંખ્યામાં વધારો થાય તો કામ પૂરું કરવા માટે લાગતા સમયમાં ઘટાડો થાય છે. એ જ પ્રમાણે જો કોઈ નિયત અંતર કાપવા માટે, ઝડપમાં વધારો થાય તો, તેને અનુરૂપ સમયમાં ઘટાડો થાય છે. આ બાબત સમજવા માટે નીચે આપેલ સ્થિતિનો વિચાર કરીએ.



ઝાહિદા તેની શાળાએ ચાર અલગ-અલગ રીતે જઈ શકે છે : ચાલીને, દોડીને, સાયકલ ઉપર અથવા કારમાં. હવે નીચેના કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો.

	ચાલીને	દોડીને	સાયકલ દ્વારા	કાર દ્વારા
ઝડપ (કિમી/કલાકમાં)	3	6	9	45
સમય (મિનિટમાં)	30	15	10	2

Diagram showing relationships between speed and time for different modes of transport:

- From Speed to Time:  $\times 2$  (Walking to Running),  $\times 3$  (Walking to Bicycle),  $\times 15$  (Walking to Car).
- From Time to Speed:  $\times \frac{1}{2}$  (Running to Walking),  $\times \frac{1}{3}$  (Bicycle to Walking),  $\times \frac{1}{15}$  (Car to Walking).



ધ્યાન આપો, અહીં જેમ ઝડપમાં વધારો થાય છે, તેમ નિયત અંતર કાપતાં લાગતા સમયમાં ઘટાડો થાય છે. જ્યારે ઝાહિદા દોડીને પોતાની ઝડપ બમણી કરે છે

ત્યારે અંતર કાપતાં લાગતો સમય  $\frac{1}{2}$  ભાગનો થાય છે. હવે

જ્યારે તે સાયકલનો ઉપયોગ કરીને ઝડપ ત્રણ ગણી કરે છે

ત્યારે લાગતો સમય  $\frac{1}{3}$  ભાગનો થાય છે. આ જ પ્રમાણે ઝડપમાં

15 ગણો વધારો થતાં નિયત અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય

$\frac{1}{15}$  ગણો થાય છે. અર્થાત્, નિયત અંતર કાપવા માટે લાગતા

સમયમાં થતો ઘટાડો, ઝડપમાં થતાં વધારાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં

હોય છે. શું આપણે કહી શકીએ કે, ઝડપ અને સમય

એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં પરિવર્તિત થાય છે ?

ચાલો, એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. એક શાળા, ગણિતના પાઠ્યપુસ્તક માટે ₹ 6000 ખર્ચ કરવા માંગે છે. ₹ 40 પ્રતિ પુસ્તકના દરે કેટલાં પુસ્તક ખરીદી શકાય ? અહીં, સ્પષ્ટ છે કે 150 પુસ્તક ખરીદી શકાય. હવે જો પુસ્તકની કિંમત ₹ 40થી વધારે હોય તો આપેલ રકમમાં 150થી ઓછાં પુસ્તકોની ખરીદી શક્ય બનશે. નીચે આપેલ કોષ્ટક જુઓ :

એક પુસ્તકની કિંમત (₹ માં)	40	50	60	75	80	100
ખરીદી શકાય તેટલા પુસ્તકોની સંખ્યા	150	120	100	80	75	60

તમે શું અવલોકન કર્યું ? તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે એક પુસ્તકની કિંમતમાં વધારો થાય છે ત્યારે નિયત રકમમાં ખરીદી શકાય તેવાં પુસ્તકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે.

જ્યારે પુસ્તકની કિંમત ₹ 40થી વધીને ₹ 50 થાય છે ત્યારે તેની વૃદ્ધિમાં થતો ગુણોત્તર 4 : 5 છે અને તેમને અનુરૂપ પુસ્તકોની સંખ્યા 150થી ઘટીને 120 થાય છે. તેથી તેમનો ગુણોત્તર 5 : 4 થાય. અર્થાત્ આ બંને ગુણોત્તરો એકબીજાના વ્યસ્ત છે.

ધ્યાન આપો, બે રાશિઓને અનુરૂપ મૂલ્યોનો ગુણાકાર અચળ હોય છે.

અર્થાત્  $40 \times 150 = 50 \times 120 = 6000$ .

હવે જો આપણે એક પુસ્તકની કિંમત  $x$  અને ખરીદી શકાય તેવાં પુસ્તકોની સંખ્યાને  $y$  તરીકે દર્શાવીએ તો જ્યારે  $x$ માં વધારો થાય ત્યારે  $y$ માં ઘટાડો થશે અને તે જ પ્રમાણે  $x$ માં ઘટાડો થાય તો  $y$ માં વધારો થશે. અહીં બંનેનો ગુણાકાર  $xy$  અચળ રહે તે અગત્યનું છે. આમ આપણે કહી શકીએ કે  $x$  એ  $y$ ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ચલે છે અને  $y$  એ  $x$ ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ચલે છે. આમ, બે રાશિઓ  $x$  અને  $y$  એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ચલે છે તેમ કહેવાય, જો તેમની વચ્ચે  $xy = k$  પ્રકારનો કોઈ સંબંધ હોય, અહીં  $k$  અચળાંક છે.

હવે જો  $x$ નાં મૂલ્યો  $x_1$  અને  $x_2$  ને અનુરૂપ  $y$ નાં મૂલ્યો અનુક્રમે  $y_1$  અને  $y_2$  હોય તો

$$x_1 y_1 = x_2 y_2 (= k) \text{ અર્થાત } \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1} \text{ થાય.}$$

આમ,  $x$  અને  $y$  વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે.

આમ, ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં એક પુસ્તકની કિંમત અને નિયત રકમમાં ખરીદાયેલ પુસ્તકોની સંખ્યા એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તેવી જ રીતે વાહનની ઝડપ અને નિયત અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. આ પ્રકારનાં બીજાં અન્ય રાશિયુગ્મો વિશે વિચારો કે જેઓ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં પરિવર્તિત થતાં હોય. હવે તમે આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં આપેલ ખુરશીઓની ગોઠવણી વિશેની સમસ્યાનો વિચાર કરો.


વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આ મુદ્દાને નીચેની પ્રવૃત્તિ દ્વારા વધુ સારી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

બે પરસ્પર વ્યસ્ત સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 થાય. તેથી  $\frac{1}{2}$  એ 2 ની વ્યસ્ત સંખ્યા છે. તેમજ 2 એ  $\frac{1}{2}$  ની વ્યસ્ત સંખ્યા છે.  
(અહીં  $2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$ )




### આટલું કરો

એક ચોરસ કાગળ લો અને તેના પર 48 'કુકરી'ને અલગ-અલગ સંખ્યાની હરોળમાં દર્શાવ્યા મુજબ ગોઠવો.



4 હાર, 12 સ્તંભ



6 હાર, 8 સ્તંભ

હરોળની સંખ્યા (R)	(R <sub>1</sub> )	(R <sub>2</sub> )	(R <sub>3</sub> )	(R <sub>4</sub> )	(R <sub>5</sub> )
	2	3	4	6	8
સ્તંભની સંખ્યા (C)	(C <sub>1</sub> )	(C <sub>2</sub> )	(C <sub>3</sub> )	(C <sub>4</sub> )	(C <sub>5</sub> )
	...	...	12	8	...

શું તમે જોયું ? અહીં જ્યારે Rમાં વધારો થાય છે ત્યારે Cમાં ઘટાડો થાય છે.

- (i) શું  $R_1 : R_2 = C_2 : C_1$  છે ?                      (ii) શું  $R_3 : R_4 = C_4 : C_3$  છે ?  
 (iii) શું R અને C એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે ?

આ પ્રવૃત્તિ 36 'કુકરી' લઈને ફરીથી કરો.

### પ્રયત્ન કરો

નીચે દર્શાવેલ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરીને બતાવો કે કયા બે ચલ(અહીં x અને y)ની જોડ પરસ્પર વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે.

(i) 

x	50	40	30	20
y	5	6	7	8

(ii) 

x	100	200	300	400
y	60	30	20	15

(iii) 

x	90	60	45	30	20	5
y	10	15	20	25	30	35



હવે થોડાંક એવાં ઉદાહરણ જોઈએ જેમાં વ્યસ્ત પ્રમાણનો ઉપયોગ થતો હોય,

જ્યારે બે રાશિઓ x અને y સમપ્રમાણમાં (અથવા સમચલનમાં) હોય, તો તેને  $x \propto y$  લખી શકાય. જ્યારે બે રાશિઓ x અને y વ્યસ્ત પ્રમાણમાં (અથવા વ્યસ્ત ચલનમાં) હોય ત્યારે તેને  $x \propto \frac{1}{y}$  લખાય.

**ઉદાહરણ 7 :** એક ટાંકીને 1 કલાક અને 20 મિનિટમાં ભરવા માટે 6 પાઈપનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. હવે જો ફક્ત 5 પાઈપનો ઉપયોગ કરીએ તો ટાંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

**ઉકેલ :** ધારો કે ટાંકીને ભરવા માટે લાગતો સમય  $x$  મિનિટ છે.

તેથી આપેલ કોષ્ટક પ્રમાણે :

પાઈપની સંખ્યા	6	5
સમય (મિનિટમાં)	80	$x$

પાઈપની સંખ્યા જેટલી ઓછી, ટાંકી ભરાવામાં લાગતો સમય એટલો જ વધારે. અર્થાત્ આ વ્યસ્ત પ્રમાણની સ્થિતિ છે.

માટે,  $80 \times 6 = x \times 5$   $[x_1 y_1 = x_2 y_2]$

$$\therefore \frac{80 \times 6}{5} = x$$

$$\therefore x = 96$$

આમ, 5 પાઈપ વડે ટાંકીને ભરાતાં લાગતો સમય 96 મિનિટ એટલે કે 1 કલાક 36 મિનિટ થાય.

**ઉદાહરણ 8 :** એક છાત્રાલયમાં 100 વિદ્યાર્થીઓ છે. 20 દિવસ ચાલે તેટલી ભોજનસામગ્રી પડેલ છે. હવે જો 25 વિદ્યાર્થીઓ નવા આવે, તો ભોજનસામગ્રી કેટલા દિવસ ચાલશે ?

**ઉકેલ :** ધારો કે 125 વિદ્યાર્થીઓ હોય તો ભોજનસામગ્રી  $y$  દિવસ સુધી ચાલશે. આપની પાસે નીચે પ્રમાણેનું કોષ્ટક છે :

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	100	125
દિવસ	20	$y$

ધ્યાન આપો, અહીં જેમ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધશે, તેમ સામગ્રી ખલાસ થવા માટેના દિવસો ઘટશે.

આથી, આ વ્યસ્ત પ્રમાણની સ્થિતિ છે.

તેથી,  $100 \times 20 = 125 \times y$

$$\text{અથવા } \frac{100 \times 20}{125} = y \text{ અથવા } 16 = y$$

આમ, જો 25 વિદ્યાર્થી વધારે જોડાય તો ભોજનસામગ્રી 16 દિવસ ચાલશે.

**બીજી રીત :** અહીં  $x_1 y_1 = x_2 y_2$  ને  $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$  તરીકે પણ લખી શકાય.

અર્થાત્  $x_1 : y_1 = x_2 : y_2$

$$\therefore 100 : 125 = y : 20$$

$$\therefore y = \frac{100 \times 20}{125} = 16$$

**ઉદાહરણ 9 :** જો 15 કારીગર એક દીવાલ 48 કલાકમાં બનાવી શકે તો આ જ કામને 30 કલાકમાં પૂરું કરવા કેટલા કારીગર જોઈએ ?

**ઉકેલ :** ધારો કે 30 કલાકમાં કામ પૂરું કરવા માટે જરૂરી કારીગરોની સંખ્યા  $y$  છે.



તેથી આપણને નીચે પ્રમાણે કોષ્ટક મળે.

સમય (કલાકમાં)	48	30
કારીગરની સંખ્યા	15	$y$


અહીં વધારે કારીગર હોય તો દીવાલ બનાવવા ઓછો સમય લાગે. આમ, આ એક વ્યસ્ત પ્રમાણની સ્થિતિ છે.

માટે,  $48 \times 15 = 30 \times y$

$\therefore \frac{48 \times 15}{30} = y$

$\therefore y = 24$

અર્થાત્ આ કામને 30 કલાકમાં પૂરું કરવા માટે 24 કારીગરની જરૂર પડે.



## સ્વાધ્યાય 13.2

1. નીચેનામાંથી કયાં વિધાનો વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે ?

- (i) કોઈ એક કામમાં કારીગરોની સંખ્યા અને કામ પૂરું કરવા માટે લાગતો સમય.
- (ii) યાત્રા કરવા માટેનો કુલ સમય અને અચળ ઝડપથી કાપેલું અંતર.
- (iii) એક ખેતરનું ક્ષેત્રફળ અને તેમાંથી લીધેલ પાકનો જથ્થો.
- (iv) એક નિશ્ચિત યાત્રા માટે લાગતો સમય અને વાહનની ઝડપ.
- (v) કોઈ એક દેશની કુલ જનસંખ્યા અને વ્યક્તિ દીઠ જમીનનું ક્ષેત્રફળ.

2. એક ટેલીવિઝન ગેમ શો (game show)માં પુરસ્કારની રકમ ₹ 1,00,000 દરેક વિજેતાને સરખા ભાગે વહેંચવામાં આવે છે. નીચે દર્શાવેલ કોષ્ટકને પૂર્ણ કરો અને જણાવો કે કોઈ એક વ્યક્તિગત વિજેતાને મળેલી પુરસ્કારની રકમ કુલ વિજેતાઓની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં છે કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે ?

વિજેતાઓની સંખ્યા	1	2	4	5	8	10	20
પ્રત્યેક વિજેતાને મળેલ પુરસ્કાર (રૂમાં)	1,00,000	50,000					

3. રહેમાન, એક પૈડામાં આરા (spokes) લગાવે છે. આ માટે તે સમાન લંબાઈના આરાનો ઉપયોગ કરે છે. હવે તે આરા એવી રીતે લગાવે છે કે જેથી બે ક્રમિક આરા વચ્ચે બનતો ખૂણો સમાન હોય. હવે તેને નીચે આપેલ કોષ્ટક પૂર્ણ કરીને મદદ કરો.



આરાની સંખ્યા	4	6	8	10	12
બે ક્રમિક આરા વચ્ચે બનતો ખૂણો	90°	60°			



- (i) શું આરાની સંખ્યા અને બે ક્રમિક આરા વચ્ચે બનતો ખૂણો પરસ્પર વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે ?
- (ii) 15 આરાવાળા એક પૈડામાં બે ક્રમિક આરાની જોડ વચ્ચે બનતા ખૂણાનું માપ શોધો.
- (iii) બે ક્રમિક આરાની જોડ વચ્ચે બનતા ખૂણાનું માપ  $40^\circ$  છે તો આરાની સંખ્યા શોધો.
4. ડબ્બામાં રહેલી મીઠાઈને 24 બાળકો વચ્ચે વહેંચતાં પ્રત્યેક બાળકને મીઠાઈના 5 ટુકડા મળે છે. હવે જો બાળકોની સંખ્યામાં 4નો ઘટાડો થાય તો પ્રત્યેક બાળકને કેટલી મીઠાઈ મળશે ?
5. એક ખેડૂત પાસે 20 પશુઓને 6 દિવસ સુધી ખવડાવી શકાય તેટલો ઘાસચારો છે. હવે જો તેની પાસે 10 પશુઓ વધારે આવે તો આ ઘાસચારો કેટલા દિવસ ચાલશે ?
6. એક ઠેકેદાર અંદાજ મૂકે છે કે જશમિંદરના ઘરે ફરીથી વીજતાર લગાવવાનું કામ 3 વ્યક્તિ, 4 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. હવે જો તે 3ના બદલે 4 વ્યક્તિને આ કામ પર લગાવે તો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય ?
7. એક જથ્થામાં રહેલી શીશીઓને, 1 બોક્સમાં 12 શીશીઓ હોય તેવા 25 બોક્સમાં રાખવામાં આવેલ છે. હવે જો આ જથ્થાની શીશીઓને એવી રીતે રાખવામાં આવે કે જેથી પ્રત્યેક બોક્સમાં 20 શીશીઓ હોય તો આવાં કેટલાં બોક્સ ભરાશે ?




8. એક ફેક્ટરીમાં નિશ્ચિત સંખ્યાની વસ્તુઓ 63 દિવસમાં બનાવવા 42 યંત્રોની જરૂર પડે છે. આ જ સંખ્યાની વસ્તુઓ 54 દિવસમાં બનાવવા કેટલાં યંત્રો જોઈએ ?
9. એક કારને 60 કિમી/કલાકની ઝડપથી કોઈ એક સ્થાન પર પહોંચવા માટે 2 કલાકનો સમય લાગે છે. હવે જો કારની ઝડપ 80 કિમી/કલાક હોય તો કેટલો સમય લાગશે ?
10. એક ઘરમાં નવી બારીઓ લગાવવા માટે 2 વ્યક્તિઓને 3 દિવસ લાગે છે.
- (i) કાર્યની શરૂઆતમાં જ એક વ્યક્તિ બીમાર પડે તો કાર્ય પૂરું કરવામાં કેટલો સમય લાગશે ?
- (ii) એક જ દિવસમાં બારીઓ લગાવવા કેટલી વ્યક્તિઓની જરૂર પડશે ?
11. કોઈ એક શાળામાં 45 મિનિટનો એક એવા 8 તાસ છે. હવે જો શાળામાં 9 તાસ કરવા હોય તો દરેક તાસનો સમય કેટલો રાખવો પડે ? (અહીં, શાળાનો સમય સમાન રહે છે તેવું માનવું.)



## આટલું કરો


1. એક કાગળ લો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ તેમાં ગડી પાડી અને સમાન ભાગમાં વિભાજિત કરો. દરેક સ્થિતિમાં બનતા ભાગની સંખ્યા અને કોઈ એક ભાગનું ક્ષેત્રફળ લખો.



તમારા અવલોકનોને કોષ્ટક સ્વરૂપે દર્શાવો અને તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો. શું આ એક વ્યસ્ત પ્રમાણની સ્થિતિ છે ? કેમ ?

ભાગની સંખ્યા	1	2	4	8	16
પ્રત્યેક ભાગનું ક્ષેત્રફળ	કાગળનું ક્ષેત્રફળ	કાગળના ક્ષેત્રફળનો $\frac{1}{2}$ ભાગ			

2. ગોળાકાર તળિયું ધરાવતાં અલગ અલગ માપનાં પાત્ર લો. પ્રત્યેક પાત્રમાં નિશ્ચિત જથ્થાનું પાણી ભરો. હવે દરેક પાત્રનો વ્યાસ અને તેમાં રહેલા પાણીની ઊંચાઈ નોંધો. તમારાં અવલોકનોનું કોષ્ટક બનાવો. શું આ એક વ્યસ્ત પ્રમાણની સ્થિતિ છે ?



પાત્રનો વ્યાસ (સેમીમાં)			
પાણીની સપાટીનું સ્તર (સેમીમાં)			

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

1. જો બે રાશિ  $x$  અને  $y$  એક સાથે એવી રીતે વધે (કે ઘટે) કે જેથી તેમનાં અનુરૂપ મૂલ્યોનો ગુણોત્તર અચળ રહે તો તે સમપ્રમાણમાં છે તેમ કહેવાય. એટલે કે જો  $\frac{x}{y} = k$  ( $k$  કોઈ ધન સંખ્યા છે.) હોય તો  $x$  અને  $y$  સમપ્રમાણમાં છે તેમ કહેવાય. આ સ્થિતિમાં  $x$ નાં મૂલ્યો  $x_1$  અને  $x_2$ ને અનુરૂપ  $y$ નાં ક્રમિક મૂલ્યો  $y_1$  અને  $y_2$  હોય, તો  $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$  થાય.



2. બે રાશિ  $x$  અને  $y$  માટે જો રાશિ  $x$ માં થતો વધારો (કે ઘટાડો), રાશિ  $y$ માં એવી રીતે ઘટાડો (કે વધારો) કરે કે જેથી તેમનાં અનુરૂપ મૂલ્યોનો ગુણાકાર અચળ રહે તો તેઓ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે તેમ કહેવાય. એટલે કે જો  $xy = k$  હોય તો  $x$  અને  $y$  પરસ્પર વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. આ સ્થિતિમાં  $x$ નાં મૂલ્યો  $x_1$  અને  $x_2$ ને અનુરૂપ  $y$ નાં કમિક મૂલ્યો  $y_1$  અને  $y_2$  હોય તો  $x_1 y_1 = x_2 y_2$  અથવા  $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$  થાય.





## અવયવીકરણ

પ્રકરણ

14

### 14.1 પ્રાસ્તાવિક

#### 14.1.1 પ્રાકૃતિક સંખ્યાના અવયવો

ધોરણ 6 માં અવયવો વિશે ભણ્યા તે તમને યાદ હશે.

ચાલો એક પ્રાકૃતિક સંખ્યા લઈએ.

ધારો કે 30, તેને પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગુણાકારના રૂપમાં લખો.

$$30 = 2 \times 15 \\ = 3 \times 10 = 5 \times 6$$

તેથી 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 અને 30 એ 30ના અવયવો છે.

આમાંથી 2, 3, 5 એ તેના અવિભાજ્ય અવયવો છે. (કેમ ?)

જે સંખ્યાને તેના અવિભાજ્ય અવયવોના ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી શકાય, તેને તેના અવિભાજ્ય અવયવ રૂપ કહી શકાય.

દા. ત., 30નું અવિભાજ્ય અવયવ રૂપ  $2 \times 3 \times 5$  થાય.

70નું અવિભાજ્ય અવયવ રૂપ  $2 \times 5 \times 7$  છે,

90નું અવિભાજ્ય અવયવ રૂપ  $2 \times 3 \times 3 \times 5$  છે.

આ રીતે આપણે બૈજિક પદાવલિ (Algebraic Expressions)ને તેના અવયવોના ગુણાકારના રૂપમાં લખી શકીએ. જે આપણે આ પ્રકરણમાં શીખીશું.

#### 14.1.2 બૈજિક પદાવલિના અવયવો

આપણે ધોરણ 7માં જોયું કે બૈજિક પદાવલિમાં પદો એ અવયવોના ગુણાકારના રૂપમાં હોય છે.

દા.ત., બૈજિક પદાવલિ  $5xy + 3x$ માં પદ  $5xy$  એ અવયવો 5,  $x$  અને  $y$ થી બનેલ છે. i.e.,

$$5xy = 5 \times x \times y$$

અવલોકન કરો કે અવયવો 5,  $x$  અને  $y$  ને ફરીથી અવયવોના ગુણાકારના રૂપમાં દર્શાવી શકાશે નહિ.

આપણે કહી શકીએ કે 5,  $x$  અને  $y$  એ  $5xy$ ના અવિભાજ્ય અવયવો છે. બૈજિક પદાવલિમાં આપણે અવિભાજ્યના બદલે અવિભાજિત શબ્દ વાપરીશું. આપણે કહી શકીએ કે  $5 \times x \times y$  એ  $5xy$ નું અવિભાજિત અવયવ રૂપ છે. નોંધ :  $5 \times (xy)$  એ  $5xy$ નું અવિભાજિત અવયવ રૂપ નથી, કારણ કે  $xy$ ને  $x$  અને  $y$ ના ગુણાકારના રૂપમાં દર્શાવી શકાય. અર્થાત્  $xy = x \times y$

આપણને ખબર છે કે, 30ને  $30 = 1 \times 30$  પણ લખી શકાય. તેથી, 1 અને 30 પણ 30ના અવયવ છે. તમે નોંધ લેશો કે 1 એ કોઈ પણ સંખ્યાનો અવયવ છે. દા.ત.,  $101 = 101 \times 1$  જ્યારે આપણે કોઈ સંખ્યાને તેના અવયવના ગુણાકારના રૂપમાં લખીશું ત્યારે 1ને તેના અવયવ તરીકે નહિ લખીએ જ્યાં સુધી ખાસ જરૂરિયાત ન હોય.

નોંધ : 1 એ  $5xy$ નો અવયવ છે, તેથી  $5xy = 1 \times 5 \times x \times y$  હકીકતમાં 1 એ બધા પદોનો અવયવ છે, છતાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જેમ, જ્યારે ખાસ જરૂરિયાત હોય ત્યારે જ તેને કોઈ પણ પદના અવયવના રૂપમાં દર્શાવીશું.

અન્ય પદાવલિ વિચારો :  $3x(x + 2)$  જેને 3,  $x$  અને  $(x + 2)$  અવયવોનાં ગુણાકારના રૂપમાં લખી શકાય.

$$3x(x + 2) = 3 \times x \times (x + 2)$$

અવયવો 3,  $x$  અને  $(x + 2)$  એ  $3x(x + 2)$ ના અવિભાજિત અવયવો છે. આ રીતે પદાવલિ  $10x(x + 2)(y + 3)$ ને તેના અવિભાજિત અવયવોના રૂપમાં આ રીતે દર્શાવી શકાય.

$$10x(x + 2)(y + 3) = 2 \times 5 \times x \times (x + 2) \times (y + 3)$$



## 14.2 અવયવીકરણ એટલે શું ?

જ્યારે આપણે બૈજિક પદાવલિનું અવયવીકરણ કરીએ ત્યારે તેને અવયવોના ગુણાકારના રૂપમાં લખીએ છીએ. આ અવયવો સંખ્યા, બૈજિક ચલ કે બૈજિક પદાવલિ હોઈ શકે.

પદાવલિઓ જેવી કે  $3xy$ ,  $5x^2y$ ,  $2x(y + 2)$ ,  $5(y + 1)(x + 2)$  અવયવનાં રૂપમાં જ છે. તેના અવયવો માત્ર તેને વાંચીને જ મેળવી શકાય છે, જે આપણે જાણીએ છીએ.

બીજી તરફ  $2x + 4$ ,  $3x + 3y$ ,  $x^2 + 5x$ ,  $x^2 + 5x + 6$  જેવી પદાવલિમાં તેમના અવયવો સીધા મળી શકે તેમ નથી. આ પદાવલિનું અવયવીકરણ કરવા માટે અર્થાત્ અવયવો મેળવવા માટે એક વ્યવસ્થિત પદ્ધતિની જરૂર છે. જે આપણે હવે શીખીશું.

### 14.2.1 સામાન્ય અવયવોની રીત

- આપણે એક સાદી પદાવલિ  $(2x + 4)$  લઈએ.

દરેક પદને આપણે અવિભાજિત અવયવોના રૂપમાં લખીએ.

$$2x = 2 \times x$$

$$4 = 2 \times 2$$

$$2x + 4 = (2 \times x) + (2 \times 2)$$

અહીં, 2 એ બંને પદમાં સામાન્ય અવયવ છે.

વિભાજનના નિયમના આધારે અવલોકન કરતાં,

$$2 \times (x + 2) = (2 \times x) + (2 \times 2)$$

તેથી આપણે લખી શકીએ કે,

$$2x + 4 = 2 \times (x + 2) = 2(x + 2)$$

આમ, પદાવલિ  $2x + 4$  એ  $2(x + 2)$  જેવી જ છે. તેના અવયવો 2 અને  $(x + 2)$  તરીકે વાંચી શકાય જે તેના અવિભાજિત અવયવો છે.

ધારો કે  $5xy + 10x$ ના અવયવ મેળવવા છે.

તો,  $5xy$  અને  $10x$ ને તેના અવિભાજિત અવયવોના રૂપમાં નીચે મુજબ લખી શકાય :

$$5xy = 5 \times x \times y$$

$$10x = 2 \times 5 \times x$$

અહીં, 5 અને  $x$  એ બંને પદમાં સામાન્ય અવયવો છે.

હવે,

$$5xy + 10x$$

$$= (5 \times x \times y) + (2 \times 5 \times x)$$

$$= (5x \times y) + (5x \times 2)$$

આપણે બંને પદને વિભાજનના નિયમનો ઉપયોગ કરીને જોડીએ,

$$(5x \times y) + (5x \times 2) = 5x \times (y + 2)$$

તેથી,  $5xy + 10x = 5x(y + 2)$  જે પદાવલિનું ઈચ્છિત અવયવ સ્વરૂપ છે.

**ઉદાહરણ 1 :**  $12a^2b + 15ab^2$ નું અવયવીકરણ કરો.

**ઉકેલ :**

$$12a^2b = 2 \times 2 \times 3 \times a \times a \times b$$

$$15ab^2 = 3 \times 5 \times a \times b \times b$$

બન્ને પદોમાં 3,  $a$ , અને  $b$  સામાન્ય અવયવો છે.

તેથી,

$$12a^2b + 15ab^2 = (3 \times a \times b \times 2 \times 2 \times a) + (3 \times a \times b \times 5 \times b)$$

$$= 3 \times a \times b \times [(2 \times 2 \times a) + (5 \times b)]$$

( $\because$  પદોને જોડતાં;)

$$= 3ab \times (4a + 5b)$$

$$= 3ab(4a + 5b) \text{ (જરૂરી અવયવ રૂપ)}$$

**ઉદાહરણ 2 :**  $10x^2 - 18x^3 + 14x^4$ નું અવયવીકરણ કરો.

**ઉકેલ :**

$$10x^2 = 2 \times 5 \times x \times x$$

$$18x^3 = 2 \times 3 \times 3 \times x \times x \times x$$

$$14x^4 = 2 \times 7 \times x \times x \times x \times x$$

ત્રણે પદોમાં 2,  $x$  અને  $x$  સામાન્ય અવયવો છે.

તેથી,

$$10x^2 - 18x^3 + 14x^4 = (2 \times x \times x \times 5) - (2 \times x \times x \times 3 \times 3 \times x)$$

$$+ (2 \times x \times x \times 7 \times x \times x)$$

$$= 2 \times x \times x \times [(5 - (3 \times 3 \times x) + (7 \times x \times x))] \text{ (}\because \text{ ત્રણે પદોને જોડતાં;)}$$

$$= 2x^2(5 - 9x + 7x^2)$$

$$= 2x^2(7x^2 - 9x + 5)$$

તમે નોંધ્યું કે પદાવલિના અવયવ રૂપમાં માત્ર એક જ પદ છે ?

### પ્રયત્ન કરો

અવયવો શોધો : (i)  $12x + 36$  (ii)  $22y - 33z$  (iii)  $14pq + 35pqr$

### 14.2.2 પદોની પુનઃગોઠવણી દ્વારા અવયવીકરણ

પદાવલિ  $2xy + 2y + 3x + 3$ ને જુઓ. તમે જોશો કે પ્રથમ બે પદોમાં 2 અને  $y$  અને છેલ્લાં બે પદોમાં 3 સામાન્ય અવયવ છે. પણ બધાં પદોમાં સામાન્ય અવયવ એક પણ નથી.

$(2xy + 2y)$ ને અવયવોના રૂપમાં લખીએ

$$2xy + 2y = (2 \times x \times y) + (2 \times y)$$

$$= (2 \times y \times x) + (2 \times y \times 1)$$

$$= (2y \times x) + (2y \times 1)$$

$$= 2y(x + 1)$$

તે રીતે,

$$3x + 3 = (3 \times x) + (3 \times 1)$$

$$= 3 \times (x + 1)$$

$$= 3(x + 1)$$

નોંધ : અહીં 1 ને અવયવ તરીકે દર્શાવવો જરૂરી છે. શા માટે ?

તેથી

$$2xy + 2y + 3x + 3 = 2y(x + 1) + 3(x + 1)$$

અહીં, બન્ને પદોની જમણી બાજુમાં  $(x + 1)$  સામાન્ય અવયવ છે. બન્ને પદોને જોડતાં,

$$2xy + 2y + 3x + 3 = 2y(x + 1) + 3(x + 1) = (x + 1)(2y + 3)$$

હવે, પદાવલિ  $2xy + 2y + 3x + 3$  તેના અવયવોના ગુણાકારના રૂપમાં છે. તેના અવયવો  $(x + 1)$  અને  $(2y + 3)$  છે. જે અવિભાજિત અવયવો છે.

### પદોની પુનઃગોઠવણી એટલે શું ?

ધારો કે, આપણે હમણાં અભ્યાસમાં લીધેલ પદાવલિ જો  $2xy + 3 + 2y + 3x$  સ્વરૂપે આપવામાં આવે તો, તેનું અવયવીકરણ સરળ બનતું નથી. જેથી, આ પદાવલિના અવયવ મેળવવા આપેલાં પદોનાં સ્થાનમાં ફેરફાર કરી તેને  $2xy + 2y + 3x + 3$  સ્વરૂપે લેતાં  $(2xy + 2y)$  અને  $(3x + 3)$  એવાં બે જૂથ મળે, જેનાથી અવયવીકરણ સરળ બને. આ પ્રક્રિયાને પદોની પુનઃગોઠવણી કહે છે.

પદોની પુનઃગોઠવણી એકથી વધારે રીતે થઈ શકે. ધારો કે, આપણે પદાવલિને  $2xy + 3x + 2y + 3$  ક્રમમાં ગોઠવીએ તો,

$$\begin{aligned} 2xy + 3x + 2y + 3 &= 2 \times x \times y + 3 \times x + 2 \times y + 3 \\ &= x \times (2y + 3) + 1 \times (2y + 3) \\ &= (2y + 3)(x + 1) \end{aligned}$$

અહીં, અવયવો સમાન જ મળે છે. પરંતુ માત્ર અલગ ક્રમમાં દેખાય છે.

**ઉદાહરણ 3 :**  $6xy - 4y + 6 - 9x$  નું અવયવીકરણ કરો.

**ઉકેલ :**

**સોપાન 1** બધાં પદોમાં કોઈ સામાન્ય અવયવ છે ? તે ચકાસો. અહીં એક પણ નથી.

**સોપાન 2** ગોઠવણી વિશે વિચારો. જુઓ પ્રથમ બે પદોમાં  $2y$  સામાન્ય અવયવ છે.

$$6xy - 4y = 2y(3x - 2) \quad (a)$$

છેલ્લાં બે પદોનું શું ? તમે તેનો ક્રમ  $-9x + 6$  કરો તો અવયવ  $(3x - 2)$  મળશે.

$$\begin{aligned} -9x + 6 &= -3(3x) + 3(2) \\ &= -3(3x - 2) \quad (b) \end{aligned}$$

**સોપાન 3** (a) અને (b)ને સાથે લેતાં

$$\begin{aligned} 6xy - 4y + 6 - 9x &= 6xy - 4y - 9x + 6 \\ &= 2y(3x - 2) - 3(3x - 2) \\ &= (3x - 2)(2y - 3) \end{aligned}$$

$(3x - 2)$  અને  $(2y - 3)$  એ  $(6xy - 4y + 6 - 9x)$ ના અવયવો છે.



## સ્વાધ્યાય 14.1

1. આપેલાં પદોમાં સામાન્ય અવયવ મેળવો.

- |                          |                                      |                          |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| (i) $12x, 36$            | (ii) $2y, 22xy$                      | (iii) $14pq, 28p^2q^2$   |
| (iv) $2x, 3x^2, 4$       | (v) $6abc, 24ab^2, 12a^2b$           | (vi) $16x^3, -4x^2, 32x$ |
| (vii) $10pq, 20qr, 30rp$ | (viii) $3x^2y^3, 10x^3y^2, 6x^2y^2z$ |                          |

2. આપેલી પદાવલિઓના અવયવ મેળવો.

- |                               |                            |                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (i) $7x - 42$                 | (ii) $6p - 12q$            | (iii) $7a^2 + 14a$           |
| (iv) $-16z + 20z^3$           | (v) $20l^2m + 30alm$       | (vi) $5x^2y - 15xy^2$        |
| (vii) $10a^2 - 15b^2 + 20c^2$ | (viii) $-4a^2 + 4ab - 4ca$ | (ix) $x^2yz + xy^2z + xyz^2$ |
| (x) $ax^2y + bxy^2 + cxyz$    |                            |                              |

3. અવયવ મેળવો.

- |                             |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (i) $x^2 + xy + 8x + 8y$    | (ii) $15xy - 6x + 5y - 2$ | (iii) $ax + bx - ay - by$ |
| (iv) $15pq + 15 + 9q + 25p$ |                           |                           |
| (v) $z - 7 + 7xy - xyz$     |                           |                           |



### 14.2.3 નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને અવયવીકરણ

$$\text{આપણે જાણીએ છીએ કે,} \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{(I)}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{(II)}$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad \text{(III)}$$

નીચેનાં ઉદાહરણો દ્વારા આપણે આ નિત્યસમનો ઉપયોગ અવયવીકરણમાં કેવી રીતે થાય એ શીખીશું. આપણે પદાવલિઓનું અવલોકન કરીશું. જો કોઈ પદાવલિનું રૂપ (પ્રકાર) કોઈ પણ નિત્યસમની જમણી બાજુ જેવું હોય તો તે પદાવલિના ડાબી બાજુનાં પદો એ તેનું યોગ્ય અવયવીકરણ આપશે.

**ઉદાહરણ 4 :**  $x^2 + 8x + 16$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :** પદાવલિનું અવલોકન કરો. અહીં ત્રણ પદો છે. તેથી તે નિત્યસમ (III) જેવું નથી. તેનું પ્રથમ અને છેલ્લું પદ પૂર્ણવર્ગ છે અને વચ્ચેના પદ પહેલા ‘+’ની નિશાની છે. તેથી તે  $a^2 + 2ab + b^2$ વાળું રૂપ છે. જ્યાં  $a = x$  અને  $b = 4$

$$\begin{aligned} \text{જેથી,} \quad a^2 + 2ab + b^2 &= (x)^2 + 2(x)(4) + (4)^2 \\ &= x^2 + 8x + 16 \end{aligned}$$

$$\text{હવે,} \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \text{ સાથે સરખાવતાં,}$$

$$x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2 \text{ (જરૂરી અવયવીકરણ)}$$

**ઉદાહરણ 5 :**  $4y^2 - 12y + 9$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :** અવલોકન કરો,  $4y^2 = (2y)^2$ ,  $9 = 3^2$ ,  $12y = 2 \times 3 \times 2y$

$$\begin{aligned} \text{તેથી,} \quad 4y^2 - 12y + 9 &= (2y)^2 - 2 \times (3) \times (2y) + (3)^2 \\ &= (2y - 3)^2 \text{ (જરૂરી અવયવીકરણ)} \end{aligned}$$

અહીં અવલોકન કરી શકીએ કે, આપેલ પદાવલિનું સ્વરૂપ :  $a^2 - 2ab + b^2$  પ્રકારનું છે. જ્યાં  $a = 2y$  અને  $b = 3$  અને  $2ab = 2(2y)(3) = 12y$

**ઉદાહરણ 6 :**  $49p^2 - 36$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :** અહીં બે પદો છે, બંને પૂર્ણવર્ગ છે અને બીજું પદ ઋણ છે.

પદાવલિનું રૂપ  $(a^2 - b^2)$  જેવું છે. અહીં નિત્યસમ III નો ઉપયોગ કરીશું.

$$\begin{aligned} 49p^2 - 36 &= (7p)^2 - (6)^2 \\ &= (7p - 6)(7p + 6) \text{ (જરૂરી અવયવીકરણ)} \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 7 :**  $a^2 - 2ab + b^2 - c^2$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :** આપેલ પદાવલિના પ્રથમ ત્રણ પદોનું રૂપ  $(a - b)^2$  જેવું છે અને ચોથું પદ પૂર્ણવર્ગ છે. એટલે આપેલ પદાવલિને બે વર્ગોના તફાવતના રૂપમાં લખી શકાય.

$$\begin{aligned} \text{તેથી,} \quad a^2 - 2ab + b^2 - c^2 &= (a - b)^2 - c^2 \text{ (નિત્યસમ II)} \\ &= [(a - b) - c] [(a - b) + c] \text{ (નિત્યસમ III)} \\ &= (a - b - c)(a - b + c) \text{ (જરૂરી અવયવીકરણ)} \end{aligned}$$

અહીં, નોંધો કે જરૂરી અવયવીકરણ માટે આપણે બે નિત્યસમ એક પછી એક લાગુ પાડ્યા છે.

**ઉદાહરણ 8 :**  $m^4 - 256$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :**  $m^4 = (m^2)^2$  અને  $256 = (16)^2$

તેથી, આપેલ પદાવલિ નિત્યસમ (III) જેવી છે.

$$\begin{aligned} m^4 - 256 &= (m^2)^2 - (16)^2 \\ &= (m^2 - 16)(m^2 + 16) \text{ (નિત્યસમ (III) પરથી)} \end{aligned}$$

હવે  $(m^2 + 16)$ નું આગળ અવયવીકરણ ન થઈ શકે પણ  $(m^2 - 16)$ નું નિત્યસમ (III) દ્વારા આગળ અવયવીકરણ થઈ શકે.

$$\begin{aligned} m^2 - 16 &= m^2 - 4^2 \\ &= (m - 4)(m + 4) \end{aligned}$$

$$\text{તેથી } m^2 - 256 = (m - 4)(m + 4)(m^2 + 16)$$

#### 14.2.4 $(x + a)(x + b)$ પ્રકારના અવયવો

હવે આપણે એક ચલવાળી પદાવલિઓનું અવયવીકરણ શીખીએ. જેવી કે,  $x^2 + 5x + 6$ ,  $y^2 - 7y + 12$ ,  $z^2 - 4z - 12$ ,  $3m^2 + 9m + 6$  વિગેરે....અવલોકન કરો કે આ પદાવલિઓ  $(a + b)^2$  કે  $(a - b)^2$  જેવી નથી. તે પૂર્ણવર્ગ પણ નથી. દા.ત.,  $x^2 + 5x + 6$ માં 6 એ પૂર્ણવર્ગ નથી.

આ પદાવલિઓ  $(a^2 - b^2)$  જેવી પણ નથી. તે  $x^2 + (a + b)x + ab$  જેવી લાગે છે. તેથી આપણે નિત્યસમ (IV) જે આગળના પ્રકરણમાં ભણ્યા તેનો ઉપયોગ કરીને આવી પદાવલિઓનું અવયવીકરણ કરીએ.

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab \quad \text{(IV)}$$

તેના માટે આપણે  $x$ ના સહગુણક અને અચળ પદનું અવલોકન કરીએ.

હવે નીચેના ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ કે એ કેવી રીતે થશે ?

**ઉદાહરણ 9 :**  $x^2 + 5x + 6$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :** આપણે નિત્યસમ (IV)ની જમણી બાજુને  $x^2 + 5x + 6$  સાથે સરખાવીએ તો આપણને  $ab = 6$  અને  $a + b = 5$  મળે.

આ પરથી આપણે  $a$  અને  $b$  મેળવવા પડે, જેથી અવયવો  $(x + a)$  અને  $(x + b)$  થાય.

જો  $ab = 6$  હોય તો  $a$  અને  $b$  એ 6ના અવયવ છે.

ચાલો,  $a = 6$ ,  $b = 1$  લઈ પ્રયત્ન કરીએ. આ કિંમતો માટે  $a + b = 7$  મળે, 5 નહીં. તેથી આ પસંદગી યોગ્ય નથી. હવે  $a = 2$  અને  $b = 3$  ચકાસીએ. અહીં  $a + b = 5$  થાય છે.

આમ, આપેલ પદાવલિનું અવયવીકરણવાળું રૂપ  $(x + 2)(x + 3)$  થાય.

વ્યાપક રીતે  $x^2 + px + q$  પ્રકારની બૈજિક પદાવલિનું અવયવીકરણ કરવા માટે આપણે  $q$ ના બે અવયવો  $a$  અને  $b$  શોધવા પડે જેથી

$$ab = q \text{ અને } a + b = p \text{ થાય.}$$

તો પદાવલિ

$$x^2 + (a + b)x + ab \text{ થશે.}$$

અર્થાત્,

$$x^2 + ax + bx + ab \text{ થશે.}$$

અર્થાત્,

$$x(x + a) + b(x + a) \text{ થશે.}$$

અર્થાત્,

$$(x + a)(x + b). \quad \text{જે જરૂરી ઈચ્છિત અવયવો છે.}$$

**ઉદાહરણ 10 :**  $y^2 - 7y + 12$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :** આપણે જાણીએ છીએ કે,  $12 = 3 \times 4$  અને  $3 + 4 = 7$

તેથી

$$\begin{aligned} y^2 - 7y + 12 &= y^2 - 3y - 4y + 12 \\ &= y(y - 3) - 4(y - 3) = (y - 3)(y - 4) \end{aligned}$$

અહીં નોંધો કે આ વખતે આપણે  $a$  અને  $b$  શોધવા માટે આપેલ પદાવલિને નિત્યસમ (IV) સાથે સરખાવી નથી. થોડા પ્રયત્નો બાદ આપેલ પદાવલિનું અવયવીકરણ કરવા માટે તમારે પણ તેને નિત્યસમ સાથે સરખાવવાની જરૂર રહેશે નહિ. તમે સીધા જ આગળ વધી શકશો.

**ઉદાહરણ 11 :**  $z^2 - 4z - 12$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :** અહીં  $ab = -12$  તેનો મતલબ  $a$  અને  $b$ માંથી કોઈ પણ એક ઋણ છે.

$a + b = -4$  છે તેથી જે સંખ્યા મોટી છે તે ઋણ છે. આપણે  $a = -4$  અને  $b = 3$  લઈને ચકાસીએ પણ આ શક્ય બનશે નહીં. કારણ કે, અહીં  $a + b = -1$  થાય છે.

હવે,  $a = -6$ ,  $b = 2$  લઈને ચકાસીએ, અહીં  $a + b = -4$  થાય છે.

$$\begin{aligned} \text{તેથી,} \quad z^2 - 4z - 12 &= z^2 - 6z + 2z - 12 \\ &= z(z - 6) + 2(z - 6) \\ &= (z - 6)(z + 2) \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 12 :**  $3m^2 + 9m + 6$ ના અવયવ મેળવો.

**ઉકેલ :** આપણે નોંધીએ કે ત્રણેય પદોમાં 3 એ સામાન્ય અવયવ છે.

$$\begin{aligned} \text{તેથી,} \quad 3m^2 + 9m + 6 &= 3(m^2 + 3m + 2) \\ \text{હવે,} \quad m^2 + 3m + 2 &= m^2 + m + 2m + 2 \quad (\because 2 = 1 \times 2) \\ &= m(m + 1) + 2(m + 1) \\ &= (m + 1)(m + 2) \end{aligned}$$

$$\text{આમ,} \quad 3m^2 + 9m + 6 = 3(m + 1)(m + 2)$$

## સ્વાધ્યાય 14.2

1. નીચેની પદાવલિઓના અવયવ મેળવો.

(i)  $a^2 + 8a + 16$       (ii)  $p^2 - 10p + 25$       (iii)  $25m^2 + 30m + 9$

(iv)  $49y^2 + 84yz + 36z^2$       (v)  $4x^2 - 8x + 4$

(vi)  $121b^2 - 88bc + 16c^2$

(vii)  $(l + m)^2 - 4lm$       (સૂચન :  $(l + m)^2$  નું વિસ્તરણ કરો.)

(viii)  $a^4 + 2a^2b^2 + b^4$

2. અવયવ મેળવો.

(i)  $4p^2 - 9q^2$       (ii)  $63a^2 - 112b^2$       (iii)  $49x^2 - 36$

(iv)  $16x^5 - 144x^3$       (v)  $(l + m)^2 - (l - m)^2$

(vi)  $9x^2y^2 - 16$       (vii)  $(x^2 - 2xy + y^2) - z^2$

(viii)  $25a^2 - 4b^2 + 28bc - 49c^2$

3. પદાવલિના અવયવ મેળવો.

(i)  $ax^2 + bx$       (ii)  $7p^2 + 21q^2$       (iii)  $2x^3 + 2xy^2 + 2xz^2$

(iv)  $am^2 + bm^2 + bn^2 + an^2$       (v)  $(lm + l) + m + 1$

(vi)  $y(y + z) + 9(y + z)$       (vii)  $5y^2 - 20y - 8z + 2yz$

(viii)  $10ab + 4a + 5b + 2$       (ix)  $6xy - 4y + 6 - 9x$



## 4. અવયવ મેળવો.

(i)  $a^4 - b^4$

(ii)  $p^4 - 81$

(iii)  $x^4 - (y + z)^4$

(iv)  $x^4 - (x - z)^4$

(v)  $a^4 - 2a^2b^2 + b^4$

## 5. નીચેની પદાવલિના અવયવ મેળવો.

(i)  $p^2 + 6p + 8$

(ii)  $q^2 - 10q + 21$

(iii)  $p^2 + 6p - 16$



## 14.3 બૈજિક પદાવલિઓનો ભાગાકાર

આપણે બૈજિક પદાવલિઓનો સરવાળો અને બાદબાકી કરતા શીખ્યા. આપણને બે પદાવલિઓનો ગુણાકાર કરતાં પણ આવડે છે. પણ આપણે એક બૈજિક પદાવલિનો બીજી પદાવલિ વડે ભાગાકાર કરવા તરફ ધ્યાન આપ્યું નથી. તે આપણે અહીં શીખીશું.

આપણે યાદ કરીએ કે ભાગાકાર એ ગુણાકારની વ્યસ્ત ક્રિયા છે.  $7 \times 8 = 56$  તેથી  $56 \div 8 = 7$

અથવા  $56 \div 7 = 8$

આ જ રીતે આપણે બૈજિક પદાવલિઓનો ભાગાકાર કરીશું.

દા.ત.,

(i)  $2x \times 3x^2 = 6x^3$

તેથી  $6x^3 \div 2x = 3x^2$

અને  $6x^3 \div 3x^2 = 2x$

(ii)  $5x(x + 4) = 5x^2 + 20x$

તેથી  $(5x^2 + 20x) \div 5x = x + 4$

અને  $(5x^2 + 20x) \div (x + 4) = 5x$

હવે આપણે સમજીશું કે એક પદાવલિનો ભાગાકાર બીજી પદાવલિ દ્વારા કેવી રીતે થાય.

આપણે એકપદીનો ભાગાકાર એકપદી દ્વારા કેવી રીતે કરી શકાય ત્યાંથી શરૂઆત કરીશું.

## 14.3.1 એકપદી વડે બીજી એકપદીનો ભાગાકાર

ધારો કે,  $6x^3 \div 2x$

આપણે  $2x$  અને  $6x^3$ નું અવિભાજિત અવયવરૂપ લખીએ.

$$2x = 2 \times x$$

$$6x^3 = 2 \times 3 \times x \times x \times x$$

હવે  $2x$ ને અલગ પાડવા માટે આપણે  $6x^3$ ના અવયવોનું જૂથ બનાવીએ.

$$6x^3 = 2 \times x \times (3 \times x \times x)$$

$$= (2x) \times (3x^2)$$

તેથી  $6x^3 \div 2x = 3x^2$

ટૂંકી રીત : સામાન્ય અવયવોને દૂર કરવા એ બે સંખ્યાનો ભાગાકાર દર્શાવતી રીત છે.

$$77 \div 7 = \frac{77}{7} = \frac{7 \times 11}{7} = 11$$

આ રીતે,

$$\begin{aligned} 6x^3 \div 2x &= \frac{6x^3}{2x} \\ &= \frac{2 \times 3 \times x \times x \times x}{2 \times x} \\ &= 3 \times x \times x \\ &= 3x^2 \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 13 :** નીચેના ભાગાકાર કરો.

(i)  $-20x^4 \div 10x^2$

(ii)  $7x^2y^2z^2 \div 14xyz$

**ઉકેલ :**

(i)  $-20x^4 = -2 \times 2 \times 5 \times x \times x \times x \times x$

$$10x^2 = 2 \times 5 \times x \times x$$

$$\begin{aligned} \text{તેથી, } (-20x^4) \div 10x^2 &= \frac{-2 \times 2 \times 5 \times x \times x \times x \times x}{2 \times 5 \times x \times x} \\ &= -2 \times x \times x = -2x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } 7x^2y^2z^2 \div 14xyz &= \frac{7 \times x \times x \times y \times y \times z \times z}{2 \times 7 \times x \times y \times z} \\ &= \frac{x \times y \times z}{2} = \frac{1}{2}xyz \end{aligned}$$

### પ્રયત્ન કરો

ભાગાકાર કરો.

(i)  $6yz^2$  દ્વારા  $24xy^2z^3$       (ii)  $7a^2b^2c^3$  દ્વારા  $63a^2b^4c^6$



### 14.3.2 એકપદી વડે બહુપદીનો ભાગાકાર

ધારો કે ત્રિપદી  $4y^3 + 5y^2 + 6y$ નો ભાગાકાર એકપદી  $2y$  દ્વારા કરીએ.

$4y^3 + 5y^2 + 6y = (2 \times 2 \times y \times y \times y) + (5 \times y \times y) + (2 \times 3 \times y)$   
(અહીં આપણે બહુપદીના દરેક પદને તેના અવયવોના રૂપમાં દર્શાવ્યું છે.) આપણે જોયું કે,  $2 \times y$  એ બધામાં સામાન્ય પદ છે. તેથી દરેક પદમાંથી  $2 \times y$ ને અલગ કરતાં

$$\begin{aligned} 4y^3 + 5y^2 + 6y &= 2 \times y \times (2 \times y \times y) + 2 \times y \times \left(\frac{5}{2} \times y\right) + 2 \times y \times 3 \\ &= 2y(2y^2) + 2y\left(\frac{5}{2} \times y\right) + 2y(3) \\ &= 2y\left(2y^2 + \frac{5}{2}y + 3\right) \text{ (સામાન્ય અવયવ } 2y \text{ અલગથી દર્શાવેલ છે.)} \end{aligned}$$

તેથી,  $(4y^3 + 5y^2 + 6y) \div 2y$

$$\begin{aligned} &= \frac{4y^3 + 5y^2 + 6y}{2y} = \frac{2y(2y^2 + \frac{5}{2}y + 3)}{2y} \\ &= 2y^2 + \frac{5}{2}y + 3 \end{aligned}$$

બીજી રીત : આપણે બહુપદીના દરેક પદને એકપદી દ્વારા ભાગી શકીએ.

$$\begin{aligned} (4y^3 + 5y^2 + 6y) \div 2y &= \frac{4y^3 + 5y^2 + 6y}{2y} \\ &= \frac{4y^3}{2y} + \frac{5y^2}{2y} + \frac{6y}{2y} \\ &= 2y^2 + \frac{5}{2}y + 3 \end{aligned}$$

અહીં આપણે અંશની બહુપદીના દરેક પદને છેદમાં આવેલી એકપદી દ્વારા ભાગીએ છીએ...

**ઉદાહરણ 14 :**  $24(x^2yz + xy^2z + xyz^2)$ ને  $8xyz$  વડે બંને રીતથી ભાગો.

**ઉકેલ :**  $24(x^2yz + xy^2z + xyz^2)$

$$\begin{aligned} &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times [(x \times x \times y \times z) + (x \times y \times y \times z) + (x \times y \times z \times z)] \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times x \times y \times z(x + y + z) \quad \text{(સામાન્ય અવયવ લેતાં;)} \\ &= 8 \times 3 \times xyz \times (x + y + z) \end{aligned}$$

તેથી,  $24(x^2yz + xy^2z + xyz^2) \div 8xyz$

$$= \frac{8 \times 3 \times xyz \times (x + y + z)}{8 \times xyz} = 3 \times (x + y + z) = 3(x + y + z)$$



$$\begin{aligned} \text{બીજી રીત, } 24(x^2yz + xy^2z + xyz^2) \div 8xyz &= \frac{24x^2yz}{8xyz} + \frac{24xy^2z}{8xyz} + \frac{24xyz^2}{8xyz} \\ &= 3x + 3y + 3z = 3(x + y + z) \end{aligned}$$

#### 14.4 બૈજિક પદાવલિના ભાગાકાર (બહુપદી ÷ બહુપદી)

- ધારો કે  $(7x^2 + 14x) \div (x + 2)$

આપણે  $(7x^2 + 14x)$  ના અવયવો મેળવીશું.

શું અહીં, અંશમાં રહેલ દરેક પદને, છેદમાં રહેલ દ્વિપદી વડે ભાગવાથી સરળતા રહેશે ?

$$\begin{aligned} 7x^2 + 14x &= (7 \times x \times x) + (2 \times 7 \times x) \\ &= 7 \times x \times (x + 2) \\ &= 7x(x + 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{હવે } (7x^2 + 14x) \div (x + 2) &= \frac{7x^2 + 14x}{x + 2} \\ &= \frac{7x(x + 2)}{(x + 2)} = 7x \end{aligned}$$

[અવયવ  $(x + 2)$ નો છેદ ઉડાડતાં]

**ઉદાહરણ 15 :**  $44(x^4 - 5x^3 - 24x^2)$ ને  $11x(x - 8)$  વડે ભાગો.

**ઉકેલ :**  $44(x^4 - 5x^3 - 24x^2)$ ના અવયવ મેળવતાં;

$$\begin{aligned} 44(x^4 - 5x^3 - 24x^2) &= 2 \times 2 \times 11 \times x^2(x^2 - 5x - 24) \\ &= 2 \times 2 \times 11 \times x^2(x^2 - 8x + 3x - 24) \\ &= 2 \times 2 \times 11 \times x^2[x(x - 8) + 3(x - 8)] \\ &= 2 \times 2 \times 11 \times x^2(x + 3)(x - 8) \end{aligned}$$

તેથી,  $44(x^4 - 5x^3 - 24x^2) \div 11x(x - 8)$

$$\begin{aligned} &= \frac{2 \times 2 \times 11 \times x \times x \times (x + 3) \times (x - 8)}{11 \times x \times (x - 8)} \\ &= 2 \times 2 \times x(x + 3) = 4x(x + 3) \end{aligned}$$

**ઉદાહરણ 16 :**  $z(5z^2 - 80)$ ને  $5z(z + 4)$  વડે ભાગો.

**ઉકેલ :** ભાજ્ય =  $z(5z^2 - 80)$

$$\begin{aligned} &= z[(5 \times z^2) - (5 \times 16)] \\ &= z \times 5 \times (z^2 - 16) \\ &= 5z \times (z + 4)(z - 4) \end{aligned}$$

[ $\because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$  નિત્યસમનો ઉપયોગ કરતાં]

$$\text{આમ, } z(5z^2 - 80) \div 5z(z + 4) = \frac{5z \times (z + 4)(z - 4)}{5z(z + 4)} = (z - 4)$$

અંશ અને છેદ બંનેમાં રહેલ સામાન્ય અવયવો :  
11, x અને  $(x - 8)$ નો છેદ ઉડાડતા

## સ્વાધ્યાય 14.3



### 1. ભાગફળ શોધો.

- (i)  $28x^4 \div 56x$  (ii)  $-36y^3 \div 9y^2$  (iii)  $66pq^2r^3 \div 11qr^2$   
 (iv)  $34x^3y^3z^3 \div 51xy^2z^3$  (v)  $12a^8b^8 \div (-6a^6b^4)$

### 2. આપેલ બહુપદીને એકપદી વડે ભાગો.

- (i)  $(5x^2 - 6x) \div 3x$  (ii)  $(3y^8 - 4y^6 + 5y^4) \div y^4$   
 (iii)  $8(x^3y^2z^2 + x^2y^3z^2 + x^2y^2z^3) \div 4x^2y^2z^2$  (iv)  $(x^3 + 2x^2 + 3x) \div 2x$   
 (v)  $(p^3q^6 - p^6q^3) \div p^3q^3$

### 3. નીચેનો ભાગાકાર કરો.

- (i)  $(10x - 25) \div 5$  (ii)  $(10x - 25) \div (2x - 5)$   
 (iii)  $10y(6y + 21) \div 5(2y + 7)$  (iv)  $9x^2y^2(3z - 24) \div 27xy(z - 8)$   
 (v)  $96abc(3a - 12)(5b - 30) \div 144(a - 4)(b - 6)$

### 4. સૂચવ્યા મુજબ ભાગાકાર કરો.

- (i)  $5(2x + 1)(3x + 5) \div (2x + 1)$  (ii)  $26xy(x + 5)(y - 4) \div 13x(y - 4)$   
 (iii)  $52pqr(p + q)(q + r)(r + p) \div 104pq(q + r)(r + p)$   
 (iv)  $20(y + 4)(y^2 + 5y + 3) \div 5(y + 4)$  (v)  $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) \div x(x + 1)$

### 5. આપેલી પદાવલિના અવયવ મેળવો અને સૂચવ્યા મુજબ ભાગાકાર કરો.

- (i)  $(y^2 + 7y + 10) \div (y + 5)$  (ii)  $(m^2 - 14m - 32) \div (m + 2)$   
 (iii)  $(5p^2 - 25p + 20) \div (p - 1)$  (iv)  $4yz(z^2 + 6z - 16) \div 2y(z + 8)$   
 (v)  $5pq(p^2 - q^2) \div 2p(p + q)$  (vi)  $12xy(9x^2 - 16y^2) \div 4xy(3x + 4y)$   
 (vii)  $39y^3(50y^2 - 98) \div 26y^2(5y + 7)$

## 14.5 શું તમે ભૂલ શોધી શકશો ?

પ્રવૃત્તિ 1 સમીકરણનો ઉકેલ શોધવામાં સરિતા નીચે મુજબ ગણતરી કરે છે.

$$3x + x + 5x = 72$$

તેથી,  $8x = 72$

અને તેથી,  $x = \frac{72}{8} = 9$

અહીં તે ગણતરીમાં ક્યાં ભૂલ કરે છે તે શોધો અને સાચો ઉકેલ મેળવો.

પ્રવૃત્તિ 2 અપ્પુ નીચે મુજબ ગણતરી કરે છે.

$$x = -3 \text{ માટે, } 5x = 5 - 3 = 2$$

શું તેની ગણતરી બરાબર છે ? જો ના, તો સુધારો.

પ્રવૃત્તિ 3 નમ્રતા અને સલમા બૈજિક પદાવલિમાં નીચે મુજબ ગણતરી કરે છે.

નમ્રતા

સલમા

(a)  $3(x - 4) = 3x - 4$   $3(x - 4) = 3x - 12$

મોટેભાગે, પદના સહગુણક તરીકે '1'ને આપણે દર્શાવતા નથી. પણ, સજાતીય પદોના સરવાળા કરીએ ત્યારે '1' ધ્યાને લેવો પડે છે.

જ્યારે ચલની ઋણ (-) કિંમત લેવામાં આવે ત્યારે કૌંસનો ઉપયોગ કરવાનું યાદ રાખો.

જ્યારે કૌંસની અંદર રહેલ પદાવલિને, કૌંસની બહાર આવેલ અચલ (કે ચલ) વડે ગુણવામાં આવે, ત્યારે પદાવલિનાં દરેક પદને અચલ (કે ચલ) વડે ગુણવાનું હોય છે.

(b)  $(2x)^2 = 2x^2$

$(2x)^2 = 4x^2$

(c)  $(2a - 3)(a + 2)$

$(2a - 3)(a + 2)$

$= 2a^2 - 6$

$= 2a^2 + a - 6$

(d)  $(x + 8)^2 = x^2 + 64$

$(x + 8)^2 = x^2 + 16x + 64$

(e)  $(x - 5)^2 = x^2 - 25$

$(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$

શું નમ્રતા અને સલમા દ્વારા કરાયેલ ગણતરી સાચી છે ?

તમારા જવાબ માટે કારણ આપો.

યાદ રાખો કે, જ્યારે તમે એકપદીનો વર્ગ કરો છો, ત્યારે તેના સહગુણક તથા દરેક અવયવનો વર્ગ કરવો પડે.

જ્યારે કોઈ રીત અપનાવો ત્યારે પ્રથમ નક્કી કરો કે આ રીત ખરેખર લાગુ પડી શકે કે નહીં ?

**પ્રવૃત્તિ 4** જોસેફ એક ભાગાકાર નીચે મુજબ કરે છે :  $\frac{a+5}{5} = a + 1$  તેનો મિત્ર શિરીષ આ જ ભાગાકાર

અંશમાં આવેલ બહુપદીને છેદમાં રહેલ એકપદી દ્વારા ભાગવામાં આવે ત્યારે આપણે અંશમાં આવેલ બહુપદીના દરેક પદ સાથે એકપદીનો ભાગાકાર કરવો પડે છે !

નીચે મુજબ કરે છે :  $\frac{a+5}{5} = a$  તેનો બીજો મિત્ર સુમન નીચે મુજબ ગણતરી કરે છે.  $\frac{a+5}{5} = \frac{a}{5} + 1$  કોણે ભાગાકાર સાચો કર્યો છે ? કોણે ભૂલ કરી છે ? શા માટે ?

### ગણિત ગમ્મત !

અતુલ હંમેશા જુદી રીતે વિચાર કરતો વિદ્યાર્થી છે. તે તેના શિક્ષકને પૂછે છે કે, 'જો તમે સમજાવ્યું એ જ સાચું હોય તો પછી મને નીચેની ગણતરી માટે સાચો જવાબ કેમ મળ્યો ?'

$\frac{64}{16} = \frac{64}{16} = \frac{4}{1}$  શિક્ષક : 'તારો ઉત્તર સાચો છે, પરંતુ જો તું  $\frac{64}{16}$  માં 6નો છેદ ઉડાડી

અને  $\frac{4}{1}$  મેળવે તો તે બરાબર ગણતરી નથી. ખરેખર તો, 16 એ 64નો અવયવ છે. 6

એ 64 કે 16 બેમાંથી એકનો પણ અવયવ નથી. તેથી,  $\frac{64}{16} = \frac{16 \times 4}{16 \times 1} = \frac{4}{1}$  થાય.

ઉપરાંત,  $\frac{664}{166} = \frac{4}{1}$ ,  $\frac{6664}{1666} = \frac{4}{1}$  અને એ જ રીતે આગળ...

શું ખરેખર આ રસપ્રદ નથી ? શું તમે અતુલને  $\frac{64}{16}$  જેવાં બીજાં ઉદાહરણ શોધવામાં મદદ કરશો ?

## સ્વાધ્યાય 14.4

નીચેનાં ગાણિતિક વિધાનોમાંથી ભૂલ શોધો અને તેને સુધારો.

1.  $4(x - 5) = 4x - 5$

2.  $x(3x + 2) = 3x^2 + 2$

3.  $2x + 3y = 5xy$

4.  $x + 2x + 3x = 5x$

5.  $5y + 2y + y - 7y = 0$

6.  $3x + 2x = 5x^2$

7.  $(2x)^2 + 4(2x) + 7 = 2x^2 + 8x + 7$

8.  $(2x)^2 + 5x = 4x + 5x = 9x$

9.  $(3x + 2)^2 = 3x + 6x + 4$



10.  $x = -3$  લઈએ તો,  
 (a)  $x^2 + 5x + 4$  એટલે  $(-3)^2 + 5(-3) + 4 = 9 + 2 + 4 = 15$   
 (b)  $x^2 - 5x + 4$  એટલે  $(-3)^2 - 5(-3) + 4 = 9 - 15 + 4 = -2$   
 (c)  $x^2 + 5x$  એટલે  $(-3)^2 + 5(-3) = -9 - 15 = -24$
11.  $(y - 3)^2 = y^2 - 9$       12.  $(z + 5)^2 = z^2 + 25$
13.  $(2a + 3b)(a - b) = 2a^2 - 3b^2$       14.  $(a + 4)(a + 2) = a^2 + 8$
15.  $(a - 4)(a - 2) = a^2 - 8$       16.  $\frac{3x^2}{3x^2} = 0$
17.  $\frac{3x^2+1}{3x^2} = 1 + 1 = 2$       18.  $\frac{3x}{3x+2} = \frac{1}{2}$       19.  $\frac{3}{4x+3} = \frac{1}{4x}$
20.  $\frac{4x+5}{4x} = 5$       21.  $\frac{7x+5}{5} = 7x$

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

- જ્યારે આપણે પદાવલિના અવયવ પાડીએ છીએ ત્યારે આપણે પદાવલિને અવયવોના ગુણાકાર સ્વરૂપે લખીએ છીએ. આ અવયવો સંખ્યા, બૈજિક ચલ કે બૈજિક પદાવલિ હોઈ શકે.
- અવિભાજિત અવયવ એ એવો અવયવ છે જેને ફરીથી અવયવોના ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી શકાતો નથી.
- પદાવલિના અવયવ પાડવાની પદ્ધતિસરની રીત એ સામાન્ય અવયવની રીત છે. તેમાં ત્રણ તબક્કા છે :  
 (i) પદાવલિના દરેક પદને અવિભાજ્ય અવયવના સ્વરૂપે દર્શાવો. (ii) સામાન્ય અવયવોને જુદા તારવો અને (iii) વિભાજનના નિયમની મદદથી દરેક પદના બાકી વધેલ અવયવોને ભેગા કરો.
- કોઈ વખત આપેલી પદાવલિનાં બધાં પદોમાં કોઈપણ અવયવ સામાન્ય હોતો નથી. આવા વખતે આપેલ પદોના એવાં જૂથ બનાવો કે જેથી દરેક જૂથમાં કોઈને કોઈ અવયવ સામાન્ય હોય જ્યારે આપણે આવું કરીએ છીએ ત્યારે દરેક જૂથમાં કોઈ એક સામાન્ય અવયવ મળી આવે છે અને ત્યાર બાદ આપણે પદાવલિના અવયવ મેળવવાની દિશામાં જઈ શકીએ છીએ. આ પદોની પુનઃગોઠવણીની રીત છે.
- પદોની પુનઃગોઠવણી બાદ અવયવીકરણમાં આપણે યાદ રાખીશું કે આપેલ પદાવલિના પદોનાં માત્ર સ્થાન બદલવાથી કે ગમે તે રીતે પદોની ગોઠવણી કરવાથી (અર્થાત્, માત્ર પદોનો ક્રમ બદલવાથી) આપણને પદાવલિના અવયવ મળી શકતા નથી. આપણે પદાવલિના પદોનું અવલોકન કરવું જોઈએ અને ભૂલ અને પ્રયત્ન દ્વારા ઈચ્છિત ગોઠવણી કરવી જોઈએ.
- અનેક પદાવલિઓને (તેના અવયવ મેળવવા માટે) આપણે  $a^2 + 2ab + b^2$ ,  $a^2 - 2ab + b^2$ ,  $a^2 - b^2$  અને  $x^2 + (a + b)x + ab$  સ્વરૂપે ગોઠવી શકીએ છીએ. આવી પદાવલિઓના અવયવ નિત્યસમ I, II, III અને IVની મદદથી (જે પ્રકરણ-9માં આપેલ છે.) સરળતાથી મેળવી શકાય છે.  

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$
- જે પદાવલિના અવયવ  $(x + a)(x + b)$  પ્રકારે મળતા હોય, તેમાં એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે પદાવલિના અંતિમ પદ  $(ab)$ ના એવા અવયવ શોધો કે જેથી તેનો સરવાળો (કે બાદબાકી) કરવાથી મળતી સંખ્યા  $x$ નો સહગુણક બને.  
 (નોંધ : અહીં મળતા અવયવોની નિશાનીમાં પણ કાળજી રાખવી જોઈએ.)
- સંખ્યાના ભાગાકારની ક્રિયા એ ખરેખર ગુણાકારની વ્યસ્ત ક્રિયા છે. આ જ વિચાર (Idea) બૈજિક પદાવલિના ભાગાકાર માટે પણ ઉપયોગી છે.

9. બહુપદીનો એકપદી વડે ભાગાકાર કરવાના કિસ્સામાં આપણે બહુપદીના દરેક પદનો એકપદી સાથે ભાગાકાર કરીએ છીએ અથવા સામાન્ય અવયવ કાઢવાની રીતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
10. બહુપદીનો બહુપદી વડે ભાગાકાર કરવાના કિસ્સામાં, ભાજ્ય પદાવલિ(Dividend Polynomial)ના દરેક પદનો ભાજક પદાવલિ(Divisor Polynomial)ના દરેક પદ સાથે ભાગાકાર કરીએ એ રીત બરાબર નથી.

તેના બદલે બંને પદાવલિનાં અવયવ પાડીને ત્યાર બાદ બંનેનો સામાન્ય અવયવ રદ (Cancel) કરવો જોઈએ.

11. અગાઉના પ્રકરણમાં શીખી ગયા તે મુજબ, બૈજિક પદાવલિનો ભાગાકાર એટલે,

$$\text{ભાજ્ય પદાવલિ} = \text{ભાજક પદાવલિ} \times \text{ભાગફળ}$$

વ્યાપક સ્વરૂપે,

$$\text{ભાજ્ય} = (\text{ભાજક} \times \text{ભાગફળ}) + \text{શેષ}$$

આ પ્રકરણમાં આપણે એવી જ પદાવલિના ભાગાકારની ચર્ચા કરેલ છે જેમાં શેષ શૂન્ય હોય.

12. બૈજિક પદાવલિના કોયડાઓ ઉકેલતી વખતે વિદ્યાર્થીઓ ઘણી સામાન્ય ભૂલો કરતાં હોય છે. તેને તમારે આવી ભૂલો કરતાં ટાળવા જોઈએ.







## આલેખનો પરિચય

પ્રકરણ

15


### 15.1 પ્રાસ્તાવિક

શું તમે સમાચારપત્રો, ટેલિવિઝન, સામયિકો, પુસ્તકો વગેરેમાં આલેખો જોયા છે ? આંકડાકીય તથ્યોને દૃશ્ય સ્વરૂપે રજૂ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી આલેખ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આલેખના ઉપયોગથી આંકડાકીય માહિતી ઝડપથી, સરળતાથી અને સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય છે. આમ, આલેખ એ પ્રાપ્ત થયેલ માહિતીની દૃશ્ય રજૂઆત છે. માહિતીને કોષ્ટક સ્વરૂપે પણ દર્શાવી શકાય છે. આમ છતાં, આલેખ દ્વારા રજૂ થતી માહિતી વધુ સરળતાથી સમજી શકાય છે. જ્યારે પ્રાપ્ત માહિતી કોઈ ચલના સાપેક્ષમાં વધે કે ઘટે (દા.ત. બજારમાં તેજી છે કે મંદી) તે જાણવા કે પછી બે માહિતી અથવા તો કોઈ એક માહિતીને તેની ભૂતકાળની માહિતી સાથે સરખાવવા માટે તો આલેખ ખરેખર ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કેટલાક પ્રકારના આલેખ આપણે અગાઉ શીખી ચૂક્યા છીએ. ચાલો ઝડપથી તેને યાદ કરી લઈએ.

#### 15.1.1 લંબ આલેખ (દંડ આલેખ)


લંબ આલેખ (Bar graph) નો મુખ્ય ઉપયોગ માહિતીના કેટલાંક વિભાગો વચ્ચે તુલના કરવામાં થાય છે. લંબ આલેખને આડી અથવા ઊભી સમાંતર લીટીઓ દ્વારા દર્શાવાય છે. જોવામાં સરળતા રહે તે માટે સ્તંભ સ્વરૂપે પણ દોરી શકાય છે. (અહીં એ નોંધીએ કે આ સ્તંભને જાડાઈ સાથે કોઈ સંબંધ નથી માત્ર ઊંચાઈને જ ધ્યાનમાં લેવાની છે. એટલે કે લંબ આલેખ એક જ પરિમાણ ધરાવે છે.)

આકૃતિ 15.1માં ગણિત વિષયની ત્રણ સત્રાંત પરીક્ષામાં અનુએ મેળવેલ ગુણના લંબ આલેખ છે. આ આલેખ દ્વારા તમે અનુના પરીક્ષામાં દેખાવની સરખામણી સરળતાથી કરી શકો છો.



આકૃતિ 15.1


આકૃતિ 15.2માં દર્શાવ્યા મુજબ લંબ આલેખમાં લંબ / સ્તંભ જોડીમાં પણ હોઈ શકે છે. આ આલેખ આપણને બે દિવસના ગાળામાં જુદા જુદા ફળોના થયેલ વેચાણની તુલનાત્મક માહિતી રજૂ કરે છે. આમ, આકૃતિ 15.2 એ આકૃતિ 15.1થી કઈ રીતે જુદી પડે છે ? એ બાબતે તમારા મિત્ર સાથે ચર્ચા કરો.



આકૃતિ 15.2

### 15.1.2 વૃત આલેખ (વર્તુળ આલેખ)

કોઈ સમગ્ર માહિતીના સાપેક્ષે તેના કોઈ એક અંશ કે પછી એક અંશની બીજા અંશ સાથે સરખામણી કરવા માટે વૃત આલેખ (Circle-graph / Pie graph) વપરાય છે. આકૃતિ 15.3માં વૃત આલેખ (વર્તુળ આલેખ) દર્શાવેલો છે. તેમાં ટેલિવિઝનની જુદી-જુદી ચેનલ જોનાર લોકોની માહિતી ટકામાં દર્શાવેલ છે.




આકૃતિ 15.3

### 15.1.3 સ્તંભ આલેખ

આપેલ સતત માહિતીને જ્યારે વર્ગ સ્વરૂપે આપવામાં આવેલ હોય ત્યારે તેના લંબ આલેખને સ્તંભઆલેખ (Histogram) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં સ્તંભની જાડાઈ ધ્યાને લેવામાં આવે છે. (સ્તંભ આલેખ દ્વિ-પરિમાણીય છે : ઊંચાઈ અને જાડાઈ) તેના સ્તંભો સમગ્ર વિસ્તારમાં એકબીજાને લગોલગ આવેલા હોય છે.

આકૃતિ 15.4માં વસાહતના 40 લોકોનાં વજનનું આવૃત્તિ વિતરણ સ્તંભ આલેખ (હિસ્ટોગ્રામ) દ્વારા દર્શાવેલ છે.

વજન (કિગ્રામાં)	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65
વ્યક્તિની સંખ્યા	4	12	13	6	5



આકૃતિ 15.4માં X અક્ષ પર દર્શાવેલ (~~~~) ઊંચી નીચી રેખા બતાવે છે કે 0 થી 40 વચ્ચેની સંખ્યા આપણે આલેખમાં બતાવેલ નથી.

અહીં આલેખમાં સ્તંભ વચ્ચે જગ્યા નથી કારણ કે માહિતીમાં આપેલાં વર્ગો વચ્ચે જગ્યા નથી, માહિતી સળંગ છે. આ સ્તંભ આલેખ દ્વારા તમને શું માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે ? તેની યાદી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો.

### 15.1.4 રેખીય આલેખ


નિશ્ચિત સમયગાળામાં સમય સાથે માહિતીમાં થતો સતત ફેરફાર દર્શાવવા રેખીય આલેખ (Line Graph) વપરાય છે.



જ્યારે રેણુ બિમાર હતી ત્યારે ડોક્ટરે દર ચાર કલાકે તેણીના શરીરનું તાપમાન નોંધેલ. આ માહિતી આલેખ સ્વરૂપે રજૂ કરેલ હતી. (જે આકૃતિ 15.5 અને આકૃતિ 15.6માં બતાવેલ છે.) આપણે આ આલેખને “સમય વિરુદ્ધ તાપમાનનો આલેખ” કહી શકીએ. આકૃતિ 15.5 અને આકૃતિ 15.6 એ નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલ માહિતીની ચિત્રાત્મક રજૂઆત છે.


સમય	6 a.m.	10 a.m.	2 p.m.	6 p.m.
તાપમાન (°C)	37	40	38	35

આલેખમાં આડી રેખાને સામાન્ય રીતે X અક્ષ કહે છે. જ્યારે તાપમાન લેવામાં આવેલ હતું તે સમય X અક્ષ પર બતાવેલ છે. વળી, આલેખમાં ઊભી રેખાને સામાન્ય રીતે Y અક્ષ કહે છે. અહીં Y અક્ષ પર શાનું માપ લેવામાં આવેલ છે ?



આકૃતિ 15.5

આપેલ માહિતીના દરેક જોડકાને આલેખ પર બિંદુ દ્વારા દર્શાવેલ છે.



આકૃતિ 15.6

માહિતીનાં જોડકાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત બિંદુઓને રેખાખંડથી જોડતા પરિણામ સ્વરૂપે રેખીય આલેખ પ્રાપ્ત થાય છે.

આલેખ તમને શું-શું કહે છે ? અહીં આલેખમાં આપણે તાપમાનમાં થતો ફેરફાર જોઈ શકીએ છીએ. આકૃતિ 15.5 પરથી આપણે કહી શકીએ કે 10 a.m. વાગ્યે મહત્તમ તાપમાન હતું અને પછી 6 p.m. સુધી તાપમાનમાં સતત ઘટાડો થતો રહેલ. અહીં આપણે નોંધી શકીએ કે 6 a.m. થી 10 a.m.ના સમયગાળામાં તાપમાનમાં  $3^{\circ}\text{C}$  ( $40^{\circ}\text{C} - 37^{\circ}\text{C}$ ) જેટલો વધારો થયેલ.

અહીં 8 a.m. વાગ્યે તાપમાનની કોઈ નોંધ કરવામાં આવેલ ન હતી. છતાં તમે આલેખના આધારે કહી શકશો કે ત્યારે તાપમાન  $37^{\circ}\text{C}$  થી વધારે હતું. (કેવી રીતે ? વિચારો.)

**ઉદાહરણ 1 :** (“દેખાવ અથવા પ્રદર્શન” આધારિત આલેખ)


આકૃતિ 15.7માં આપેલા બે આલેખ વર્ષ 2007માં જુદી-જુદી દસ મેચ દરમિયાન બે બલ્લેબાજ (બેટ્સમેન) A અને Bએ બનાવેલા રન દર્શાવે છે. આલેખનો અભ્યાસ કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

- બંને અક્ષ પર શું માહિતી આપેલ છે ?
- કઈ રેખા બેટ્સમેન Aના રનનો સ્કોર બતાવે છે ?
- વર્ષ 2007માં કઈ મેચમાં બંને બેટ્સમેને સરખા રનનો સ્કોર કર્યો હતો ?
- બંને બેટ્સમેનમાંથી કોણ વિશ્વાસપાત્ર છે ? (શા માટે તમે આમ નિર્ણય કર્યો ?)

**ઉકેલ :**

- વર્ષ 2007 દરમિયાન રમાયેલ મેચ X અક્ષ પર દર્શાવેલ છે. Y અક્ષ પર દરેક મેચમાં બંને ખેલાડીએ બનાવેલા કુલ રન દર્શાવેલ છે.
- બેટ્સમેન A દ્વારા બનાવવામાં આવેલ રનના આલેખને તૂટક રેખા વડે દર્શાવેલ છે. (આ બાબત આલેખની ઉપરની બાજુએ પહેલેથી જ દર્શાવેલ છે.)


- (iii) ચોથી મેચ દરમિયાન બંને બેટ્સમેને સમાન રન (60 રન) બનાવેલ છે. (બંને આલેખ આ બિંદુ પર ભેગા થતાં હોવાથી આપણે આમ કહી શકીએ.)
- (iv) બેટ્સમેન Aએ એક મેચમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે. પણ ઓછા રનના ખાડા પણ આલેખમાં જોવા મળે છે. બેટ્સમેન Aની રમતમાં સાતત્ય નથી. જ્યારે બીજી તરફ બેટ્સમેન B એ કોઈ મેચમાં 40 થી ઓછા રન કર્યા નથી. આમ છતાં તેનો મહત્તમ સ્કોર 100 રન છે. જે બેટ્સમેન Aના 115 રન કરતાં ઓછા છે. ઉપરાંત ખેલાડી A બે મેચમાં શૂન્ય રન સાથે આઉટ થયેલ છે અને પાંચ મેચમાં 40 થી ઓછો સ્કોર કરેલ છે. તેને કારણે ખેલાડી Aના આલેખમાં ઘણા મોટા ઉતાર-ચઢાવ છે તેના સાપેક્ષે ખેલાડી Bની રમતમાં વધુ સાતત્ય હોવાથી તે વધુ વિશ્વાસપાત્ર બેટ્સમેન છે.



**ઉદાહરણ 2 :**

એક કાર શહેર P થી શહેર Q તરફ યાત્રા કરે છે. બંને શહેર વચ્ચેનું અંતર 350 કિલોમીટર છે. આકૃતિ 15.8માં આપેલ આલેખમાં જુદા-જુદા સમયે કાર અને શહેર P વચ્ચેનું અંતર આપેલ છે. આ આલેખનો અભ્યાસ કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

- (i) બંને અક્ષો પર કઈ માહિતી આપેલ છે ?
- (ii) કારની યાત્રા ક્યારે અને ક્યાંથી શરુ થઈ ?
- (iii) પ્રથમ એક કલાકમાં કાર કેટલી દૂર ગઈ ?
- (iv) બે કલાક બાદ અને ત્રણ કલાક બાદ કાર કેટલે દૂર પહોંચી હતી ?
- (v) શું પ્રથમ ત્રણ કલાકની ઝડપ સરખી રહી હતી ? આ તમે કેમ જાણ્યું ?
- (vi) શું કાર કેટલાક સમય માટે કોઈ સ્થળે ઊભી રહેલ ? તમારા જવાબનો તર્ક રજુ કરો.
- (vii) કાર ક્યારે શહેર Q પહોંચશે ?






ઉકેલ :

- (i)  $x$  અક્ષ પર સમય દર્શાવેલ છે.  $y$  અક્ષ પર શહેર Pથી કારનું અંતર દર્શાવેલ છે.
- (ii) કાર શહેર Pથી યાત્રાની શરૂઆત સવારે 8 વાગ્યે કરે છે.
- (iii) પ્રથમ ક્લાક દરમિયાન કારે 50 કિલોમીટરનું અંતર કાપેલું હતું. [આ બાબત આ મુજબ સમજી શકાય. સવારે 8 વાગ્યે શહેર Pથી યાત્રા શરૂ કરી હતી અને સવારે 9 વાગ્યે તે 50 કિમી પર પહોંચેલ હતી (આલેખમાં આ બાબત જુઓ). તેથી કહી શકાય કે પ્રથમ ક્લાક દરમિયાન એટલે કે 8 a.m. અને 9 a.m.ની વચ્ચે કાર દ્વારા 50 કિમીની યાત્રા થઈ હતી.]
- (iv) કાર દ્વારા કપાયેલ અંતર
  - (a) બીજા ક્લાકે (એટલે કે 9 a.m થી 10 a.m. દરમિયાન) 100 કિમી (150-50)
  - (b) ત્રીજા ક્લાકે (એટલે કે 10 a.m.થી 11 a.m. દરમિયાન) 50 કિમી (200-150)
- (v) પ્રશ્ન (iii) અને (iv)ના જવાબના આધારે આપણે કહી શકીએ કે કારની ઝડપ સમગ્ર સમય દરમિયાન સરખી રહી ન હતી (આલેખ એ પણ બતાવે છે કે ઝડપ કઈ રીતે બદલી).
- (vi) આલેખમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કાર સવારે 11 વાગ્યે અને 12 વાગ્યે પણ P શહેરથી 200 કિમી દૂર જ હતી. આ સમય દરમિયાન કાર દ્વારા કપાયેલ અંતર આલેખની અંદર સમક્ષિતિજ રેખા દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે. આ બાબત પણ એ પુષ્ટિ કરે છે કે આ સમય દરમિયાન કારે યાત્રા કરેલ નથી, કાર ઊભી રહેલ હતી.
- (vii) બપોરે 2:00 વાગ્યે કાર Q શહેર પર પહોંચી હશે.




## સ્વાધ્યાય 15.1


1. નીચે આપેલ આલેખ હોસ્પિટલમાં એક દર્દીનું દર ક્લાકે લીધેલ તાપમાન દર્શાવે છે. તેના પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :
  - (a) બપોરે 1 વાગ્યે દર્દીના શરીરનું તાપમાન શું હતું ?
  - (b) દર્દીના શરીરનું તાપમાન  $38.5^{\circ}\text{C}$  ક્યારે હતું ?




- (c) આ સમગ્ર સમય દરમિયાન દર્દીનું તાપમાન બે વખત સરખું રહ્યું હતું. આ બન્ને સમય કયા હતા ?
- (d) બપોરના 1:30 વાગ્યે દર્દીનું તાપમાન શું હતું ? આ તારણ પર તમે કઈ રીતે પહોંચ્યા ?
- (e) સમયના કયા ગાળામાં દર્દીનું તાપમાન વધી રહ્યાનું જણાતું હતું ?
2. નીચે આપેલા રેખીય આલેખમાં એક ઉત્પાદક કંપનીએ જુદા-જુદા વર્ષમાં કરેલ વેચાણ દર્શાવેલ છે. તે પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો :
- (a) (i) વર્ષ 2002 અને (ii) વર્ષ 2006માં કેટલું વેચાણ થયું હતું ?
- (b) (i) વર્ષ 2003 અને (ii) વર્ષ 2005માં કેટલું વેચાણ થયું હતું ?
- (c) વર્ષ 2002 અને વર્ષ 2006નાં વેચાણ વચ્ચે કેટલો તફાવત હતો ?
- (d) કયા વર્ષના વેચાણનો તફાવત તેના અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં મહત્તમ હતો ?



3. વનસ્પતિશાસ્ત્રના એક પ્રયોગમાં બે છોડ A અને Bને પ્રયોગશાળાની સમાન પરિસ્થિતિમાં ઉછેરવામાં આવ્યા. તેમની ઊંચાઈને અઠવાડિયાના અંતે માપવામાં આવતી હતી. આમ, ત્રણ અઠવાડિયા સુધી પ્રયોગ કરવામાં આવેલો. પ્રયોગના પરિણામને આલેખમાં દર્શાવેલ છે.



- (a) (i) 2 સપ્તાહ પછી (ii) 3 સપ્તાહ પછી છોડ Aની ઊંચાઈ કેટલી હતી ?  
 (b) (i) 2 સપ્તાહ પછી (ii) 3 સપ્તાહ પછી છોડ Bની ઊંચાઈ કેટલી હતી ?  
 (c) ત્રીજા સપ્તાહ દરમિયાન છોડ Aની ઊંચાઈ કેટલી વધી ?  
 (d) બીજા સપ્તાહના અંતથી ત્રીજા સપ્તાહના અંત સુધીમાં છોડ Bની ઊંચાઈ કેટલી વધી ?  
 (e) કયા સપ્તાહમાં છોડ Aની ઊંચાઈ સૌથી વધુ વધી ?  
 (f) કયા સપ્તાહમાં છોડ Bની ઊંચાઈ સૌથી ઓછી વધી ?  
 (g) શું કોઈ એક સપ્તાહમાં બન્ને છોડની ઊંચાઈ સરખી હતી ? સ્પષ્ટ કરો.
4. નીચે આપેલા આલેખમાં કોઈ એક સપ્તાહના દરેક દિવસ માટે પૂર્વાનુમાન કરેલ તાપમાન અને વાસ્તવિક તાપમાન દર્શાવેલ છે.
- (a) કયા દિવસે પૂર્વાનુમાન કરેલ તાપમાન અને વાસ્તવિક તાપમાન સમાન હતા ?  
 (b) સપ્તાહ દરમિયાન પૂર્વાનુમાન કરેલ મહત્તમ તાપમાન કેટલું હતું ?  
 (c) સપ્તાહ દરમિયાન લઘુત્તમ વાસ્તવિક તાપમાન કેટલું હતું ?  
 (d) કયા દિવસે વાસ્તવિક તાપમાન અને પૂર્વાનુમાન કરેલ તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત સૌથી વધુ હતો ?




5. નીચેના કોષ્ટકના આધારે રૈષિક આલેખ દોરો :
- (a) જુદા-જુદા વર્ષોમાં કોઈ પર્વતીય શહેરમાં કેટલા દિવસો માટે હિમવર્ષા થયેલ તે અત્રે દર્શાવેલ છે.

વર્ષ	2003	2004	2005	2006
દિવસોની સંખ્યા	8	10	5	12


- (b) એક ગામની અંદર જુદા-જુદા વર્ષમાં પુરુષ અને સ્ત્રીની વસ્તી (હજારમાં) આ મુજબ છે :

વર્ષ	2003	2004	2005	2006	2007
પુરુષોની સંખ્યા	12	12.5	13	13.2	13.5
સ્ત્રીઓની સંખ્યા	11.3	11.9	13	13.6	12.8

6. એક ટપાલી કોઈ નગરથી તે જ નગરના એક ઉપનગરમાં એક વેપારીને પાર્સલ પહોંચાડવા સાયકલ લઈને જાય છે. જુદા-જુદા સમયે નગરથી તેનું અંતર નીચેના આલેખમાં દર્શાવેલ છે.
- $x$  અક્ષ પર સમય દર્શાવવા માટે શું પ્રમાણમાપ લેવામાં આવ્યું છે ?
  - ટપાલીએ આ મુસાફરી માટે કેટલો સમય લીધો ?
  - નગરથી વેપારીનું સ્થળ કેટલું દૂર છે ?
  - શું ટપાલી તેના માર્ગમાં ક્યાંક થોભ્યો હતો ? વિગતે સમજાવો.
  - કયા સમયગાળામાં તેણે સૌથી ઝડપી સવારી કરી ?




7. નીચે આપેલા આલેખોમાંથી કયા આલેખો સમય અને તાપમાન માટે શક્ય (સંભવ) છે. તમારો જવાબ સમજાવો.



## 15.2 સુરેખ આલેખ

રેખીય આલેખ કેટલાક રેખાખંડોને પરસ્પર જોડીને બનાવવામાં આવે છે. ક્યારેક આ આલેખ એક પૂરી અખંડિત રેખા સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે છે. આવા આલેખને સુરેખ આલેખ (Linear Graph) કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના આલેખ દોરવા માટે આલેખપત્ર પર કેટલાક બિંદુઓ દર્શાવવાની જરૂર પડે છે. હવે આપણે આલેખપત્ર પર સરળતાથી બિંદુઓ કઈ રીતે અંકિત કરી શકાય તે શીખીશું.



### 15.2.1 બિંદુની સ્થિતિ


શિક્ષિકાએ બ્લેકબોર્ડ પર એક બિંદુ (Point) અંકિત કર્યું. પછી તેઓએ વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું કે તેઓ આ બિંદુના સ્થાનને કઈ રીતે વર્ણવી શકે ? ત્યારે તેઓને કેટલાક જવાબ પ્રાપ્ત થયા.



### આકૃતિ 15.9


શું આમાંનું કોઈ પણ એક વિધાન આપણને બિંદુનું સ્થાન સુનિશ્ચિત (નક્કી) કરવામાં મદદરૂપ થશે ? ના. શા માટે નહીં ? આ બાબતે વિચારો.

ત્યારે જહોને એક સુઝાવ આપ્યો. તેણે બ્લેકબોર્ડની ડાબી બાજુની ધારથી બિંદુનું અંતર માપ્યું અને કહ્યું, “આ બિંદુ બ્લેકબોર્ડની ડાબી બાજુની ધારથી 90 સેમી દૂર આવેલું છે.” શું તેણે ખરેખર ઉપયોગી સુઝાવ આપ્યો તેમ તમે વિચારો છો ?



### આકૃતિ 15.10

$A, A_1, A_2$  અને  $A_3$  એ બધા બિંદુઓ બોર્ડની ડાબી ધારથી 90 સેમી દૂર આવેલા છે.



### આકૃતિ 15.11

બિંદુ  $A$  એ બ્લેકબોર્ડની ડાબી ધારથી 90 સેમી અને નીચેની ધારથી 160 સેમી અંતરે આવેલ છે.



ત્યારે રેખા સુધારેલા વિધાન સાથે ઊભી થઈ અને કહ્યું, “આ બિંદુ બ્લેકબોર્ડની ડાબી ધારથી 90 સેમી અને નીચેની ધારથી 160 સેમી દૂરની સ્થિતિ પર આવેલ છે.” આમ, સમસ્યાનો પૂરેપૂરો ઉકેલ પ્રાપ્ત થયો (આકૃતિ 15.11). હવે શિક્ષિકાએ જણાવ્યું, “આ બિંદુનું સ્થાન આપણે (90, 160) લખીને દર્શાવી શકીએ.” શું બિંદુ (160, 90) એ બિંદુ (90, 160) થી ભિન્ન હશે ? આ બાબતે વિચારો.

સત્તરમી સદીમાં ગણિતશાસ્ત્રી રેને દેકાર્ટ(Rene Descartes) એ એક કીડીને છતના એક ખૂણા પાસેથી ચાલતી જોઈ અને તેમણે કોઈ પણ સમતલમાં બિંદુનું સ્થાન સુનિશ્ચિત કરવા માટેની પદ્ધતિ વિકસાવવાની શરૂઆત કરી હતી તેવું માનવામાં આવે છે. તેથી જ તેમની યાદમાં આડી અને ઊભી રેખાથી પ્રાપ્ત બે માપની મદદથી કોઈ એક બિંદુનું સ્થાન સુનિશ્ચિત કરવાની પદ્ધતિને કાર્ટેઝિયન પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.



રેને દેકાર્ટ  
(1596-1650)


### 15.2.2 નિર્દેશાંક

ધારો કે તમે એક થિયેટરમાં જાઓ છો અને ટિકિટ પર દર્શાવેલ નિયત જગ્યા તમે શોધો છો. તેના માટે તમારે બે સંખ્યાની જરૂર પડશે : હરોળ નંબર અને સીટ નંબર. કોઈ એક બિંદુને સમતલમાં સુનિશ્ચિત કરવા માટેની આ આધારભૂત પદ્ધતિ છે.



આકૃતિ 15.12માં જુઓ કે બિંદુ (3, 4)ને આલેખપત્રની ડાબી ધારથી 3 એકમ અને નીચેની ધારથી 4 એકમ દૂર કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે. આલેખપત્ર ચોરસ જાળી સ્વરૂપે હોય છે, જેથી આ સમાન ચોરસ આપણને માપનમાં ઉપયોગી થાય. આલેખપત્ર ઉપર આપણે સૌપ્રથમ આપણી જરૂરિયાત અને અનુકૂળતા મુજબ x અક્ષ અને y અક્ષ દર્શાવીએ છીએ અને પછી તેના પર બિંદુનું સ્થાન સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ. આકૃતિ 15.12માં 3ને આપેલ બિંદુનો x નિર્દેશાંક તથા 4ને y નિર્દેશાંક (Coordinates) કહેવામાં આવે છે. (ઘણી વખત x નિર્દેશાંકને સ્થાને x યામ અને y નિર્દેશાંકને સ્થાને y યામ જેવો શબ્દ પ્રયોગ પણ થાય છે.) તેથી આપણે (3, 4)ને આપેલ બિંદુના નિર્દેશાંક કહીએ છીએ. ઊભા યામને y યામ અને આડા યામને x યામ કહેવામાં આવે છે. નિર્દેશાંક (3, 4) બતાવે છે કે ઉદ્ગમ બિંદુથી કેટલાં એકમ જમણી બાજુ જવાનું છે અને કેટલાં એકમ ઉપર જવાનું છે.


ઊભી રેખા (y અક્ષ)



આકૃતિ 15.12

**ઉદાહરણ 3 :** બિંદુ (4, 3)ને આલેખ પર અંકિત કરો. શું બિંદુ (4, 3) અને બિંદુ (3, 4) બંને એક જ બિંદુ છે ?


**ઉકેલ :** સૌ પ્રથમ x અક્ષ અને y અક્ષ દર્શાવો. (જે ખરેખર સંખ્યારેખા જ છે.) હવે ઉદ્ભવબિંદુ O(0, 0)થી શરૂ કરો. 4 એકમ જમણી બાજુ ખસો. પછી 3 એકમ ઉપર તરફ જતાં તમે બિંદુ (4, 3) પર પહોંચી જશો. આકૃતિ 15.13 પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બિંદુ (3, 4) અને બિંદુ (4, 3) બંને અલગ બિંદુ છે.



આકૃતિ 15.13

**ઉદાહરણ 4 :** નીચે આપેલા નિર્દેશાંકને અનુરૂપ અક્ષર આકૃતિ 15.14માંથી પસંદ કરો.

- (i) (2, 1)                      (ii) (0, 5)
- (iii) (2, 0)                    (iv) બિંદુ Aના નિર્દેશાંક લખો.
- (v) બિંદુ Fના નિર્દેશાંક લખો.



આકૃતિ 15.14


ઉકેલ :

- (i) બિંદુ E એ (2, 1) છે (બિંદુ D એ (2, 1) નથી !).
- (ii) બિંદુ B એ (0, 5) છે (શા માટે ? તમારા મિત્ર સાથે ચર્ચા કરો).
- (iii) બિંદુ G એ (2, 0) છે.
- (iv) બિંદુ Aના નિર્દેશાંક (4, 5) છે.
- (v) બિંદુ Fના નિર્દેશાંક (5.5, 0) છે.

**ઉદાહરણ 5 :** નીચે આપેલાં બિંદુઓને આલેખપત્ર પર અંકિત કરો અને ખાતરી કરી જુઓ કે તેઓ બધાં એક જ રેખા પર આવેલાં છે ? જો તેઓ એક જ રેખા પર રહેલાં હોય તો તે રેખાનું નામ આપો.


- (i) (0, 2) (0, 5), (0, 6), (0, 3.5)
- (ii) A (1, 1), B (1, 2), C (1, 3), D (1, 4)
- (iii) K (1, 3), L (2, 3), M (3, 3), N (4, 3)
- (iv) W (2, 6), X (3, 5), Y (5, 3), Z (6, 2)

ઉકેલ :




(i)

આ બધા બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલાં છે, જે  $y$  અક્ષ છે.



(ii)


આ બધા બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલાં છે. તે રેખા AD છે. (તમે આ રેખાનું નામકરણ બીજી રીતે પણ કરી શકો) આ રેખા  $y$  અક્ષને સમાંતર છે.



(iii)

આ બધા બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલાં છે. આપણે તેને રેખા KL અથવા રેખા KM અથવા રેખા MN વગેરેથી ઓળખી શકીએ. તે  $x$  અક્ષને સમાંતર છે.

આકૃતિ 15.5



(iv)


આ બધા બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલાં છે. આપણે તેને રેખા XY અથવા WY અથવા YZ વગેરેથી નામાંકિત કરી શકીએ.

અહીં એ નોંધો કે, ઉપરોક્ત તમામ કિસ્સામાં આપેલ બિંદુઓને આલેખપત્ર પર દર્શાવીને તેમને જોડતા એક સીધી રેખા સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારના આલેખને રેખિક આલેખ કહેવામાં આવે છે.

## સ્વાધ્યાય 15.2



- નીચેના બિંદુઓને આલેખપત્ર પર અંકિત કરો અને ચકાસણી કરો કે તે બધા એક જ રેખા પર આવેલા છે ?  
 (a) A (4, 0), B (4, 2), C (4, 6), D (4, 2.5)  
 (b) P (1, 1), Q (2, 2), R (3, 3), S (4, 4)  
 (c) K (2, 3), L (5, 3), M (5, 5), N (2, 5)
- બિંદુઓ (2, 3) અને (3, 2)માંથી પસાર થતી રેખા દોરો. આ રેખા x અક્ષ અને y અક્ષને જે બિંદુમાં છેદે તે બિંદુના નિર્દેશાંક દર્શાવો.
- આલેખમાં દર્શાવેલ દરેક આકૃતિઓના શિરોબિંદુનાં નિર્દેશાંક લખો.
- નીચે આપેલાં વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.  
 ખોટાં વિધાનો સુધારીને લખો.  
 (i) જે બિંદુનો x નિર્દેશાંક શૂન્ય હોય અને y નિર્દેશાંક શૂન્યેતર હોય તે બિંદુ y અક્ષ પર આવેલ હોય છે.  
 (ii) જે બિંદુનો y નિર્દેશાંક શૂન્ય હોય અને x નિર્દેશાંક 5 હોય તે બિંદુ y અક્ષ પર આવેલ હોય છે.  
 (iii) ઉદ્ગમબિંદુના નિર્દેશાંક (0, 0) હોય છે.



## 15.3 આલેખના કેટલાક ઉપયોગ

દૈનિક જીવનમાં તમે કદાચ જોયું હશે કે સુવિધાઓનો તમે જેટલો વધારે ઉપયોગ કરો છો તેની કિંમત પણ તમારે વધારે ચૂકવવી પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે તમે જો વીજળીનો વધુ ઉપયોગ કરશો તો વીજળીનું બિલ પણ વધારે જ ચૂકવવું પડશે અને જો તમે વીજળી ઓછી વાપરશો તો વીજળીનો ખર્ચ પણ ઘણો ઓછો આવશે. અહીં આ ઉદાહરણમાં તમે જોઈ શકો છો કે એક રાશિ બીજી રાશિને અસર કરે છે. વીજળીના બિલની રકમને વીજળીના વપરાશનો જથ્થો અસર કરે છે. અહીં આપણે કહી શકીએ કે વીજળીનો જથ્થો એ એક સ્વતંત્ર ચલ છે (અથવા કેટલીક વખત અંકુશિત ચલ છે) અને વીજળીનાં બિલની રકમ પરતંત્ર ચલ છે. આવા ચલો વચ્ચેનો સંબંધ આપણે આલેખ દ્વારા દર્શાવી શકીએ.

## વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

એક કારની પેટ્રોલની ટાંકી ભરવા માટે તમારે કેટલી રકમ ચૂકવવી પડશે ? તેનો આધાર તમે કેટલાં લિટર પેટ્રોલ ખરીદો છો તેના પર રહેલો છે. જે અહીં સ્વતંત્ર ચલ છે. આ બાબતે વિચારો.



### ઉદાહરણ 6 : (માત્રા અને મૂલ્ય)

નીચેના કોષ્ટકમાં પેટ્રોલની માત્રા અને તેની કિંમત આપવામાં આવી છે :


પેટ્રોલની માત્રા (લિટરમાં)	10	15	20	25
પેટ્રોલનું મૂલ્ય (રૂપિયામાં)	500	750	1000	1250

આ આંકડાઓ દર્શાવવા આલેખ દોરો.



ઉકેલ :

(i) આકૃતિ 15.16માં દર્શાવ્યા મુજબ સૌ પ્રથમ આપણે અનુકૂળતા મુજબ પ્રમાણમાપ લઈશું.



આકૃતિ 15.16

- (ii) સમક્ષિતિજ અક્ષ ( $x$  અક્ષ) પર પેટ્રોલની માત્રા દર્શાવીશું.
- (iii)  $y$  અક્ષ પર પેટ્રોલની કિંમત દર્શાવીશું.
- (iv) બિંદુઓ (10, 500), (15, 750), (20, 1000) અને (25, 1250)ને આલેખ પર અંકિત કરો.
- (v) અંકિત કરેલા આ બિંદુઓને જોડો.

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ આલેખ રેખા સ્વરૂપે છે. (તે એક રૈખિક આલેખ છે.) આ આલેખ ઉદ્ગમબિંદુમાંથી શા માટે પસાર થાય છે ? આ બાબતે વિચારો.

આ આલેખ આપણને કેટલીક બાબતો(તથ્યો)નાં અનુમાન કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. ધારો કે આપણે 12 લિટર પેટ્રોલ ખરીદવા માટે કેટલી રકમ જોઈશે તે જાણવા ઈચ્છીએ છીએ. આ માટે આપણે  $x$  અક્ષ પર 12 લિટર પાસેથી ઉર્ધ્વ દિશામાં જઈશું જેથી આલેખ પરના P બિંદુ પર પહોંચીશું. ત્યાંથી  $y$  અક્ષ તરફ સમક્ષિતિજ (સીધી) દિશામાં જતા આપણે  $y$  અક્ષ પર પહોંચીશું, જ્યાં ₹ 600 મૂલ્ય દર્શાવે છે. આથી આપણે આ રીતે આલેખનો ઉપયોગ કરીને 12 લિટર પેટ્રોલ માટે આપણે ₹ 600 ચૂકવવા પડ્યા હશે તેનું અનુમાન કરી શકીએ છીએ.

આ આલેખ એક એવી પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે જેમાં બે માત્રા એકબીજાને સમયલનમાં છે. (કઈ રીતે ? વિચારો) આવી પરિસ્થિતિમાં આલેખ હંમેશાં રૈખિક હોય છે.

### પ્રયત્ન કરો

ઉપરનાં ઉદાહરણનાં આલેખનો ઉપયોગ કરીને જણાવો કે ₹ 800માં કેટલી માત્રામાં પેટ્રોલ ખરીદી શકાય ?



**ઉદાહરણ 7 : (મુદ્દલ અને સાદું વ્યાજ)**

એક બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને તેમનાં રોકાણ પર 10% સાદું વ્યાજ આપે છે. જમા કરાવેલ મુદ્દલ અને તેના પર પ્રાપ્ત થનાર સાદા વ્યાજના સંબંધને દર્શાવવા એક આલેખ દોરો. પ્રાપ્ત આલેખના આધારે નીચેની બાબતો શોધો.

- (a) ₹ 250નાં રોકાણ પર પ્રાપ્ત થનાર વાર્ષિક વ્યાજ શોધો.
- (b) ₹ 70 વાર્ષિક સાદું વ્યાજ મેળવવા માટે કેટલી મુદ્દલનું રોકાણ કરવું પડશે ?

**ઉકેલ :**

જમા રાશિ	એક વર્ષ માટે સાદું વ્યાજ
₹ 100	₹ $\frac{100 \times 1 \times 10}{100} = ₹ 10$
₹ 200	₹ $\frac{200 \times 1 \times 10}{100} = ₹ 20$
₹ 300	₹ $\frac{300 \times 1 \times 10}{100} = ₹ 30$
₹ 500	₹ $\frac{500 \times 1 \times 10}{100} = ₹ 50$
₹ 1000	₹ 100

**આલેખ દોરવા માટેનાં પગલાં :**

1. અંકિત કરવાની થતી જમા રાશિ માટે સાદા વ્યાજની ગણતરી કરો.
2.  $x$  અક્ષ અને  $y$  અક્ષ પર લેવાની થતી રાશિઓ નક્કી કરો.
3. યોગ્ય પ્રમાણમાપ પસંદ કરો.
4. બિંદુઓ અંકિત કરો.
5. બિંદુઓને જોડો.

આપણને નીચે મુજબની કિંમત ધરાવતું કોષ્ટક પ્રાપ્ત થશે.


જમા રાશિ (₹માં)	100	200	300	500	1000
વાર્ષિક સાદું વ્યાજ (₹માં)	10	20	30	50	100

- (i) પ્રમાણમાપ : 1 એકમ = ₹ 100 ( $x$  અક્ષ માટે)  
1 એકમ = ₹ 10 ( $y$  અક્ષ માટે)
- (ii) જમા કરાવેલ મુદ્દલને  $x$  અક્ષ પર દર્શાવો.
- (iii) પ્રાપ્ત થતા સાદા વ્યાજને  $y$  અક્ષ પર દર્શાવો.
- (iv) (100, 10), (200, 20), (300, 30), (500, 50) વગેરે બિંદુઓને આલેખપત્ર પર અંકિત કરો.
- (v) બિંદુઓને જોડો. આકૃતિ 15.17માં દર્શાવ્યા મુજબનો આલેખ મળશે, જે રેખા સ્વરૂપે છે.
  - (a)  $x$  અક્ષ પર ₹ 250 મુદ્દલને અનુરૂપ  $y$  અક્ષ પર ₹ 25 સાદું વ્યાજ પ્રાપ્ત થાય છે.
  - (b)  $y$  અક્ષ પર ₹ 70 સાદું વ્યાજ મેળવવા આનુષંગિક  $x$  અક્ષ પર ₹ 700ની રકમનું મુદ્દલ હોવું જોઈએ.

**પ્રયત્ન કરો**

શું ઉદાહરણ 7 એ સમચલનનો કિસ્સો છે ?





જમા રાશિ (₹ માં) →

આકૃતિ 15.17

**ઉદાહરણ 8 :** (સમય અને અંતર)

અજીત 30 કિમી/કલાકની ઝડપે સતત સ્કૂટર ચલાવી શકે છે. આ પરિસ્થિતિ માટે સમય → અંતરનો આલેખ દોરો. આ આલેખનો ઉપયોગ કરી નીચેની બાબતો શોધો :

(i) 75 કિમી અંતર કાપવા માટે અજીત કેટલો સમય લેશે ? (ii)  $3\frac{1}{2}$  કલાકમાં અજીતે કાપેલું અંતર શોધો.

**ઉકેલ :**

મુસાફરીના કલાક	કાપેલું અંતર
1 કલાક	30 કિમી
2 કલાક	$2 \times 30$ કિમી = 60 કિમી
3 કલાક	$3 \times 30$ કિમી = 90 કિમી
4 કલાક	$4 \times 30$ કિમી = 120 કિમી આવી જ રીતે આગળ

આ રીતે આપણને માહિતીનું કોષ્ટક મળશે.

સમય (કલાકમાં)	1	2	3	4
કાપેલ અંતર (કિમીમાં)	30	60	90	120

(i) પ્રમાણમાપ : (આકૃતિ 15.18)


$x$  અક્ષ માટે : 2 એકમ = 1 કલાક

$y$  અક્ષ માટે : 1 એકમ = 10 કિમી

(ii)  $x$  અક્ષ પર સમય દર્શાવશું.

(iii)  $y$  અક્ષ પર અંતર દર્શાવશું.

(iv) (1, 30), (2, 60), (3, 90), (4, 120) બિંદુઓને આલેખમાં અંકિત કરો.



આકૃતિ 15.18

- (v) ઉપરોક્ત બિંદુઓને જોડતા આપણને રૈખિક આલેખ પ્રાપ્ત થશે.
- (a)  $y$  અક્ષ પર 75 કિમી અંતર લેતાં તેને અનુરૂપ  $x$  અક્ષ પર 2.5 કલાક સમય પ્રાપ્ત થાય છે. આમ, 75 કિમી અંતર કાપવા માટે 2.5 કલાકનો સમય લાગશે.
- (b)  $x$  અક્ષ પર  $3\frac{1}{2}$  કલાક લેતા તેને અનુરૂપ  $y$  અક્ષ પર 105 કિમી અંતર પ્રાપ્ત થશે. આમ,  $3\frac{1}{2}$  કલાકમાં અજીત 105 કિમી અંતર કાપશે.

### સ્વાધ્યાય 15.3

1. યોગ્ય પ્રમાણમાપનો ઉપયોગ કરી નીચેના કોષ્ટકના આધારે આલેખ દોરો.

(a) સફરજનના ભાવ (કિંમત)

સફરજનની સંખ્યા	1	2	3	4	5
કિંમત (₹ માં)	5	10	15	20	25

(b) કાર દ્વારા કપાયેલ અંતર

સમય (કલાકમાં)	6 a.m.	7 a.m.	8 a.m.	9 a.m.
અંતર (કિમીમાં)	40	80	120	160



- (i) 7:30 a.m. થી 8:00 a.m. દરમિયાન કારે કેટલું અંતર કાપ્યું હશે ?  
(ii) કાર દ્વારા યાત્રા શરૂ કર્યાના સ્થળથી 100 કિમી દૂર પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગ્યો હશે ?  
(c) એક વર્ષ માટે જમા કરાવેલ મુદ્દલ માટે વ્યાજ આ મુજબ છે :

જમા રકમ (રૂમાં)	1000	2000	3000	4000	5000
સાદું વ્યાજ (રૂમાં)	80	160	240	320	400

- (i) શું આ આલેખ ઉદ્ગમબિંદુમાંથી પસાર થશે ?  
(ii) આલેખનો ઉપયોગ કરી ₹ 2500નું વાર્ષિક સાદું વ્યાજ મેળવો.  
(iii) દર વર્ષે ₹ 280 વ્યાજ મેળવવા માટે કેટલી રકમ મુદ્દલ તરીકે જમા કરાવવી પડશે ?  
2. નીચેના કોષ્ટક માટે આલેખ દોરો :

(i)

ચોરસની બાજુ (સેમીમાં)	2	3	3.5	5	6
પરિમિતિ (સેમીમાં)	8	12	14	20	24

શું આ રૈખિક આલેખ છે ?

(ii)

ચોરસની બાજુ (સેમીમાં)	2	3	4	5	6
ક્ષેત્રફળ (ચોરસ સેમીમાં)	4	9	16	25	36

શું આ રૈખિક આલેખ છે ?

## આપણે શું ચર્ચા કરી ?

- માહિતીની રજૂઆત આલેખ સ્વરૂપે કરવાથી તે સરળતાથી સમજાય છે.
- (i) લંબ આલેખ જુદા-જુદા વિભાગોની વચ્ચે તુલના કરવા માટે ઉપયોગી છે.  
(ii) વર્તુળ આલેખ એક સંપૂર્ણ ભાગના જુદા-જુદા ભાગોની તુલના કરવા માટે ઉપયોગી છે.  
(iii) હિસ્ટોગ્રામ એ સતત વર્ગો સ્વરૂપની માહિતી માટેનો સ્તંભ આલેખ છે.
- સમયના નિશ્ચિત ગાળામાં પરિવર્તન પામતી માહિતીને દર્શાવવા રેખા આલેખનો ઉપયોગ થાય છે.
- જ્યારે રેખા આલેખ એક અખંડિત/પૂર્ણ રેખા સ્વરૂપે મળે છે ત્યારે તેને રૈખિક આલેખ કહેવામાં આવે છે.
- આલેખપત્ર પર કોઈ પણ બિંદુની સ્થિતિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આપણને  $x$  નિર્દેશાંક અને  $y$  નિર્દેશાંકની જરૂર પડે.
- એક સ્વતંત્ર ચલ અને પરતંત્ર ચલ વચ્ચેનો સંબંધ આલેખ દ્વારા પ્રદર્શિત કરી શકાય.



## સંખ્યા સાથે રમત

પ્રકરણ

16

### 16.1 પ્રાસ્તાવિક

તમે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને સંમેય સંખ્યાઓ જેવી જુદા-જુદા પ્રકારની વિવિધ સંખ્યાઓનો અભ્યાસ કર્યો. તમે આવી સંખ્યાઓના રસપ્રદ ગુણધર્મો અને ખાસિયત પણ જોઈ. ધોરણ 6માં આપણે અવયવો અને અવયવીઓ અને તેઓની વચ્ચેના સંબંધો પણ જોયા હતા અને શોધી કાઢ્યા હતા.

આ પ્રકરણમાં આપણે સંખ્યાઓને વધુ વિગતથી જોઈશું. સંખ્યાઓમાં જોવા મળતી નવીન બાબતો શોધી કાઢીશું. આ બાબત આપણને સંખ્યાની ભાજકતા વિશે જાણકારી માટે ઉપયોગી બનશે.

### 16.2 સંખ્યાનું વ્યાપક સ્વરૂપ

ચાલો આપણે એક સંખ્યા 52 લઈએ,  
52ને નીચે પ્રમાણે લખીએ.

$$52 = 50 + 2 = 10 \times 5 + 2$$

તેવી જ રીતે 37ને પણ નીચે પ્રમાણે લખી શકાય,

$$37 = 10 \times 3 + 7$$

સામાન્ય રીતે, અંક  $a$  અને  $b$ થી બનેલ કોઈપણ બે અંકોવાળી સંખ્યા  $ab$ ને નીચે મુજબ લખી શકાય :

$$ab = 10 \times a + b = 10a + b$$

તો  $ba$  માટે શું કહી શકાય ?

$$ba = 10 \times b + a = 10b + a$$

ચાલો હવે આપણે એક સંખ્યા 351 લઈએ. આ એક ત્રણ અંકોથી બનતી સંખ્યા છે. તેને નીચે પ્રમાણે પણ લખી શકાય :

$$351 = 300 + 50 + 1 = 100 \times 3 + 10 \times 5 + 1 \times 1$$

તેવી જ રીતે

$$497 = 100 \times 4 + 10 \times 9 + 1 \times 7$$

સામાન્ય સ્વરૂપે, અંક  $a$ ,  $b$  અને  $c$ થી બનેલ કોઈપણ ત્રણ અંકવાળી સંખ્યા  $abc$ ને નીચે પ્રમાણે લખી શકાય :

$$\begin{aligned} abc &= 100 \times a + 10 \times b + 1 \times c \\ &= 100a + 10b + c \end{aligned}$$

તેવી જ રીતે,

$$\begin{aligned} cab &= 100c + 10a + b \\ bca &= 100b + 10c + a \quad \text{તે જ રીતે આગળ....} \end{aligned}$$



અહીં  $ab$  નો અર્થ  
 $a \times b$  નથી.




### પ્રયત્ન કરો

- નીચે આપેલી સંખ્યાઓને તેમનાં વ્યાપક સ્વરૂપમાં લખો.
  - 25
  - 73
  - 129
  - 302
- નીચે આપેલી સંખ્યાઓના સ્વરૂપને સામાન્ય સ્વરૂપમાં લખો.
  - $10 \times 5 + 6$
  - $100 \times 7 + 10 \times 1 + 8$
  - $100 \times a + 10 \times c + b$

### 16.3 સંખ્યાઓ સાથે ગમ્મત

- દ્વિઅંકી સંખ્યાઓમાં અંકોની અદલાબદલી મીનાક્ષીએ સુંદરમને 2 અંકોથી બનતી સંખ્યા ધારવાનું કહ્યું અને ત્યાર બાદ તેણી કહે એમ સુંદરમે કરવું એમ નક્કી થયું. તેઓ વચ્ચેની વાતચીત નીચે આકૃતિમાં બતાવેલ છે. આ આકૃતિને ધ્યાનથી જુઓ અને ત્યારબાદ આગળ વાંચો :

મીનાક્ષી અને સુંદરમ વચ્ચેની વાતચીત : પ્રથમ તબક્કો...



એવું કેમ બન્યું ? એવું એટલા માટે બન્યું કે સુંદરમે પ્રથમ 49 સંખ્યા ધારેલ હતી. તેથી તેણે ધારેલી સંખ્યાને ઉલટાવતાં તેને 94 મળ્યા. હવે સુંદરમે બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો કર્યો. અર્થાત્  $49 + 94 = 143$ . છેલ્લે તેણે મળેલ સંખ્યાને 11 વડે ભાગવા કહ્યું. તેથી તેમને  $143 \div 11 = 13$  મળ્યા. જેમાં શેષ વધતી નથી. આવું મીનાક્ષીએ અનુમાન કર્યું હતું.



## પ્રયત્ન કરો

જો નીચે આપેલી સંખ્યા સુંદરમે ધારેલી હોય તો પરિણામ શું મળશે તે ચકાસો :

1. 27

2. 39

3. 64

4. 17

ચાલો, આપણે મીનાક્ષીની યુક્તિને સમજીએ.

ધારો કે સુંદરમે ધારેલ રકમ  $ab$  છે. જે બે અંકોવાળી સંખ્યા  $10a + b$ નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. આ સંખ્યાના અંકોને ઉલટાવતા તેને  $ba = 10b + a$  પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ બંને સંખ્યાનો સરવાળો કરતાં,

$$(10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b \\ = 11(a + b)$$

આમ, બંને સંખ્યાઓ, ધારેલ સંખ્યા અને તેને ઉલટાવવાથી મળતી સંખ્યાનો સરવાળો હંમેશા 11નો ગુણિત જ હોય !

અહીં આપણે એ પણ ખાસ નોંધ કરીએ કે જો આપણે મળેલ બંને સંખ્યાઓના સરવાળાને 11 વડે ભાગીએ તો તેનું ભાગફળ હંમેશા  $(a + b)$  મળે. અને આ ભાગફળ  $(a + b)$  એ ધારેલી સંખ્યા  $ab$ ના અંકો  $a$  અને  $b$ નો સરવાળો છે.

તમે અન્ય કોઈ બે અંકોની સંખ્યાઓ લઈ જાતે જ આ બાબતની ચકાસણી કરી શકો છો.

મીનાક્ષી અને સુંદરમ્ વચ્ચેની રમત હજુ ચાલુ છે !

**મીનાક્ષી :** સુંદરમ્, ફરીથી તું બે અંકોની એક સંખ્યા ધારી લે. પણ જોજે હો મને કહેવાની નથી.

**સુંદરમ્ :** સારું... બરાબર.

**મીનાક્ષી :** હવે ધારેલ રકમના અંકોનો ક્રમ ઉલટાવી નાખો. હવે ધારેલ રકમ અને ઉલટાવવાથી મળેલ રકમમાં જે મોટી રકમ હોય તેમાંથી નાની રકમની બાદબાકી કરો.

**સુંદરમ્ :** સારું... મેં બાદબાકી પણ કરી. આગળ શું કરું ?

**મીનાક્ષી :** સુંદરમ્, મળેલ બાદબાકીની સંખ્યાને 9 વડે ભાગો. હું જોયાં વિના કહી શકું છું કે તેની શેષ શૂન્ય હશે.

**સુંદરમ્ :** હા. મીનાક્ષી તમે સાચા છો હો ! ખરેખર આ ભાગાકાર નિઃશેષ છે. પણ આ વખતે મને પણ ખબર પડી ગઈ કે આ કેમ બને છે.

વાસ્તવમાં, સુંદરમે ધારેલી રકમ 29 હતી. તેણે કરેલી ગણતરી મુજબ : સૌપ્રથમ તેને સંખ્યા 92 મળી, ત્યારબાદ તેને  $92 - 29 = 63$  મળ્યા; અને છેલ્લે 63ને 9 વડે ભાગતાં  $(63 \div 9)$  તેને ભાગફળ 7 મળ્યું અને શેષ શૂન્ય મળી.

## પ્રયત્ન કરો

જો સુંદરમે ધારેલ રકમ નીચે આપેલી સંખ્યામાંથી હોય તો તેનું પરિણામ શું મળે તે ચકાસો :

1. 17

2. 21

3. 96

4. 37

અહીં આપણે સુંદરમે મીનાક્ષીની બીજી યુક્તિ કેવી રીતે રજૂ કરી તે જોઈએ. હવે તે આવું આત્મવિશ્વાસ પૂર્ણ કરી શકે છે.

ધારો કે સુંદરમે 2 અંકોની ધારેલી રકમ  $ab$  હતી. તેને  $ab = 10a + b$  સ્વરૂપે પણ લખી શકાય. આ રકમને ઉલટાવવાથી મળતી રકમ  $ba = 10b + a$  છે. હવે જ્યારે મીનાક્ષીએ મોટી રકમ હોય તેમાંથી નાની રકમની બાદબાકી કરવાનું કહેતાં,

જો ધારેલી રકમનો દશકનો અંક એકમના અંકથી મોટો હોય, તો (અર્થાત્  $a > b$ )

$$(10a + b) - (10b + a) = 10a + b - 10b - a \\ = 9a - 9b = 9(a - b)$$



જો ધારેલ રકમનો એકમનો અંક દશકના અંકથી મોટો હોય (અર્થાત્  $b > a$ ), તો  
 $(10b + a) - (10a + b) = 10b + a - 10a - b = 9b - 9a = 9(b - a)$   
 અને જો તે  $a = b$  હોય તો તેને મળતી સંખ્યા 0 (શૂન્ય) હશે.

આમ, તમામ પ્રકારની શક્યતાઓમાં મળતું પરિણામ એ 9 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે.  
 અર્થાત્ શેષ શૂન્ય છે. અહીં એ પણ નોંધીએ કે મળેલ પરિણામ (બાદબાકી કરતાં)ને  
 ભાગીએ તો આપણને ભાગફળ તરીકે  $a - b$  અથવા  $b - a$  ( $a > b$  અથવા  $a < b$   
 મુજબ) મળે છે. તમે બીજી સંખ્યાઓ ધારીને આ બાબતની ચકાસણી કરી શકો છો.

(ii) ત્રણ અંકોવાળી સંખ્યાના અંકોને ઉલટાવતાં :

હવે અંકો સાથે રમત અને ગમ્મત કરવાનો વારો સુંદરમ્નો હતો.

સુંદરમ્ : મીનાક્ષી, તમે ત્રણ અંકોની કોઈ પણ રકમ ધારો. પણ મને કહેવાની નથી.

મીનાક્ષી : સારું...

સુંદરમ્ : હવે ધારેલ સંખ્યાના અંકોના ક્રમને ઉલટાવી નાખો. મળતી સંખ્યા અને ધારેલ સંખ્યામાંથી  
 જે સંખ્યા નાની હોય તેને મોટી સંખ્યામાંથી બાદ કરો.

મીનાક્ષી : સારું... મેં તે પ્રમાણે બાદબાકી કરી નાખી. મારે હવે આગળ શું કરવાનું ?

સુંદરમ્ : મળેલ બાદબાકીની સંખ્યાને 99 વડે ભાગાકાર કરો. હું ચોક્કસપણે કહી શકું કે ત્યાં શેષ  
 શૂન્ય મળે છે.

વાસ્તવમાં, મીનાક્ષીએ 3 અંકોની સંખ્યા 349 ધારેલ હતી.

- સંખ્યાના અંકોના ક્રમને ઉલટાવવાથી 943 મળે.
- મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરતાં  $(943 - 349) = 594$  મળે.
- મળેલ પરિણામી સંખ્યાને 99 વડે ભાગવાથી  $594 \div 99 = 6$ , મળે અને શેષ શૂન્ય રહે.

### પ્રયત્ન કરો



જો મીનાક્ષીએ ધારેલી ત્રણ અંકોની સંખ્યાઓ નીચે મુજબની હોય તો મળતાં પરિણામો જુઓ :

- |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 132 | 2. 469 | 3. 737 | 4. 901 |
|--------|--------|--------|--------|

ચાલો, આપણે જાણીએ કે આ કેમ બને છે ?

ધારો કે મીનાક્ષીએ ધારેલ ત્રણ અંકવાળી સંખ્યા  $abc = 100a + 10b + c$  છે. અંકોના ક્રમને  
 ઉલાટવતાં મળતી સંખ્યા  $cba = 100c + 10b + a$  છે. હવે બાદબાકી કરતાં

જો  $a > c$ , તો બંને સંખ્યાઓનો તફાવત

$$(100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 100a + 10b + c - 100c - 10b - a = 99a - 99c = 99(a - c)$$

જો  $c > a$ , તો બંને સંખ્યાઓનો તફાવત

$$(100c + 10b + a) - (100a + 10b + c) = 99c - 99a = 99(c - a)$$

જો  $a = c$  તો સ્પષ્ટ છે કે તફાવત શૂન્ય જ મળે.

આમ, બધા જ પ્રકારના કિસ્સાઓમાં મળતું પરિણામ એ 99 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવું જ  
 મળે છે. તેમજ મળતું ભાગફળ  $(a - c)$  અથવા  $(c - a)$  મળે છે. આ બાબતને અન્ય કોઈ ત્રણ  
 અંકોવાળી સંખ્યા માટે તપાસી જુઓ.

(iii) ત્રણ અંકોની મદદથી ત્રણ અંકોની સંખ્યા બનાવવી.

હવે ફરીથી મીનાક્ષીનો દાવ આવ્યો.

મીનાક્ષી : સુંદરમ્, તમે કોઈ પણ ત્રણ અંકવાળી સંખ્યા ધારો.

સુંદરમ્ : સારું... મીનાક્ષી મેં ત્રણ અંકવાળી સંખ્યા ધારી લીધી ?

મીનાક્ષી : હવે આ અંકોનો ઉપયોગ કરી બીજી બે ત્રણ અંકવાળી સંખ્યાઓ બનાવો. જેમ કે ધારેલી સંખ્યા  $abc$  હોય તો,

તેની પ્રથમ સંખ્યા  $cab$  છે. (અર્થાત્ એકમના અંકને શરૂઆતમાં (ડાબી બાજુ) મૂકવામાં આવે.)

બીજી સંખ્યા  $bca$  છે. (અર્થાત્ શતકના અંકને જમણી બાજુ છેડે મૂકવામાં આવે.)

હવે આ ધારેલ સંખ્યા અને બીજી બે સંખ્યાનો સરવાળો કરો. મળતાં સરવાળાની સંખ્યાનો 37 વડે ભાગાકાર કરો. હું કહી શકું કે શેષ શૂન્ય મળે છે.

સુંદરમ્ : હા. મીનાક્ષી તમે સાચા હોં !!

વાસ્તવમાં સુંદરમે 3 અંકોવાળી સંખ્યા 237 ધારેલ હતી. ત્યાર બાદ મીનાક્ષીના કહેવા મુજબ સુંદરમે બીજી બે રકમો બનાવેલ, તે 723 અને 372 હતી. આમ,

$$\begin{array}{r} 237 \\ + 723 \\ + 372 \\ \hline + 1332 \end{array}$$

હવે 1332ને 37 વડે ભાગતાં

$$1332 \div 37 = 36, \text{ શેષ શૂન્ય મળે છે.}$$

ત્રણ અંકો 2, 3 અને 7 અંકોની મદદથી શક્ય તેટલી ત્રણ અંકોની સંખ્યાઓ બનાવી તેનો સરવાળો કરો. શું તે 37થી નિ:શેષ ભાગી શકાય ? શું તે સંખ્યા  $abc$ ના અંકો  $a, b$  અને  $c$ થી બનતી બધી જ સંખ્યાઓના સરવાળા માટે સાચું છે ?

### પ્રયત્ન કરો

જો સુંદરમે ધારેલ ત્રણ અંકોથી બનતી સંખ્યા નીચે મુજબ હોય તો મળતાં પરિણામની ચકાસણી કરો :

1. 417

2. 632

3. 117

4. 937



શું આ બાબત હંમેશાં સાચી છે ?

ચાલો જોઈએ,  $abc = 100a + 10b + c$

$$cab = 100c + 10a + b$$

$$bca = 100b + 10c + a$$

હવે  $abc + cab + bca = 111(a + b + c)$

$$= 37 \times 3 (a + b + c)$$

જે 37 થી નિ:શેષ ભાગી શકાય.

### 16.4 સંખ્યાઓને બદલે મૂળાક્ષર

અહીં આપણી પાસે કોયડાઓ છે કે જેમાં ગાણિતિક સરવાળામાં અંકોના સ્થાને મૂળાક્ષર હોય છે. આપણે શોધી કાઢવાનું હોય છે કે કયો મૂળાક્ષર કયા અંકને બદલે મૂકી શકાય, તેથી આ એક ગુપ્ત સંકેતને ઉકેલવાની રમત જેવું છે. અહીં આપણે સરવાળા અને ગુણાકાર માટેના કોયડા જ જોઈશું.



9KKVSV

અહીં આપણે નીચે મુજબના બે નિયમોનું પાલન કરીને કોયડાઓ ઉકેલીશું.

1. પ્રત્યેક મૂળાક્ષર કોઈ એક અંકની જગ્યાએ જ વાપરી શકાશે. પ્રત્યેક અંક એ કોઈ એક મૂળાક્ષરનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
2. સંખ્યાનો પ્રથમ અંક શૂન્ય હશે નહિ. આથી આપણે “ત્રેસઠ”ને 63 લખીશું. પરંતુ 063 કે 0063 લખીશું નહિ.

આપણે એક એવો નિયમ પણ બનાવીએ કે કોયડાનો જવાબ એક અને માત્ર એક જ હોય.

**ઉદાહરણ 1 :** સરવાળામાં Qની કિંમત શોધો.

$$\begin{array}{r} 31Q \\ +1Q3 \\ \hline 501 \end{array}$$

**ઉકેલ :**

અહીં એક મૂળાક્ષર Q છે. આપણે Qની કિંમત શોધવી છે.

સરવાળાની એકમની છેલ્લી ઊભી હાર જુઓ. તે Q + 3 છે. જવાબમાં 1 આવે છે. તેથી આપણે એવી સંખ્યા Qની જગ્યાએ મૂકીએ કે તેનો એકમનો અંક 1 મળે.

આ તો જ શક્ય બને કે જો Qની કિંમત 8 હોય. તેથી કોયડો નીચે મુજબ ઉકેલી શકાય :

$$\begin{array}{r} 318 \\ +183 \\ \hline 501 \end{array} \quad \text{તેથી } Q = 8$$

**ઉદાહરણ 2 :** નીચેના સરવાળામાં A અને Bની કિંમત મેળવો.

$$\begin{array}{r} A \\ + A \\ + A \\ \hline BA \end{array}$$

**ઉકેલ :** અહીં આ કોયડામાં A અને B બંનેની કિંમત શોધવાની છે.

અહીં આપેલા સરવાળા પર નજર નાખીએ તો જોવા મળે છે કે સરવાળાની ઊભી હારમાં Aનો સરવાળો ત્રણ વાર કરવામાં આવતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક પણ A જ મળે. જો Aનો સરવાળો બે વાર કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શૂન્ય મળે તો આ શક્ય બને. તેથી આપણે

A = 0 અથવા A = 5 વિચારી શકીએ.

જો A = 0, તો 0 + 0 + 0 = 0, તેથી B = 0 મળે. આપણે આ કિંમત A = 0 સ્વીકારીશું નહિ. (કેમ કે A = 0 તો A = B, તેથી BA સંખ્યાનો દશકનો અંક પણ શૂન્ય મળે.) તેથી આપણે A = 0 કિંમતને સ્વીકારતા નથી તેથી બીજી શક્યતા A = 5 લઈએ તો,

કોયડાનો ઉકેલ આ પ્રમાણે મળે,

$$\begin{array}{r} 5 \\ + 5 \\ + 5 \\ \hline 15 \end{array} \quad \text{તેથી } A = 5 \text{ અને } B = 1$$





**ઉદાહરણ 3 :** નીચેના ગુણાકારમાં A અને Bની કિંમત મેળવો.

$$\begin{array}{r} \text{B A} \\ \times \text{B 3} \\ \hline \text{5 7 A} \\ \hline \end{array}$$

**ઉકેલ :**

અહીં આપેલા કોયડામાં બે મૂળાક્ષરો A અને Bની કિંમત શોધવાની છે.

$3 \times A$ માં એકમનો અંક A હોવાથી,  $A = 0$  અથવા  $A = 5$  હોય.

હવે B માટે વિચારો. જો  $B = 1$  હોય તો  $BA \times B3$ ની કિંમત વધુમાં વધુ  $19 \times 19$  ને બરાબર એટલે કે તે વધુમાં વધુ 361ને બરાબર હોઈ શકે. પરંતુ ગુણાકાર 57A આપેલ છે જે 500થી વધારે છે. તેથી  $B = 1$  શક્ય નથી.

જો  $B = 3$  લઈએ તો  $BA \times B3$ ની કિંમત  $30 \times 30$ થી વધુ મળે એટલે કે 900થી વધારે મળે. પરંતુ 57A એ 600થી નાના છે તેથી  $B = 3$  શક્ય નથી.

આમ, ઉપરની વાસ્તવિકતાઓ જોતાં  $B = 2$  મળે તેથી ગુણાકાર  $20 \times 23$  અથવા  $25 \times 23$  બેમાંથી એક હોઈ શકે.

પરંતુ પ્રથમ શક્યતા  $20 \times 23 = 460$  સ્વીકારી શકાય નહિ પરંતુ જો બીજી શક્યતા  $25 \times 23 = 575$  જે શક્ય છે. તેથી અહીં  $A = 5$  અને  $B = 2$  ઉકેલ છે.

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 23 \\ \hline 575 \\ \hline \end{array}$$

### આટલું કરો

બે અંકોથી બનતી એક સંખ્યા  $ab$  ધારો. હવે આ ધારેલ સંખ્યાને ઉલટાવવાથી મળતી સંખ્યા  $ba$  છે. બંનેનો સરવાળો કરો. તેનો સરવાળો 3 અંકોથી બનતી સંખ્યા મળશે. ધારો કે તે  $dad$  છે.

એટલે કે

$$\begin{aligned} ab + ba &= dad \\ \therefore (10a + b) + (10b + a) &= dad \\ \therefore 11(a + b) &= dad \end{aligned}$$

અહીં  $a + b$ નો સરવાળો 18થી વધારે ક્યારેય ન હોય (કેમ ?)

શું  $dad$  એ 11નો ગુણક છે ?

શું  $dad$  એ 198થી નાનો છે ?

1 થી 198 વચ્ચે આવતાં 11ના ગુણકો લખો કે જે ત્રણ અંકોવાળી સંખ્યા હોય.

તમને  $a$  અને  $d$ ની કિંમત મળી જશે.



### સ્વાધ્યાય 16.1

નીચે આપેલ સરવાળા કે ગુણાકારની પ્રક્રિયા માટે મૂળાક્ષરોની કિંમત મેળવો. તમે જે પગલાં લીધાં તેનું કારણ જણાવો.

$$\begin{array}{r} 1. \quad 3A \\ + \quad 25 \\ \hline \text{B 2} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 4A \\ + \quad 98 \\ \hline \text{C B 3} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 1A \\ \times \quad A \\ \hline 9A \\ \hline \end{array}$$





$$\begin{array}{r} 4. \quad AB \\ + \quad 37 \\ \hline 6A \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad AB \\ \times \quad 3 \\ \hline CAB \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad AB \\ \times \quad 5 \\ \hline CAB \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad AB \\ \times \quad 6 \\ \hline BBB \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad A1 \\ + \quad 1B \\ \hline B0 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 2AB \\ + \quad AB1 \\ \hline B18 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 12A \\ + \quad 6AB \\ \hline A09 \\ \hline \end{array}$$



9KURUI

### 16.5 વિભાજ્યતાની ચાવીઓ

નીચે આપેલી સંખ્યાઓ ભાજક તરીકે હોય તો તેની વિભાજ્યતાની ચાવીઓ વિશે તમે ધોરણ 6માં શીખી ગયા છો.

10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11

તમે ઉપરની સંખ્યાઓ માટે નિઃશેષ ભાગાકાર માટેની સરળ પદ્ધતિ જાણો છો. પરંતુ અહીં તમે એવું કેમ બને છે તે જાણીને નવાઈ પામશો. આ પ્રકરણમાં આપણે એવું કેમ ? તેના સંદર્ભે જોઈશું.

#### 16.5.1 10 વડે વિભાજ્યતા

આ એક સાવ સરળ પદ્ધતિથી, સૌ પ્રથમ આપણે 10ના ગુણિત લખીએ.

10, 20, 30, 40, 50, 60 ...,

અને થોડા 10ની ગુણિત ન હોય તેવી સંખ્યા લખીએ જેમ કે,

13, 27, 32, 48, 55, 69

ઉપરની સંખ્યાઓનો અભ્યાસ કરતાં આપણને જોવા મળે છે કે જે સંખ્યાઓનો એકમનો અંક શૂન્ય છે, તે બધી જ સંખ્યાઓને 10 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે. જ્યારે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક શૂન્ય નથી તેવી કોઈ પણ સંખ્યાને 10 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાતી નથી. તેથી આપણને 10 વડે વિભાજ્યતાની ચાવી મળી.

અલબત્ત આપણે અહીં જ અટકી નહિ જઈએ. આપણે એ પણ બતાવીશું કે “આવું કેમ ?” તે બતાવવું કોઈ અઘરું કામ નથી. તેના માટે આપણને ફક્ત સ્થાન કિંમતના નિયમોની માહિતી હોવી જોઈએ. જો આપણે કોઈ સંખ્યા ...  $cba$  લઈએ તો, તેને નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય.

$$\dots cba = \dots + 100c + 10b + a$$

અહીં,  $a$  એ એકમનો અંક,  $b$  એ દશકનો અંક અને  $c$  એ શતકનો અંક છે. તેવી જ રીતે આગળ, અહીં ... ટપકાંનો મતલબ એવો છે કે  $c$  ની ડાબી બાજુ પણ હજુ સંખ્યાઓ છે.

10, 100, 1000, ... એ 10થી વિભાજ્ય છે. તેવી જ રીતે  $10b$ ,  $100c$  ... અને જ્યાં સુધી સંખ્યા  $a$ નો પ્રશ્ન છે, તો ત્યાં  $a = 0$  હોય તો જ આપેલી સંખ્યા 10 થી વિભાજ્ય હોય. આપેલી સંખ્યાનો એકમ અંક શૂન્ય હોય, તો જ આપેલી સંખ્યા 10 વડે વિભાજ્ય હોય.

#### 16.5.2 5 વડે વિભાજ્યતા

ચાલો, 5ના ગુણિત જોઈએ :

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

અહીં આપણે ઉપરની યાદી પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે યાદીમાં આપેલ સંખ્યાઓનો એકમનો અંક 5 અથવા 0 છે, તે સિવાય બીજો કોઈ અંક એકમના સ્થાને આવતો જ નથી.

તેથી આપણને 5 વડે વિભાજ્યતાની ચાવી આ પ્રમાણે મળે છે :

જો આપેલી સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 અથવા 0 હોય તો તે સંખ્યા 5 વડે વિભાજ્ય છે. ચાલો આપણે આ નિયમને સમજાવે. કોઈ એક સંખ્યા ...  $cba$ ને નીચે પ્રમાણે લખી શકાય.  

$$\dots cba = \dots + 100c + 10b + a$$

આપણે જાણીએ છીએ કે 10, 100 વગેરે 10થી વિભાજ્ય છે. તેથી  $10b$ ,  $100c$ , ... પણ 10થી વિભાજ્ય હોય. તે 5 થી પણ વિભાજ્ય હોય કેમ કે  $10 = 5 \times 2$ . જ્યાં સુધી એકમના અંક  $a$  નો પ્રશ્ન છે, ત્યાં સુધી જો  $a$ , 5 વડે વિભાજ્ય હોય, તો જ તે સંખ્યા 5 વડે વિભાજ્ય હોય તેથી એકમનો અંક 5 અથવા 0 હોય.

### પ્રયત્ન કરો

(પ્રથમ ઉદાહરણ તમને ગણીને આપેલ છે.)

1. જો  $N \div 5$ માં શેષ 3 વધે છે, તો  $N$ ની એકમનો અંક શું હોય ? (જ્યારે કોઈ એક સંખ્યાને 5 વડે ભાગીએ અને શેષ 3 વધે તો તે સંખ્યાનો એકમ અંક 3 અથવા 8 હોય.)
2. જો  $N \div 5$ માં શેષ 1 વધે છે, તો  $N$ ની એકમનો અંક શું હોય ?
3. જો  $N \div 5$ માં શેષ 4 વધે છે, તો  $N$ ની એકમનો અંક શું હોય ?



### 16.5.3 2 વડે વિભાજ્યતા

અહીં બેકી સંખ્યાઓની યાદી આપેલ છે.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ...,

અને એકી સંખ્યાઓની યાદી નીચે પ્રમાણે હોય

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ...,

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બેકી સંખ્યાનો એકમનો અંક

2, 4, 6, 8 કે 0 (શૂન્ય) છે.

જ્યારે એકી સંખ્યાનો એકમનો અંક

1, 3, 5, 7 અથવા 9 છે.

આપણે ધોરણ 6માં 2ની વિભાજ્યતાની ચાવી શીખી ગયેલ તે યાદ કરીએ. તે આ પ્રમાણે હતી :

જો આપેલી સંખ્યાનો એકમ અંક 0, 2, 4, 6 કે 8 હોય તો તેવી સંખ્યાને 2 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય અર્થાત્ તે સંખ્યા 2 વડે વિભાજ્ય છે.

આ નિયમને આપણે સમજાવે.

આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ સંખ્યા  $cba$ ને આપણે  $100c + 10b + a$  સ્વરૂપે લખી શકીએ.

અહીં સ્પષ્ટ છે કે પ્રથમ બે પદો  $100c$  અને  $10b$  એ 2 વડે વિભાજ્ય છે. કેમ કે 100 અને 10 સંખ્યાઓ 2 વડે વિભાજ્ય છે. હવે જ્યાં સુધી સંખ્યા  $a$ નો પ્રશ્ન છે, તો આપેલ સંખ્યા 2 થી તો જ વિભાજ્ય હોય, કે જો  $a$ , 2 વડે વિભાજ્ય હોય, આ તો જ શક્ય છે કે જો  $a = 0, 2, 4, 6$  કે 8.

### પ્રયત્ન કરો

(પ્રથમ ઉદાહરણ ગણતરી સાથે આપેલ છે.)

1. જો  $N \div 2$ માં શેષ 1 વધે તો છે, તો સંખ્યા  $N$ નો એકમનો અંક શું હશે ?  
 ( $N$  એ એકી સંખ્યા છે. તેથી તેનો એકમનો અંક 1, 3, 5, 7 કે 9 હશે.)





2. જો  $N \div 2$  કરતાં શેષ શૂન્ય વધે છે, તો સંખ્યા  $N$ નો એકમનો અંક શું હશે ?
3. ધારો કે સંખ્યા  $N$ , માટે  $N \div 5$  કરતાં શેષ 4 મળે છે અને  $N \div 2$  કરવાથી શેષ 1 મળે છે, તો સંખ્યા  $N$ નો એકમનો અંક શું હશે ?

### 16.5.4 9 અને 3 વડે વિભાજ્યતા

આપણને ત્રણ સંખ્યાઓ વડે નિ:શેષ ભાગાકારની યાવીઓ મળી. આ ત્રણ સંખ્યા 10, 5 અને 2 છે. આપણને આ ત્રણેય યાવીઓમાં એક બાબત સામાન્ય જણાય છે કે તેમાં એકમના અંકનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બાકીના અંકો ગમે તે હોય તેની તરફ ધ્યાન આપેલ નથી એટલે વિભાજ્યતા માત્ર એકમના અંકની મદદથી જ નક્કી થાય છે. 10, 5, 2 એ 10ના અવયવો છે. તે આપણી સ્થાન કિંમતો યાવી રૂપ સંખ્યા છે.

પરંતુ ચાલો આપણે 9 વડે વિભાજ્યતાની ચકાસણી કરીએ, તેમાં આ બાબત મદદરૂપ બનતી નથી. ચાલો, આપણે એક સંખ્યા 3573 લઈએ. તેને વિસ્તૃત રીતે લખતાં,

$$\begin{aligned} 3573 &= 3 \times 1000 + 5 \times 100 + 7 \times 10 + 3 \\ &= 3 \times (999 + 1) + 5 \times (99 + 1) + 7 \times (9 + 1) + 3 \\ &= 3 \times 999 + 5 \times 99 + 7 \times 9 + (3 + 5 + 7 + 3)... \quad (1) \end{aligned}$$

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો  $(3 + 5 + 7 + 3)$ ને 9 કે 3 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય તો જ 3573ને 9 કે 3 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય.

આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે  $3 + 5 + 7 + 3 = 18$  જે 9 અને 3 બંને વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે. આથી સંખ્યા 3573 એ 9 અને 3 વડે વિભાજ્ય છે.

હવે આપણે બીજી એક સંખ્યા 3576 લઈએ,

$$3576 = 3 \times 999 + 5 \times 99 + 7 \times 9 + (3 + 5 + 7 + 6) \dots \quad (2)$$

ઉપરાંત  $(3 + 5 + 7 + 6 = 21)$ . 21 એ 3 થી નિ:શેષ ભાગી શકાય. પરંતુ 9 વડે નિ:શેષ ન ભાગી શકાય.

આમ, 3576 એ 3 વડે વિભાજ્ય છે. પરંતુ 9 વડે વિભાજ્ય નથી.

આમ,

(i) કોઈ સંખ્યા  $N$  એ 9 વડે તો જ વિભાજ્ય છે કે તેના તમામ અંકોનો સરવાળો 9 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય. નહીં તો તે સંખ્યા  $N$  એ 9 વડે વિભાજ્ય નથી.

(ii) કોઈ સંખ્યા  $N$  એ 3 વડે તો જ વિભાજ્ય છે કે તેના તમામ અંકોનો સરવાળો 3 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય. નહીં તો તે સંખ્યા  $N$  એ 3 વડે વિભાજ્ય નથી.

જો સંખ્યા  $cba$  હોય તો,  $cba = 100c + 10b + a = 99c + 9b + (a + b + c)$   
 $= 9(11c + b) + (a + b + c)$   
 જે 3 અને 9થી વિભાજ્ય છે.

આમ, 9 (અથવા 3) વડે વિભાજ્યતા તો જ શક્ય છે કે જો  $(a + b + c)$  9 (અથવા 3) વડે વિભાજ્ય હોય.

**ઉદાહરણ 4 :** 21436587 એ 9 વડે વિભાજ્ય છે ? ચકાસો.

**ઉકેલ :** આપેલ સંખ્યા 21436587ના અંકોનો સરવાળો કરતા  $2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7 = 36$  મળે છે. આમ, અંકોનો સરવાળો 36 એ 9 વડે વિભાજ્ય છે. તેથી આપણે એવું તારણ કાઢી શકીએ કે 21436587 એ 9 વડે વિભાજ્ય છે.

આપણે બીજી રીતે જોઈએ તો

$$\frac{21436587}{9} = 2381843 \quad (\text{ભાગાકાર નિ:શેષ છે.})$$

**ઉદાહરણ 5 :** 152875ની વિભાજ્યતા 9 વડે ચકાસો.

**ઉકેલ :** અહીં સંખ્યા 152875ના અંકોનો સરવાળો કરતાં,

$$\text{સરવાળો} = 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5 = 28$$

તેથી સરવાળો 28 જે 9 વડે વિભાજ્ય નથી. એટલે આપણે કહી શકીએ કે 152875 એ 9 વડે વિભાજ્ય નથી.

### પ્રયત્ન કરો

નીચેની સંખ્યાઓ 9 વડે વિભાજ્ય છે કે નહિ ? તે ચકાસો.

1. 108      2. 616      3. 294      4. 432      5. 927

**ઉદાહરણ 6 :** જો ત્રણ અંકોથી બનતી સંખ્યા  $24x$  એ 9 વડે વિભાજ્ય હોય તો  $x$ ની કિંમત શોધો.

**ઉકેલ :** જો  $24x$  એ 9 વડે વિભાજ્ય હોય તો તેના અંકોનો સરવાળો  $2 + 4 + x = 6 + x$  પણ 9 વડે વિભાજ્ય હોય.

આ તો જ શક્ય છે કે  $6 + x = 9$  અથવા  $18 \dots$

પરંતુ  $x$  એ એક અંક છે. તેથી  $6 + x = 9$  એટલે કે  $x = 3$  આમ,  $x$ ની કિંમત 3 મળે.

### વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

- તમે જોયું કે 450 એ 10થી વિભાજ્ય છે. તે 2 અને 5થી પણ વિભાજ્ય છે. વળી, 2 અને 5 એ 10ના અવયવો પણ છે. તેવી જ રીતે 135 એ 9 થી વિભાજ્ય છે. તે 3થી પણ વિભાજ્ય છે. ઉપરાંત 3 એ 9નો અવયવ પણ છે.  
શું તમે એમ કહી શકો કે કોઈ સંખ્યાએ  $m$  થી વિભાજ્ય છે, તો તે સંખ્યા  $m$ ના અવયવોથી પણ વિભાજ્ય હોય ?

- (i) 3 અંકોની સંખ્યા  $abc$  માટે

$$\begin{aligned} abc &= 100a + 10b + c \\ &= 99a + 11b + (a - b + c) \\ &= 11(9a + b) + (a - b + c) \end{aligned}$$

જો સંખ્યા  $abc$  એ 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો,  $(a - b + c)$  માટે શું કહી શકાય ?  
શું તે અનિવાર્ય છે કે  $(a + c - b)$  પણ 11 વડે નિ:શેષ ભાજ્ય હોય ?

- (ii) 4 અંકોની સંખ્યા  $abcd$  માટે

$$\begin{aligned} abcd &= 1000a + 100b + 10c + d \\ &= 1001a + 99b + 11c - (a - b + c - d) \\ &= 11(91a + 9b + c) + [(b + d) - (a + c)] \end{aligned}$$

જો સંખ્યા  $abcd$  એ 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો,  $[(b + d) - (a + c)]$  માટે શું કહી શકાય ?

- (iii) ઉપર દર્શાવેલ કિસ્સાઓ (i) અને (ii) પરથી આપણે કહી શકીએ કે, કોઈ પણ સંખ્યા 11 વડે તો જ નિ:શેષ ભાગી શકાય જો તે સંખ્યાના એકી સ્થાન પર આવેલ સંખ્યાનો સરવાળો અને બેકી સ્થાન પર આવેલ અંકોના સરવાળાના તફાવતને 11 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય.

**ઉદાહરણ 7 :** 2146587ની 3 વડે વિભાજ્યતા ચકાસો.

**ઉકેલ :** અહીં સંખ્યા 2146587ના અંકોનો સરવાળો  $2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7 = 33$  છે. આ સરવાળો એ 3 વડે વિભાજ્ય છે. આપણે એવું તારણ કાઢી શકીએ કે સંખ્યા 2146587 એ 3 વડે વિભાજ્ય છે.





ઉદાહરણ 8 : 15287ની 3 વડે વિભાજ્યતા ચકાસો.

ઉકેલ : અહીં સંખ્યા 15287ના અંકોનો સરવાળો  $1 + 5 + 2 + 8 + 7 = 23$  મળે છે.

આ સરવાળો 23 એ 3 વડે વિભાજ્ય નથી તેથી આપેલી સંખ્યા 15287 એ 3 વડે વિભાજ્ય નથી.



### પ્રયત્ન કરો

નીચેની સંખ્યાઓ માટે 3ની વિભાજ્યતા ચકાસો.

1. 108                      2. 616                      3. 294                      4. 432                      5. 927

### સ્વાધ્યાય 16.2

- જો  $21y5$  એ 9નો ગુણિત છે, જ્યાં  $y$  એ એક અંક છે, તો  $y$ ની કિંમત શોધો.
- જો  $31z5$  એ 9નો ગુણિત છે, જ્યાં  $z$  એ એક અંક છે, તો  $z$ ની કિંમત શોધો.
- જો  $24x$  એ 3નો ગુણિત છે. જ્યાં  $x$  એ એક અંક છે, તો  $x$ ની કિંમત શોધો.


તમને છેલ્લા પ્રશ્નોના બે ઉકેલ મળશે ? શા માટે ?

( $24x$  એ 3નો ગુણિત છે. તેથી અંકોનો સરવાળો  $6 + x$  પણ 3નો ગુણિત હોય. એટલે  $6 + x$  ની કિંમત 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ... પૈકીની કોઈ હોય. પરંતુ  $x$  એ એક અંક છે, તે તો જ શક્ય બને કે  $6 + x = 9$  અથવા 12 અથવા 15. તેથી  $x = 0$  અથવા  $x = 3$  અથવા  $x = 6$  અથવા  $x = 9$ . આમ,  $x$ ની કિંમત ઉપરના ચાર પૈકી કોઈ પણ હોય.

- જો  $31z5$  એ 3નો ગુણિત હોય, જ્યાં  $z$  એ એક અંક છે. તો  $z$ ની કિંમત શું મળે ?

### આપણે શું ચર્ચા કરી ?

- સંખ્યાને વ્યાપક સ્વરૂપે લખી શકાય, તેથી બે અંકોની સંખ્યા  $ab$  હોય તો  $ab = 10a + b$
- સંખ્યાનું સામાન્ય સ્વરૂપ આપણને કોયડાઓ ઉકેલવામાં મદદ કરે છે.
- આપણે કોઈ સંખ્યાને વ્યાપક સ્વરૂપે લખીએ ત્યારે તે સંખ્યાની 10, 5, 2, 9 અથવા 3થી ભાજ્યતાનું કારણ આપી શકીએ છીએ.








# જવાબો

## સ્વાધ્યાય 1.1

- (i) 2 (ii)  $\frac{-11}{28}$
- (i)  $\frac{-2}{8}$  (ii)  $\frac{5}{9}$  (iii)  $\frac{-6}{5}$  (iv)  $\frac{2}{9}$  (v)  $\frac{19}{6}$
- (i)  $\frac{-1}{13}$  (ii)  $\frac{-19}{13}$  (iii) 5 (iv)  $\frac{56}{15}$  (v)  $\frac{5}{2}$  (vi) -1
- (i) 1 એ ગુણાકારનો એકમ ઘટક છે. (ii) કમનો નિયમ (iii) વ્યસ્ત સંખ્યા
- $\frac{-96}{91}$  7. જૂથનો ગુણધર્મ 8. ના, કારણ કે ગુણાકાર 1 ન થાય.
- હા, કારણ કે  $0.3 \times 3\frac{1}{3} = \frac{3}{10} \times \frac{10}{3} = 1$
- (i) 0 (ii) 1 અને (-1) (iii) 0
- (i) ના મળે (ii) 1, -1 (iii)  $\frac{-1}{5}$  (iv) x (v) સંમેય સંખ્યા  
(vi) ઘન

## સ્વાધ્યાય 1.2

- (i)  (ii) 
- 
- તેઓ પૈકીના થોડા 1,  $\frac{1}{2}$ , 0, -1,  $\frac{-1}{2}$
- $\frac{-7}{20}$ ,  $\frac{-6}{20}$ ,  $\frac{-5}{20}$ ,  $\frac{-4}{20}$ ,  $\frac{-3}{20}$ ,  $\frac{-2}{20}$ ,  $\frac{-1}{20}$ , 0, .....,  $\frac{1}{20}$ ,  $\frac{2}{20}$  (આવી અન્ય સંમેય સંખ્યાઓ પણ મળી શકે.)
- (i)  $\frac{41}{60}$ ,  $\frac{42}{60}$ ,  $\frac{43}{60}$ ,  $\frac{44}{60}$ ,  $\frac{45}{60}$  (ii)  $\frac{-8}{6}$ ,  $\frac{-7}{6}$ , 0,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{2}{6}$ , (iii)  $\frac{9}{32}$ ,  $\frac{10}{32}$ ,  $\frac{11}{32}$ ,  $\frac{12}{32}$ ,  $\frac{13}{32}$   
(આવી અન્ય સંમેય સંખ્યાઓ પણ મળી શકે.)

6.  $-\frac{3}{2}, -1, \frac{-1}{2}, 0, \frac{1}{2}$  (આવી અન્ય સંમેય સંખ્યાઓ પણ મળી શકે.)

7.  $\frac{97}{160}, \frac{98}{160}, \frac{99}{160}, \frac{100}{160}, \frac{101}{160}, \frac{102}{160}, \frac{103}{160}, \frac{104}{160}, \frac{105}{160}, \frac{106}{160}$

(આવી અન્ય સંમેય સંખ્યાઓ પણ મળી શકે.)

**સ્વાધ્યાય 2.1**

1.  $x = 9$       2.  $y = 7$       3.  $z = 4$       4.  $x = 2$       5.  $x = 2$       6.  $t = 50$

7.  $x = 27$       8.  $y = 2.4$       9.  $x = \frac{25}{7}$       10.  $y = \frac{3}{2}$       11.  $p = -\frac{4}{3}$       12.  $x = -\frac{8}{5}$

**સ્વાધ્યાય 2.2**

1.  $\frac{3}{4}$ ,      2. લંબાઈ = 52 મી, પહોળાઈ = 25 મી,      3.  $1\frac{2}{5}$  સેમી      4. 40 અને 55

5. 45, 27      6. 16, 17, 18      7. 288, 296 અને 304      8. 7, 8, 9

9. રાહુલની ઉંમર 20 વર્ષ, હારુનની ઉંમર 28 વર્ષ      10. 48 વિદ્યાર્થીઓ

11. ભરતની ઉંમર : 17 વર્ષ, ભરતના પિતાની ઉંમર : 46 વર્ષ, ભરતના દાદાની ઉંમર : 72 વર્ષ

12. 5 વર્ષ      13.  $-\frac{1}{2}$

14. ₹ 100 → 2000 નોટ, ₹ 50 → 3000 નોટ, ₹ 10 → 5000 નોટ

15. ₹ 1ના સિક્કાની સંખ્યા = 80; ₹ 2ના સિક્કાની સંખ્યા = 60; ₹ 5ના સિક્કાની સંખ્યા = 20

16. 19

**સ્વાધ્યાય 2.3**

1.  $x = 18$       2.  $t = -1$       3.  $x = -2$       4.  $z = \frac{3}{2}$       5.  $x = 5$

6.  $x = 0$       7.  $x = 40$       8.  $x = 10$       9.  $y = \frac{7}{3}$       10.  $m = \frac{4}{5}$

**સ્વાધ્યાય 2.4**

1. 4      2. 7, 35      3. 36      4. 26 (અથવા 62)

5. સરોજની ઉંમર 5 વર્ષ, સરોજની માતાની ઉંમર 30 વર્ષ

6. લંબાઈ = 275 મીટર, પહોળાઈ = 100 મીટર      7. 200 મીટર      8. 72

9. પૌત્રીની ઉંમર : 6 વર્ષ, દાદાની ઉંમર : 60 વર્ષ

10. અમનની ઉંમર : 60 વર્ષ, અમનના પુત્રની ઉંમર : 20 વર્ષ

## સ્વાધ્યાય 2.5

1.  $x = \frac{27}{10}$       2.  $n = 36$       3.  $x = -5$       4.  $x = 8$       5.  $t = 2$
6.  $m = \frac{7}{5}$       7.  $t = -2$       8.  $y = \frac{2}{3}$       9.  $z = 2$       10.  $f = 0.6$

## સ્વાધ્યાય 2.6

1.  $x = \frac{3}{2}$       2.  $x = \frac{35}{33}$       3.  $z = 12$       4.  $y = -8$       5.  $y = -\frac{4}{5}$
6. હરિની ઉંમર = 20 વર્ષ, હેરીની ઉંમર = 28 વર્ષ      7.  $\frac{13}{21}$

## સ્વાધ્યાય 3.1

1. (a) 1, 2, 5, 6, 7      (b) 1, 2, 5, 6, 7      (c) 1, 2  
(d) 2      (e) 1
2. (a) 2      (b) 9      (c) 0      3.  $360^\circ$ , હા
4. (a)  $900^\circ$       (b)  $1080^\circ$       (c)  $1440^\circ$       (d)  $(n - 2)180^\circ$
5. સમાન બાજુ અને સમાન ખૂણા ધરાવતો બહુકોણ,  
(i) સમબાજુ ત્રિકોણ,      (ii) ચોરસ, (iii) નિયમિત ષટ્કોણ
6. (a)  $60^\circ$       (b)  $140^\circ$       (c)  $140^\circ$       (d)  $108^\circ$
7. (a)  $x + y + z = 360^\circ$  (b)  $x + y + z + w = 360^\circ$

## સ્વાધ્યાય 3.2

1. (a)  $360^\circ - 250^\circ = 110^\circ$       (b)  $360^\circ - 310^\circ = 50^\circ$
2. (i)  $\frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$  (ii)  $\frac{360^\circ}{15} = 24^\circ$
3.  $\frac{360}{24} = 15$  (બાજુઓ)      4. બાજુઓની સંખ્યા = 24
5. (i) ના, (22 એ 360નો ભાજક નથી.)  
(ii) ના, (કારણ કે દરેક બહિષ્કોણ  $180^\circ - 22^\circ = 158^\circ$ , જે  $360^\circ$ નો ભાજક નથી.)
6. (a) સમબાજુ ત્રિકોણ એ 3 બાજુ ધરાવતો નિયમિત બહુકોણ છે, જેના અંતઃકોણનું માપ ઓછામાં ઓછું =  $60^\circ$   
(b) ઉપરોક્ત (a) પરથી મોટામાં મોટા બહિષ્કોણનું માપ =  $120^\circ$

## સ્વાધ્યાય 3.3

1. (i) BC (સામસામેની બાજુઓ સમાન)      (ii)  $\angle DAB$  (સામસામેના ખૂણા સમાન/એકરૂપ હોય)

(iii) OA (વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે)

(iv)  $180^\circ$  ( $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$  હોવાથી, અંતઃસંમુખકોણ)

2. (i)  $x = 80^\circ, y = 100^\circ, z = 80^\circ$  (ii)  $x = 130^\circ, y = 130^\circ, z = 130^\circ$   
 (iii)  $x = 90^\circ, y = 60^\circ, z = 60^\circ$  (iv)  $x = 100^\circ, y = 80^\circ, z = 80^\circ$   
 (v)  $y = 112^\circ, x = 28^\circ, z = 28^\circ$
3. (i) બની શકે પણ હંમેશાં જરૂરી નહીં.  
 (ii) ના (સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓ એકરૂપ હોય છે, પરંતુ અહીં  $AD \neq BC$ )  
 (iii) ના (સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણા એકરૂપ હોય છે, પરંતુ અહીં,  $\angle A \neq \angle C$ )
4. પતંગ (ઉદાહરણ તરીકે) 5.  $108^\circ, 72^\circ$  6. દરેક કાટખૂણો હોય
7.  $x = 110^\circ, y = 40^\circ, z = 30^\circ$
8. (i)  $x = 6, y = 9$  (ii)  $x = 3, y = 13$  9.  $x = 50^\circ$
10.  $\overline{NM} \parallel \overline{KL}$  (અંતઃ સંમુખકોણોનો સરવાળો  $180^\circ$  હોય) આથી, KLMN એ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.
11.  $60^\circ$  12.  $\angle P = 50^\circ \angle S = 90^\circ$

### સ્વાધ્યાય 3.4

1. (b), (c), (f), (g), (h) વિધાનો ખરાં છે બાકીનાં વિધાનો ખોટા છે.
2. (a) સમબાજુ, ચોરસ (b) ચોરસ, લંબચોરસ
3. (i) ચોરસને ચાર બાજુ છે; તેથી તે ચતુષ્કોણ છે.  
 (ii) ચોરસની સામસામેની બાજુની બન્ને જોડ સમાંતર હોય છે; તેથી સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.  
 (iii) ચોરસ એ ચારે બાજુઓ સમાન હોય તેવો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે; તેથી સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે.  
 (iv) ચોરસ એ ચારે ખૂણાઓ કાટખૂણા હોય તેવો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે; તેથી તે લંબચોરસ છે.
4. (i) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ, સમબાજુ ચતુષ્કોણ, ચોરસ, લંબચોરસ  
 (ii) સમબાજુ, ચોરસ (iii) ચોરસ, લંબચોરસ
5. બંને વિકર્ણો તેના અંદરના ભાગમાં આવેલા છે.
6.  $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$  તેથી સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCDના વિકર્ણ  $\overline{AC}$  નું મધ્યબિંદુ O થાય.

### સ્વાધ્યાય 5.1


1. (b), (d) આ બધા કિસ્સામાં માહિતીને વર્ગ-અંતરાલોમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે.

દુકાનદાર	આવૃત્તિ ચિહ્ન	સંખ્યા
W		28
M		15
B		5
G		12

વર્ગ	આવૃત્તિ ચિહ્ન	આવૃત્તિ
800-810		3
810-820		2
820-830		1
830-840		9
840-850		5
850-860		1
860-870		3
870-880		1
880-890		1
890-900		4
	કુલ	30

4. (i) 830-840 (ii) 10  
(iii) 20

5. (i) 4-5 કલાક (ii) 34  
(iii) 14




## સ્વાધ્યાય 5.2

1. (i) 200, (ii) હળવું સંગીત, (iii) શાસ્ત્રીય સંગીત – 100, અર્ધ શાસ્ત્રીય સંગીત – 200, હળવું સંગીત – 400, લોક સંગીત – 300

2. (i) શિયાળો (ii) શિયાળો–150°, ચોમાસું–120°, ઉનાળો–90°

(iii)





4. (i) હિન્દી (ii) 30 ગુણ (iii) હા 5.



### સ્વાધ્યાય 5.3

- (a) અવલોકનો A, B, C, D  
(b) HT, HH, TH, TT (અહીં, HT અર્થાત્ પ્રથમ સિક્કા ઉપર 'હેડ' અને બીજા સિક્કા ઉપર 'ટેઇલ' એ જ રીતે આગળ....)
- આપેલી ઘટનામાં પ્રાપ્ત અવલોકનો  
(i) (a) 2, 3, 5 (b) 1, 4, 6  
(iii) (a) 6 (b) 1, 2, 3, 4, 5
- (a)  $\frac{1}{5}$  (b)  $\frac{1}{13}$  (c)  $\frac{4}{7}$
- (i)  $\frac{1}{10}$  (ii)  $\frac{1}{2}$  (iii)  $\frac{2}{5}$  (iv)  $\frac{9}{10}$
- લીલો વૃત્તાંશ મળવાની સંભાવના =  $\frac{3}{5}$   
વાદળી ન હોય તેવો વૃત્તાંશ મળવાની સંભાવના =  $\frac{4}{5}$
- અવિભાજ્ય સંખ્યા મળવાની સંભાવના =  $\frac{1}{2}$   
અવિભાજ્ય સંખ્યા ન હોય તેવી સંખ્યા મળવાની સંભાવના =  $\frac{1}{2}$   
5થી મોટી સંખ્યા મળવાની સંભાવના =  $\frac{1}{6}$   
5થી મોટી ન હોય તેવી સંખ્યાઓ મળવાની સંભાવના =  $\frac{5}{6}$

### સ્વાધ્યાય 6.1

- (i) 1 (ii) 4 (iii) 1 (iv) 9 (v) 6 (vi) 9  
(vii) 4 (viii) 0 (ix) 6 (x) 5
- કારણ કે, આ સંખ્યાના એકમના અંક  
(i) 7 (ii) 3 (iii) 8 (iv) 2 (v) 0 (vi) 2  
(vii) 0 (viii) 0
- (i), (iii) 4. 10000200001, 100000020000001
- 1020304030201, 101010101<sup>2</sup> 6. 20, 6, 42, 43
- (i) 25 (ii) 100 (iii) 144
- (i) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13  
(ii) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21
- (i) 24 (ii) 50 (iii) 198

## સ્વાધ્યાય 6.2

1. (i) 1024      (ii) 1225      (iii) 7396      (iv) 8649      (v) 5041      (vi) 2116
2. (i) 6, 8, 10      (ii) 14, 48, 50      (iii) 16, 63, 65      (iv) 18, 80, 82

## સ્વાધ્યાય 6.3

1. (i) 1, 9      (ii) 4, 6      (iii) 1, 9      (iv) 5
2. (i), (ii), (iii)      3. 10, 13
4. (i) 27      (ii) 20      (iii) 42      (iv) 64      (v) 88      (vi) 98  
(vii) 77      (viii) 96      (ix) 23      (x) 90
5. (i) 7; 42      (ii) 5; 30      (iii) 7; 84      (iv) 3; 78      (v) 2; 54      (vi) 3; 48
6. (i) 7; 6      (ii) 13; 15      (iii) 11; 6      (iv) 5; 23      (v) 7; 20      (vi) 5; 18
7. 49      8. 45 હરોળ અને દરેક હરોળમાં 45 છોડ      9. 900      10. 3600

## સ્વાધ્યાય 6.4

1. (i) 48      (ii) 67      (iii) 59      (iv) 23      (v) 57      (vi) 37  
(vii) 76      (viii) 89      (ix) 24      (x) 32      (xi) 56      (xii) 30
2. (i) 1      (ii) 2      (iii) 2(iv) 3      (v) 3
3. (i) 1.6      (ii) 2.7      (iii) 7.2      (iv) 6.5      (v) 5.6
4. (i) 2; 20      (ii) 53; 44      (iii) 1; 57      (iv) 41; 28      (v) 31; 63
5. (i) 4; 23      (ii) 14; 42      (iii) 4; 16      (iv) 24; 43      (v) 149; 81
6. 21 મીટર      7. (a) 10 સેમી      (b) 12 સેમી
8. 24 છોડ      9. 16 બાળકો

## સ્વાધ્યાય 7.1

1. (ii) અને (iv)
2. (i) 3      (ii) 2      (iii) 3      (iv) 5      (v) 10
3. (i) 3      (ii) 2      (iii) 5      (iv) 3      (v) 11
4. 20 લંબઘન

## સ્વાધ્યાય 7.2

1. (i) 4      (ii) 8      (iii) 22      (iv) 30      (v) 25      (vi) 24  
(vii) 48      (viii) 36      (ix) 56
2. (i) ખોટું      (ii) ખરું      (iii) ખોટું      (iv) ખોટું      (v) ખોટું      (vi) ખોટું  
(vii) ખરું
3. 11, 17, 23, 32

## સ્વાધ્યાય 8.1

- (a) 1 : 2      (b) 1 : 2000      (c) 1 : 10
- (a) 75%      (b)  $66\frac{2}{3}\%$       3. 28% વિદ્યાર્થીઓ 4. 25 મેચ 5. ₹ 2400
- 10% ક્રિકેટ → 30 લાખ, ફૂટબોલ → 15 લાખ, બીજી રમતો → 5 લાખ

## સ્વાધ્યાય 8.2

- ₹ 1,40,000      2. 80%      3. ₹ 34.80      4. ₹ 18,342.50
- નફો 2%      6. ₹ 2,835      7. ખોટ ₹ 1,269.84
- ₹ 14,560      9. ₹ 2,000      10. ₹ 4,576.27      11. ₹ 1050

## સ્વાધ્યાય 8.3

- (a) વ્યાજમુદ્દલ = ₹ 15,377.34, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ = ₹ 4,577.34  
(b) વ્યાજમુદ્દલ = ₹ 22,869, વ્યાજ = ₹ 4,869  
(c) વ્યાજમુદ્દલ = ₹ 70,304, વ્યાજ = ₹ 7,804  
(d) વ્યાજમુદ્દલ = ₹ 8,736.20, વ્યાજ = ₹ 736.20  
(e) વ્યાજમુદ્દલ = ₹ 10,816, વ્યાજ = ₹ 816
- ₹ 36,659.70      3. ફેબીના ₹ 362.50 વધુ ચૂકવે      4. ₹ 43.20
- (i) ₹ 63,600      (ii) ₹ 67,416      6. (ii) ₹ 92,400      (ii) ₹ 92,610
- (i) ₹ 8,820      (ii) ₹ 441
- વ્યાજમુદ્દલ = ₹ 11,576.25, વ્યાજ = ₹ 1,576.25, હા
- ₹ 4,913      10. (i) આશરે 48,980 (ii) 59,535      11. ₹ 5,31,616 (અંદાજિત)
- ₹ 38,640

## સ્વાધ્યાય 9.1

1.	પદ	સહગુણક
(i)	$5xyz^2$ $-3zy$	5 -3
(ii)	1 $x$ $x^2$	1 1 1
(iii)	$4x^2y^2$ $-4x^2y^2z^2$ $z^2$	4 -4 1

(iv)	3 $-pq$ $qr$ $-rp$	3 -1 1 -1
(v)	$\frac{x}{2}$ $\frac{y}{2}$ $-xy$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ -1
(vi)	$0.3a$ $-0.6ab$ $0.5b$	0.3 -0.6 0.5

2. એકપદી : 1000,  $pqr$   
 દ્વિપદી :  $x + y$ ,  $2y - 3y^2$ ,  $4z - 15z^2$ ,  $p^2q + pq^2$ ,  $2p + 2q$   
 ત્રિપદી :  $7 + y + 5x$ ,  $2y - 3y^2 + 4y^3$ ,  $5x - 4y + 3xy$   
 જે પદાવલિઓ આ શ્રેણીમાં સમાવિષ્ટ નથી તેવી :  $x + x^2 + x^3 + x^4$ ,  $ab + bc + cd + da$
3. (i) 0 (ii)  $ab + bc + ac$  (iii)  $-p^2q^2 + 4pq + 9$   
 (iv)  $2(l^2 + m^2 + n^2 + lm + mn + nl)$
4. (a)  $8a - 2ab + 2b - 15$  (b)  $2xy - 7yz + 5zx + 10xyz$   
 (c)  $p^2q - 7pq^2 + 8pq - 18q + 5p + 28$

## સ્વાધ્યાય 9.2

1. (i)  $28p$  (ii)  $-28p^2$  (iii)  $-28p^2q$  (iv)  $-12p^4$  (v) 0  
 2.  $pq$ ;  $50mn$ ;  $100x^2y^2$ ;  $12x^3$ ;  $12mn^2p$   
 3.

પહેલી એકપદી → બીજી એકપદી ↓	$2x$	$-5y$	$3x^2$	$-4xy$	$7x^2y$	$-9x^2y^2$
$2x$	$4x^2$	$-10xy$	$6x^3$	$-8x^2y$	$14x^3y$	$-18x^3y^2$
$-5y$	$-10xy$	$25y^2$	$-15x^2y$	$20xy^2$	$-35x^2y^2$	$45x^2y^3$
$3x^2$	$6x^3$	$-15x^2y$	$9x^4$	$-12x^3y$	$21x^4y$	$-27x^4y^2$
$-4xy$	$-8x^2y$	$20xy^2$	$-12x^3y$	$16x^2y^2$	$-28x^3y^2$	$36x^3y^3$
$7x^2y$	$14x^3y$	$-35x^2y^2$	$21x^4y$	$-28x^3y$	$49x^4y^2$	$-63x^4y^3$
$-9x^2y^2$	$-18x^3y^2$	$45x^2y^3$	$-27x^4y^2$	$36x^3y^2$	$-63x^4y^3$	$81x^4y^4$

4. (i)  $105a^7$  (ii)  $64pqr$  (iii)  $4x^4y^4$  (iv)  $6abc$   
 5. (i)  $x^2y^2z^2$  (ii)  $-a^6$  (iii)  $1024y^6$  (iv)  $36a^2b^2c^2$  (v)  $-m^3n^2p$

## સ્વાધ્યાય 9.3

1. (i)  $4pq + 4pr$  (ii)  $a^2b - ab^2$  (iii)  $7a^3b^2 + 7a^2b^3$   
 (iv)  $4a^3 - 36a$  (v) 0
2. (i)  $ab + ac + ad$  (ii)  $5x^2y + 5xy^2 - 25xy$   
 (iii)  $6p^3 - 7p^2 + 5p$  (iv)  $4p^4q^2 - 4p^2q^4$   
 (v)  $a^2bc + ab^2c + abc^2$
3. (i)  $8a^{50}$  (ii)  $-\frac{3}{5}x^3y^3$  (iii)  $-4p^4q^4$  (iv)  $x^{10}$
4. (a)  $12x^2 - 15x + 3$ ; (i) 66 (ii)  $\frac{-3}{2}$   
 (b)  $a^3 + a^2 + a + 5$ ; (i) 5 (ii) 8 (iii) 4
5. (a)  $p^2 + q^2 + r^2 - pq - qr - pr$  (b)  $-2x^2 - 2y^2 - 4xy + 2yz + 2zx$   
 (c)  $5l^2 + 25ln$  (d)  $-3a^2 - 2b^2 + 4c^2 - ab + 6bc - 7ac$

## સ્વાધ્યાય 9.4

1. (i)  $8x^2 + 14x - 15$  (ii)  $3y^2 - 28y + 32$  (iii)  $6.25l^2 - 0.25m^2$   
(iv)  $ax + 5a + 3bx + 15b$  (v)  $6p^2q^2 + 5pq^3 - 6q^4$  (vi)  $3a^4 + 10a^2b^2 - 8b^4$
2. (i)  $15 - x - 2x^2$  (ii)  $7x^2 + 48xy - 7y^2$  (iii)  $a^3 + a^2b^2 + ab + b^3$   
(iv)  $2p^3 + p^2q - 2pq^2 - q^3$
3. (i)  $x^3 + 5x^2 - 5x$  (ii)  $a^2b^3 + 3a^2 + 5b^3 + 20$  (iii)  $t^3 - st + s^2t^2 - s^3$   
(iv)  $4ac$  (v)  $3x^2 + 4xy - y^2$  (vi)  $x^3 + y^3$   
(vii)  $2.25x^2 - 16y^2$  (viii)  $a^2 + b^2 - c^2 + 2ab$

## સ્વાધ્યાય 9.5

1. (i)  $x^2 + 6x + 9$  (ii)  $4y^2 + 20y + 25$  (iii)  $4a^2 - 28a + 49$   
(iv)  $9a^2 - 3a + \frac{1}{4}$  (v)  $1.21m^2 - 0.16$  (vi)  $b^4 - a^4$   
(vii)  $36x^2 - 49$  (viii)  $a^2 - 2ac + c^2$  (ix)  $\frac{x^2}{4} + \frac{3xy}{4} + \frac{9y^2}{16}$   
(x)  $49a^2 - 126ab + 81b^2$
2. (i)  $x^2 + 10x + 21$  (ii)  $16x^2 + 24x + 5$  (iii)  $16x^2 - 24x + 5$   
(iv)  $16x^2 + 16x - 5$  (v)  $4x^2 + 16xy + 15y^2$  (vi)  $4a^4 + 28a^2 + 45$   
(vii)  $x^2y^2z^2 - 6xyz + 8$
3. (i)  $b^2 - 14b + 49$  (ii)  $x^2y^2 + 6xyz + 9z^2$  (iii)  $36x^4 - 60x^2y + 25y^2$   
(iv)  $\frac{4}{9}m^2 + 2mn + \frac{9}{4}n^2$  (v)  $0.16p^2 + 0.04pq + 0.25q^2$  (vi)  $4x^2y^2 + 20xy^2 + 25y^2$
4. (i)  $a^4 - 2a^2b^2 + b^4$  (ii)  $40x$  (iii)  $98m^2 + 128n^2$   
(iv)  $41m^2 + 80mn + 41n^2$  (v)  $4p^2 - 4q^2$  (vi)  $a^2b^2 + b^2c^2$  (vii)  $m^4 + n^4m^2$
6. (i) 5041 (ii) 9801 (iii) 10404 (iv) 996004  
(v) 27.04 (vi) 89991 (vii) 6396 (viii) 79.21  
(ix) 9.975
7. (i) 200 (ii) 0.08 (iii) 1800 (iv) 84
8. (i) 10712 (ii) 26.52 (iii) 10094 (iv) 95.06

## સ્વાધ્યાય 10.1

1. (a) → (iii) → (iv) (b) → (i) → (v) (c) → (iv) → (ii)  
(d) → (v) → (iii) (e) → (ii) → (i)
2. (a) (i) → આગળ (Front), (ii) → બાજુ (Side), (iii) → ઉપર (Top)  
(b) (i) → બાજુ (Side), (ii) → આગળ (Front), (iii) → ઉપર (Top)  
(c) (i) → આગળ (Front), (ii) → બાજુ (Side), (iii) → ઉપર (Top)  
(d) (i) → આગળ (Front), (ii) → બાજુ (Side), (iii) → ઉપર (Top)
3. (a) (i) → ઉપર (Top), (ii) → આગળ (Front), (iii) → બાજુ (Side)  
(b) (i) → બાજુ (Side), (ii) → આગળ (Front), (iii) → ઉપર (Top)  
(c) (i) → ઉપર (Top), (ii) → બાજુ (Side), (iii) → આગળ (Front)  
(d) (i) → બાજુ (Side), (ii) → આગળ (Front), (iii) → ઉપર (Top)  
(e) (i) → આગળ (Front), (ii) → ઉપર (Top), (iii) → બાજુ (Side)



### સ્વાધ્યાય 10.3

- (i) ના (ii) હા (iii) હા 2. શક્ય છે, જો પૃષ્ઠ (Faces)ની સંખ્યા 4 કે તેથી વધુ હોય તો
- ફક્ત (ii) અને (iv)
- (i) જો પ્રિઝમના પાયાની બાજુઓની સંખ્યા ખૂબ જ મોટી લઈએ તો તે નળાકાર બને.  
(ii) જો પિરામિડના પાયાની બાજુઓની સંખ્યા ખૂબ જ મોટી લઈએ તો તે શંકુ બને.
- ના, તે લંબઘન પણ હોઈ શકે. 7. ફલક (Faces) → 8, શિરોબિંદુઓ (Vertices) → 6, ધાર (Edges) → 30
- ના

### સ્વાધ્યાય 11.1

- (a) 2. ₹ 17,8753. ક્ષેત્રફળ =  $129.5 \text{ મી}^2$ , પરિમિતિ = 48 મી
- 45000 લાઈ 5. (b)

### સ્વાધ્યાય 11.2

- 0.88 મી<sup>2</sup> 2. 7 સેમી (3) 660 મી<sup>2</sup> 4. 252 મી<sup>2</sup>
- 45 સેમી<sup>2</sup> 6. 24 સેમી<sup>2</sup>, 6 સેમી 7. ₹ 810
- 140 મી 9. 119 મી<sup>2</sup>
- જ્યોતિની રીત મુજબ, ક્ષેત્રફળ =  $2 \times \frac{1}{2} \times \frac{15}{2} (30 + 15) \text{ મી}^2$   
= 337.5 મી<sup>2</sup>  
કવિતાની રીતનો ઉપયોગ કરતાં ક્ષેત્રફળ =  $\frac{1}{2} \times 15 \times 15 + 15 \times 15$   
= 337.5 મી<sup>2</sup>
- 80 સેમી<sup>2</sup>, 96 સેમી<sup>2</sup>, 80 સેમી<sup>2</sup>, 96 સેમી<sup>2</sup>

### સ્વાધ્યાય 11.3

- (a) 2. 144 મી 3. 10 સેમી 4. 11મી<sup>2</sup> 5. 5 કેન
- સામ્યતા → બંનેની ઊંચાઈ એક સમાન છે, તફાવત → એક નળાકાર છે, બીજો સમઘન છે. સમઘનની વક્સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધુ હોય છે.
- 440 મી<sup>2</sup> 8. 322 સેમી 9. 1980 મી<sup>2</sup> 10. 704 સેમી<sup>2</sup>

### સ્વાધ્યાય 11.4

- (a) ઘનફળ (b) પૃષ્ઠફળ (c) ઘનફળ
- નળાકાર Bનું ઘનફળ વધુ, નળાકાર Bની પૃષ્ઠસપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધુ
- 5 સેમી 4. 450 5. 1 મી 6. 49500 લિટર
- (i) 4 ગણું (ii) 8 ગણું 8. 30 કલાક

### સ્વાધ્યાય 12.1

- (i)  $\frac{1}{9}$  (ii)  $\frac{1}{16}$  (iii) 32

2. (i)  $\frac{1}{(-4)^3}$  (ii)  $\frac{1}{2^6}$  (iii)  $(5)^4$  (iv)  $\frac{1}{(3)^2}$  (v)  $\frac{1}{(-14)^3}$
3. (i) 5 (ii)  $\frac{1}{2}$  (iii) 29 (iv) 1 (v)  $\frac{81}{16}$
4. (i) 250 (ii)  $\frac{1}{60}$  5.  $m = 2$  6. (i) -1 (ii)  $\frac{512}{125}$
7. (i)  $\frac{625r^4}{2}$  (ii)  $5^5$

## સ્વાધ્યાય 12.2

1. (i)  $8.5 \times 10^{-12}$  (ii)  $9.42 \times 10^{-12}$  (iii)  $6.02 \times 10^{15}$   
 (iv)  $8.37 \times 10^{-9}$  (v)  $3.186 \times 10^{10}$
2. (i) 0.00000302 (ii) 45000 (iii) 0.00000003  
 (iv) 1000100000 (v) 5800000000000 (vi) 3614920
3. (i)  $1 \times 10^{-6}$  (ii)  $1.6 \times 10^{-19}$  (iii)  $5 \times 10^{-7}$   
 (iv)  $1.275 \times 10^{-5}$  (v)  $7 \times 10^{-2}$
4.  $1.0008 \times 10^2$

## સ્વાધ્યાય 13.1

1. ના 2. 

લાલ રંગ	1	4	7	12	20
મૂળ મિશ્રણ	8	32	56	96	160
3. 24 ભાગ 4. 700 બોટલ 5.  $10^{-4}$  સેમી; 2 સેમી 6. 21 મી
7. (i)  $2.25 \times 10^7$  સ્ફટિક (ii)  $5.4 \times 10^6$  સ્ફટિક 8. 4 સેમી
9. (i) 6 મી (ii) 8 મી 75 સેમી 10. 168 કિમી

## સ્વાધ્યાય 13.2

1. (i), (iv), (v) 2.  $4 \rightarrow 25,000$ ;  $5 \rightarrow 20,000$ ;  $8 \rightarrow 12,500$ ;  $10 \rightarrow 10,000$ ;  $20 \rightarrow 5,000$   
 વિજેતાઓની સંખ્યા એ વિજેતાઓને આપવાની ઈનામની રકમના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે.
3.  $8 \rightarrow 45^\circ$ ,  $10 \rightarrow 36^\circ$ ,  $12 \rightarrow 30^\circ$ , (i) હા (ii)  $24^\circ$  (iii) 9
4. 6 5. 4 6. 3 દિવસ 7. 15 ખોખાં
8. 49 યંત્ર 9.  $1\frac{1}{2}$  કલાક 10. (i) 6 દિવસ (ii) 6 વ્યક્તિ 11. 40 મિનિટ

## સ્વાધ્યાય 14.1

1. (i) 12 (ii)  $2y$  (iii)  $14pq$  (iv) 1 (v)  $6ab$  (vi)  $4x$   
 (vii) 10 (viii)  $x^2y^2$

2. (i)  $7(x - 6)$  (ii)  $6(p - 2q)$  (iii)  $7a(a + 2)$  (iv)  $4z(-4 + 5z^2)$   
 (v)  $10lm(2l + 3a)$  (vi)  $5xy(x - 3y)$  (vii)  $5(2a^2 - 3b^2 + 4c^2)$   
 (viii)  $4a(-a + b - c)$  (ix)  $xyz(x + y + z)$  (x)  $xy(ax + by + cz)$
3. (i)  $(x + 8)(x + y)$  (ii)  $(3x + 1)(5y - 2)$  (iii)  $(a + b)(x - y)$   
 (iv)  $(5p + 3)(3q + 5)$  (v)  $(z - 7)(1 - xy)$

## સ્વાધ્યાય 14.2

1. (i)  $(a + 4)^2$  (ii)  $(p - 5)^2$  (iii)  $(5m + 3)^2$  (iv)  $(7y + 6z)^2$   
 (v)  $4(x - 1)^2$  (vi)  $(11b - 4c)^2$  (vii)  $(l - m)^2$  (viii)  $(a^2 + b^2)^2$
2. (i)  $(2p - 3q)(2p + 3q)$  (ii)  $7(3a - 4b)(3a + 4b)$  (iii)  $(7x - 6)(7x + 6)$   
 (iv)  $16x^3(x - 3)(x + 3)$  (v)  $4lm$  (vi)  $(3xy - 4)(3xy + 4)$   
 (vii)  $(x - y - z)(x - y + z)$  (viii)  $(5a - 2b + 7c)(5a + 2b - 7c)$
3. (i)  $x(ax + b)$  (ii)  $7(p^2 + 3q^2)$  (iii)  $2x(x^2 + y^2 + z^2)$   
 (iv)  $(m^2 + n^2)(a + b)$  (v)  $(l + 1)(m + 1)$  (vi)  $(y + 9)(y + z)$   
 (vii)  $(5y + 2z)(y - 4)$  (viii)  $(2a + 1)(5b + 2)$  (ix)  $(3x - 2)(2y - 3)$
4. (i)  $(a - b)(a + b)(a^2 + b^2)$  (ii)  $(p - 3)(p + 3)(p^2 + 9)$   
 (iii)  $(x - y - z)(x + y + z)[x^2 + (y + z)^2]$  (iv)  $z(2x - z)(2x^2 - 2xz + z^2)$   
 (v)  $(a - b)^2(a + b)^2$
5. (i)  $(p + 2)(p + 4)$  (ii)  $(q - 3)(q - 7)$  (iii)  $(p + 8)(p - 2)$

## સ્વાધ્યાય 14.3

1. (i)  $\frac{x^3}{2}$  (ii)  $-4y$  (iii)  $6pqr$  (iv)  $\frac{2}{3}x^2y$  (v)  $-2a^2b^4$
2. (i)  $\frac{1}{3}(5x - 6)$  (ii)  $3y^4 - 4y^2 + 5$  (iii)  $2(x + y + z)$   
 (iv)  $\frac{1}{2}(x^2 + 2x + 3)$  (v)  $q^3 - p^3$
3. (i)  $2x - 5$  (ii)  $5$  (iii)  $6y$  (iv)  $xy$  (v)  $10abc$
4. (i)  $5(3x + 5)$  (ii)  $2y(x + 5)$  (iii)  $\frac{1}{2}r(p + q)$  (iv)  $4(y^2 + 5y + 3)$   
 (v)  $(x + 2)(x + 3)$
5. (i)  $y + 2$  (ii)  $m - 16$  (iii)  $5(p - 4)$  (iv)  $2z(z - 2)$   
 (v)  $\frac{5}{2}q(p - q)$  (vi)  $3(3x - 4y)$  (vii)  $3y(5y - 7)$

## સ્વાધ્યાય 14.4

1.  $4(x - 5) = 4x - 20$  2.  $x(3x + 2) = 3x^2 + 2x$  3.  $2x + 3y = 2x + 3y$   
 4.  $x + 2x + 3x = 6x$  5.  $5y + 2y + y - 7y = y$  6.  $3x + 2x = 5x$

7.  $(2x)^2 + 4(2x) + 7 = 4x^2 + 8x + 7$       8.  $(2x)^2 + 5x = 4x^2 + 5x$
9.  $(3x + 2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$
10. (a)  $(-3)^2 + 5(-3) + 4 = 9 - 15 + 4 = -2$       (b)  $(-3)^2 - 5(-3) + 4 = 9 + 15 + 4 = 28$   
 (c)  $(-3)^2 + 5(-3) = 9 - 15 = -6$
11.  $(y - 3)^2 = y^2 - 6y + 9$       12.  $(z + 5)^2 = z^2 + 10z + 25$
13.  $(2a + 3b)(a - b) = 2a^2 + ab - 3b^2$       14.  $(a + 4)(a + 2) = a^2 + 6a + 8$
15.  $(a - 4)(a - 2) = a^2 - 6a + 8$       16.  $\frac{3x^2}{3x^2} = 1$
17.  $\frac{3x^2 + 1}{3x^2} = \frac{3x^2}{3x^2} + \frac{1}{3x^2} = 1 + \frac{1}{3x^2}$       18.  $\frac{3x}{3x + 2} = \frac{3x}{3x + 2}$
19.  $\frac{3}{4x + 3} = \frac{3}{4x + 3}$       20.  $\frac{4x + 5}{4x} = \frac{4x}{4x} + \frac{5}{4x} = 1 + \frac{5}{4x}$
21.  $\frac{7x + 5}{5} = \frac{7x}{5} + \frac{5}{5} = \frac{7x}{5} + 1$

## સ્વાધ્યાય 15.1

1. (a)  $36.5^\circ\text{C}$       (b) બપોરે 12 વાગ્યે      p.m.(c) 1 p.m. , 2 p.m.  
 (d)  $36.5^\circ\text{C}$ , 1 p.m. અને 2 p. m. વચ્ચેનું X-અક્ષ પરનું બિંદુ એ 1 p. m. અને 2 p. m. થી સમાન અંતરે હોય છે. જે 1.30 p.m. દર્શાવે છે. આ જ રીતે Y-અક્ષ પરનું  $36^\circ\text{C}$  અને  $37^\circ\text{C}$  વચ્ચેનું બિંદુ  $36.5^\circ\text{C}$  દર્શાવે છે.  
 (e) 9 a.m. થી 10 a.m., 10 a.m. થી 11 a.m., 2 p.m. થી 3 p.m.
2. (a) (i) ₹ 4 કરોડ      (ii) ₹ 8 કરોડ  
 (b) (i) ₹ 7 કરોડ      (ii) ₹ 10 કરોડ  
 (c) ₹ 4 કરોડ      (d) 2005
3. (a) (i) 7 સેમી      (ii) 9 સેમી  
 (b) (i) 7 સેમી      (ii) 10 સેમી  
 (c) 2 સેમી      (d) 3 સેમી      (e) બીજું અઠવાડિયું      (f) પહેલું અઠવાડિયું  
 (g) બીજા અઠવાડિયાના અંતે
4. (a) મંગળ, શુક્ર, રવિ      (b)  $35^\circ\text{C}$       (c)  $15^\circ\text{C}$       (d) ગુરુ
6. (a) 4 એકમ = 1 કલાક (b)  $3\frac{1}{2}$  કલાક      (c) 22 કિમી  
 (d) હા, તે આલેખના સમક્ષિતિજ ભાગથી દર્શાવી શકાય છે. (10 a.m. – 10:30 a.m.)  
 (e) 8 a.m. અને 9 a.m.ની વચ્ચે
7. (iii) શક્ય નથી.

## સ્વાધ્યાય 15.2

1. (a) અને (b)માં દર્શાવેલ બિંદુઓ રેખા પર છે, જ્યારે (c)માં દર્શાવેલ બિંદુ રેખા પર નથી.
2. રેખા X-અક્ષને (5, 0) અને Y-અક્ષને (0, 5)માં છેદે છે.

3. O(0, 0), A(2, 0), B(2, 3), C(0, 3), P(4, 3), Q(6, 1) R(6, 5), S(4, 7), K(10, 5), L(7, 7), M(10, 8)  
 4. (i) ખરું (ii) ખોટું (iii) ખરું

### સ્વાધ્યાય 15.3

1. (b) (i) 20 કિમી (ii) 7.30 a.m. (c) (i) હા (ii) ₹ 200 (iii) ₹ 3500  
 2. (a) હા (b) ના

### સ્વાધ્યાય 16.1

1. A = 7, B = 6    2. A = 5, B = 4, C = 1    3. A = 6  
 4. A = 2, B = 5    5. A = 5, B = 0, C = 1    6. A = 5, B = 0, C = 2  
 7. A = 7, B = 4    8. A = 7, B = 9    9. A = 4, B = 7  
 10. A = 8, B = 1

### સ્વાધ્યાય 16.2

1.  $y = 1$     2.  $z = 0$  અથવા 9    3.  $z = 0, 3, 6$  અથવા 9  
 4. 0, 3, 6 અથવા 9

### ગમ્મત સાથે જ્ઞાન

1. પાયથાગોરસની ત્રિપુટી વિશે થોડું વધુ જોઈએ,  
 આપણે પાયથાગોરસની ત્રિપુટી શોધવા માટેની એક રીત જોઈ તે મુજબ,  
 $2m, m^2 - 1, m^2 + 1$  પાયથાગોરસ ત્રિપુટી થાય.  
 પાયથાગોરસની ત્રિપુટી  $a, b$  અને  $c \in \mathbb{R}$  માટે  $a^2 + b^2 = c^2$ . જો આપણે બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ  $m$  અને  $n$  ( $m > n$ )નો ઉપયોગ કરીએ અને જો  $a = (m^2 - n^2), b = 2mn, c = (m^2 + n^2)$  લઈએ તો જોઈ શકાય છે કે  $c^2 = a^2 + b^2$  ની ગણતરી સાચી ઠરે છે.  
 તેથી  $m$  અને  $n$  ની જુદી-જુદી કિંમતો માટે આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ  $a, b, c$  એવી શોધી શકીએ કે જેથી પાયથાગોરસની ત્રિપુટી બને.  
 ઉદાહરણ તરીકે,  $m = 2, n = 1$  લો.  
 તેથી  $a = m^2 - n^2 = 3, b = 2mn = 4, c = m^2 + n^2 = 5$  આમ, 3, 4, 5 એ પાયથાગોરસની એક ત્રિપુટી છે. (તપાસો !)  
 હવે,  $m = 3, n = 2$  લઈએ તો,  
 $a = 5, b = 12, c = 13$  મળે. જે પણ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી જ છે.  
 આમ,  $m, n$ ની હજુ વધુ કિંમતો લઈ થોડી વધુ ત્રિપુટી બનાવો.  
 2. જ્યારે પાણીને ઠંડું કરવામાં આવે ત્યારે તેનું ઘનફળ 4% વધે છે, તો 221 સેમી<sup>3</sup> બરફ બનાવવા કેટલું પાણી જોઈએ ?  
 3. જો ચાની ભૂકીના ભાવમાં 20% વધારો થાય તો તેના ઉપયોગમાં કેટલો ઘટાડો કરીએ જેથી ખર્ચ પહેલાં જેટલો એક સમાન જળવાઈ રહે ?



4. ઈ.સ. 1958માં ગૌરવ પુરસ્કાર આપવાની શરૂઆત થઈ એવું ધારી લઈએ તો 28 વર્ગ (Categories) ગૌરવ પુરસ્કાર જીતે છે. ઈ.સ. 1993માં 81 વર્ગ ગૌરવ પુરસ્કાર જીતે છે.  
(i) ઈ.સ. 1958માં આપવામાં આવેલ ગૌરવ પુરસ્કારની સંખ્યા ઈ.સ. 1993ની સંખ્યાના કેટલા ટકા થાય ?  
(ii) ઈ.સ. 1993માં આપવામાં આવેલ ગૌરવ પુરસ્કારની સંખ્યા ઈ.સ. 1958ની સંખ્યાના કેટલા ટકા થાય ?
5. મધપૂડાની કુલ મધમાખીમાંથી  $\frac{1}{5}$  ભાગની મધમાખી કદમ્બની કળીઓ ઉપર બેસે છે.  $\frac{1}{3}$  ભાગ સિલિન્ધીરીનાં ફૂલ ઉપર બેસે છે અને ઉપરોક્ત બંને સંખ્યાના તફાવતના ત્રણ ગણી મધમાખીઓ કુતાજા પર બેસે છે, માત્ર દસ જ મધમાખીઓ મધપૂડા પર બાકી રહે છે. તો મધપૂડા પરની કુલ મધમાખીઓની સંખ્યા શોધો. (નોંધ : કદમ્બ, સિલિન્ધીરી, કુતાજા એ ફૂલછોડનાં નામ છે. આ કોયડો પ્રાચીન ભારતીય બીજગણિતમાંથી લેવામાં આવ્યો છે.)
6. શેખર ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે તેના માટેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે તેનો મિત્ર ફારુખ ચોરસની પરિમિતિ શોધવાના સૂત્રનો ઉપયોગ કરે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે બંનેના જવાબ એક સમાન આવે છે. શું તમે એ શોધી શકો કે ચોરસની બાજુના એકમ કેટલા હશે ?
7. જે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ તેની બાજુના માપના છ ગણાથી સાંખ્યિક રીતે ઓછું હોય તેવા ચોરસની બાજુઓનાં માપ શોધો.
8. જે લંબવૃત્તીય નળાકારનું ઘનફળ તેની વકસપાટીના ક્ષેત્રફળ જેટલું જ હોય તેવા નળાકાર શક્ય છે ? જો હા, તો તેની ત્રિજ્યાનું માપ શોધો.
9. લીલા તેના જન્મદિવસની ઊજવણી નિમિત્તે તેના મિત્રોને આમંત્રણ આપે છે. તેની માતા ટેબલ (મેજ) ઉપર થોડી ડિશ અને થોડી પૂરી નાસ્તા માટે મૂકે છે. લીલા દરેક ડિશમાં 4 પૂરી મૂકે છે. તેમ છતાં એક ડિશ વધે છે. જો તે દરેક ડિશમાં 3 પૂરી મૂકે તો એક પૂરી વધે છે. તો ટેબલ પર મૂકવામાં આવેલ કુલ ડિશ અને કુલ પૂરીની સંખ્યા શોધો.
10. શું એવી કોઈ સંખ્યા મળે જેનો ઘન તેના જેટલો જ થાય. પરંતુ તેના વર્ગ તેની બરાબર ન હોય ? જો હા, તો એ શોધી કાઢો.
11. 1 થી 20 સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી એવી સંખ્યાઓ શોધો કે જેને હારમાં ગોઠવવાથી કોઈ પણ બે પાસ-પાસેની સંખ્યાઓનો સરવાળો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને.

## જવાબો

2.  $212\frac{1}{2}$  સેમી<sup>3</sup>
3.  $16\frac{2}{3}\%$
4. (i) 34.5%      (ii) 289%
5. 150
6. 4 એકમ
7. બાજુઓનાં માપ : 1, 2, 3, 4, 5 એકમ
8. હા, જેની ત્રિજ્યા = 2 એકમ
9. પૂરીની સંખ્યા = 16  
ડિશની સંખ્યા = 5
10. -1
11. 1, 3, 6, 19, 17, 8  
(સૂચના :  $1 + 3 = 4$ ,  $3 + 6 = 9$ ,  $6 + 19 = 25$ ...વગેરે અન્ય રીતે પણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરો.)